



417897-mm





HISTOIRE
NATURELLE
DES POISSONS.

TOME QUATRIÈME.

1
d
B

~~144.620.~~

HISTOIRE
NATURELLE
DES POISSONS,

PAR LE C^{EN} LACEPEDE.

TOME QUATRIEME.



A PARIS,

A LA LIBRAIRIE STÉRÉOTYPE
DE P. DIDOT L'AINÉ, GALERIES DU LOUVRE, N° 3,
ET FIRMIN DIDOT, RUE DE THIONVILLE, N° 116.

AN VII. — 1799.



AVERTISSEMENT

E T

EXPLICATION

DE QUELQUES PLANCHES.

BUFFON, DAUBENTON, et MONTBELLIARD, méditoient chaque jour de nombreux travaux , lorsque je publiai le premier des volumes qu'ils m'avoient chargé d'ajouter à leurs immortelles productions. Bientôt Montbelliard nous fut enlevé ; et peu de temps après , Buffon ayant terminé sa glorieuse carrière , le second de mes volumes ne parut qu'au milieu des témoignages de ma douleur et des hommages de tous les sentimens que j'avois voués à mon second père. Daubenton vivoit encore , et pour la science , et pour ses amis. Un coup imprévu vient de le frapper au milieu des trophées civiques et littéraires élevés en son honneur. Resté

seul de cette réunion fameuse , à laquelle l'indulgence et l'amitié avoient bien voulu m'associer, que ne puis-je graver sur un monument plus durable que le nouvel ouvrage que je présente au public :

AU FONDATEUR DE L'ANATOMIE COMPARÉE,
AU PROPAGATEUR DE L'HISTOIRE NATURELLE
ET DE LA PHYSIQUE VÉGÉTALE ,

AU BIENFAITEUR DES CAMPAGNES,

A L'HOMME JUSTE , L'AMI CONSTANT , LE VÉRITABLE SAGE ,

A L'ILLUSTRE COMPAGNON DE BUFFON ,

A D A U B E N T O N ,

PAR LA VÉNÉRATION , L'AMITIÉ FIDÈLE ,
ET LA TENDRE RECONNOISSANCE.

Nous avons déjà publié dans les trois premiers volumes la figure de plusieurs espèces. Ces poissons sont :

Le *diodon atinga* , représenté planche 6 , fig. 3 ,
tome III.

Le *diodon plumier* , pl. 3 , fig. 3 , tome I.

Le *diodon orbe* , pl. 5 , fig. 3 , tome III.

Le *lépadogastère gouan* , pl. 7 , fig. 3 et 4 ,
tome III.


Le *centrisque cuirassé*, pl. I, fig. 2, tome III.

Le *centrisque bécasse*, pl. I, fig. 3, tome III.

Le *régalec lancéolé*, pl. 4, fig. 3, tome III,
sous le nom d'*ophidie chinoise*.

PLANCHE II du deuxième volume.

La fig. 1 représente la *raie fabronienne*, vue par-dessous ; et la fig. 2 , la tête de la même raie , vue par côté.



HISTOIRE NATURELLE.

DISCOURS SUR LA DURÉE DES ESPÈCES.

LA Nature comprend l'espace , le temps ,
et la matière.

L'espace et le temps sont deux immensités sans bornes , deux infinis que l'imagination la plus élevée ne peut entrevoir , parce qu'ils ne lui présentent ni commencement ni fin. La matière les soumet à l'empire de l'intelligence. Elle a une forme ; elle circonscrit donc l'espace. Elle se meut ; elle limite donc le temps. La pensée mesure l'étendue ; l'at-

tention compte les intervalles de la durée , et la science commence.

Mais si la matière en mouvement nous apprend à connoître le temps , que la durée nous dévoile la suite des mouvemens de la matière ; qu'elle nous révèle ses changemens ; qu'elle nous montre sur-tout les modifications successives de la matière organisée , vivante , animée et sensible ; qu'elle en éclaire les admirables métamorphoses ; que le passé nous serve à compléter l'idée du présent.

Tel étoit le noble objet de la méditation des sages , dans ces contrées fameuses dont le nom seul réveille tant de brillans souvenirs , dans cette Grèce poétique , l'heureuse patrie de l'imagination , du talent et du génie.

Lorsque l'automne n'exerçoit plus qu'une douce influence , que les zéphyrs légers balançoient seuls une atmosphère qui n'étoit plus embrasée par les feux dévorans du midi , et que les fleurs tardives n'embellissoient que pour peu de temps la verdure qui bientôt devoit aussi cesser de revêtir la terre , ils alloient ,

sur le sommet d'un promontoire écarté, jouir du calme de la solitude, du charme de la contemplation, et de l'heureuse et cependant mélancolique puissance d'une saison encore belle près de la fin de son règne enchanteur.

Le soleil étoit déjà descendu dans l'onde ; ses rayons ne doroient plus que le sommet des montagnes ; le jour alloit finir ; les vagues de la mer, mollement agitées, venoient expirer doucement sur la rive ; les dépouilles des forêts, paisiblement entraînées par un souffle presque insensible, tomboient silencieusement sur le sable du rivage : au milieu d'une rêverie touchante et religieuse, l'image d'un grand homme que l'on avoit perdu, le souvenir d'un ami que l'on avoit chéri, vivifioient le sentiment, animoient la pensée, échauffoient l'imagination ; et la raison elle-même, cédant à ces inspirations célestes, se plongeoit dans le passé, et remontoit vers l'origine des êtres.

Quelles lumières ils puisoient dans ces considérations sublimes !

Quelles hautes conceptions peut nous

donner une vue même rapide des grands objets qui enchaînoient leurs réflexions et charmoient leurs esprits !

A leur exemple , étendons nos regards sur le temps qui s'avance , aussi-bien que sur le temps qui fuit. Sachons voir ce qui sera , dans ce qui a été ; et par une pensée hardie , créons , pour ainsi dire , l'avenir en portant le passé au-delà du point où nous sommes.

Dans cette admirable et immense suite d'événemens , quelle considération générale nous frappe la première ?

Les êtres commencent , s'accroissent , décroissent et finissent. L'augmentation et la diminution de leur masse , de leurs formes , de leurs qualités , composent seules leur durée particulière. Elles se succèdent sans intervalle. Autant la Nature est constante dans ses lois , autant elle est variable dans les effets qui en découlent. L'instabilité est de l'essence de la durée particulière des êtres ; et le néant en est le terme , comme il en a été le principe.

Le néant ! C'est donc à cet abîme qu'a-

boutissent et ce que nos sens nous découvrent dans le présent, et ce que la mémoire nous montre dans le passé, et ce que la pensée nous indique dans l'avenir. Tout s'efface, tout s'évanouit. Et ces dons si recherchés, la santé, la beauté, la force; et ces produits de l'industrie humaine, dont se composent les richesses, la supériorité, la puissance; et ces chefs-d'œuvre de l'art, que l'admiration reconnoissante a, pour ainsi dire, divinisés; et ces monumens superbes que le génie a voulu élever contre les efforts des siècles sur l'Asie, l'Afrique et l'Europe étonnées; et ces pyramides que nous nommons antiques, parce que nous ignorons combien de millions de générations ont disparu depuis que leur hauteur rivalise avec celle des montagnes; et ces résultats du besoin ou de la prévoyance du philosophe, les lois qui constituent les peuples, les institutions qui les protègent, les usages qui les régissent, les mœurs qui les défendent, la langue qui les distingue; et les nations elles-mêmes se répandant au-dessus des vastes ruines

des empires écroulés les uns sur les autres ; et les ouvrages en apparence si durables de la Nature , les forêts touffues , les Andes sourcilleuses , les fleuves rapides , les îles nombreuses , les continens , les mers , bien plus près de cesser d'être que la gloire du grand homme qui les illustre ; et cette gloire elle-même ; et le théâtre de toute renommée , le globe que nous habitons ; et les sphères qui se meuvent dans les espaces célestes ; et les soleils qui resplendissent dans l'immensité ; tout passe , tout disparoît , tout cesse d'exister.

Mais tout s'efface par des nuances variées comme les différens êtres ; tout tombe dans le gouffre de la non-existence , mais par des degrés très-inégaux ; et les divers êtres ne s'y engloutissent qu'après des durées inégales.

Ce sont ces durées particulières , si diversifiées et par leur étendue et par leur graduation , que l'on doit chercher à connoître.

Qu'il est important d'essayer d'en déterminer les époques !

Consacrons donc maintenant nos efforts

à nous former quelque idée de celle des espèces qui vivent sur le globe.

Quelle lumière plus propre à nous montrer leurs véritables traits , que celle que nous pourrions faire briller en traçant leurs annales !

Mais pour que nos tentatives puissent engager les amis de la science à conquérir cette belle partie de l'empire de la Nature , non seulement n'étendons d'abord nos recherches que vers la durée des espèces qui ont reçu le sentiment avec la vie , mais ne considérons en quelque sorte aujourd'hui que celle des espèces d'animaux pour lesquelles nous sommes aidés par le plus grand nombre de monumens déposés par le temps dans les premières couches de la terre , et faciles à découvrir , à décrire et à comparer.

Que l'objet principal de notre examen soit donc , dans ce moment , la durée de quelques unes des espèces dont nous avons entrepris d'écrire l'histoire : en rapprochant les uns des autres les résultats de nos efforts particuliers , en découvrant les ressemblances de ces résultats , en

tenant compte de leurs différences , en réunissant les produits de ces diverses comparaisons , en soumettant ces produits généraux à de nouveaux rapprochemens , et en parcourant ainsi successivement différens ordres d'idées , nous tâcherons de parvenir à quelques points de vue élevés d'où nous pourrons indiquer , avec un peu de précision , les différentes routes qui conduisent aux divers côtés du grand objet dont nous allons essayer de contempler une des faces.

Le temps nous échappe plus facilement encore que l'espace. L'optique nous a soumis l'univers : nous ne pouvons saisir le temps qu'en réunissant par la pensée les traces de ses produits et de ses ravages , en découvrant l'ordre dans lequel ils se sont succédés , en comptant les mouvemens semblables par lesquels ou pendant lesquels ils ont été opérés.

Mais pour employer avec plus d'avantage ce moyen de le conquérir , méditons un instant sur les deux grandes idées dont se compose notre sujet , *durée des espèces* ; tâchons de ne pas laisser de voile

au-devant de ces deux objets de notre réflexion ; déterminons avec précision notre pensée ; et d'abord distinguons avec soin la *durée de l'espèce* d'avec celle des individus que l'espèce renferme.

C'est un beau point de vue que celui d'où l'on compareroit la rapidité des dégradations d'une espèce qui s'avance vers la fin de son existence , avec la brièveté des instans qui séparent la naissance des individus , du terme de leur vie. Nous le recommandons , ce nouveau point de vue , à l'attention des naturalistes. En effet , ni les raisonnemens d'une théorie éclairée , ni les conséquences de l'examen des monumens , ne laissent encore entrevoir aucun rapport nécessaire entre la longueur de la vie des individus et la permanence de l'espèce. Les générations des individus paroissent pouvoir être moissonnées avec plus ou moins de vîtesse , sans que l'espèce ait reçu plus ou moins de force pour résister aux causes qui l'altèrent , aux puissances qui l'entraînent vers le dernier moment de sa durée. Un individu cesse de vivre quand ses organes

perdent leurs formes , leurs qualités , ou leurs liaisons ; une espèce cesse d'exister , lorsque l'effet de ses modifications successives fait évanouir ses attributs distinctifs : mais les formes et les propriétés dont l'ensemble constitue la vie d'un individu , peuvent être détruites ou séparées dans cet être considéré comme isolé , sans que les causes qui les désunissent ou les anéantissent , agissent sur les autres individus , qui dès-lors prolongent l'espèce jusqu'au moment où ils sont frappés à leur tour. D'ailleurs ces mêmes causes peuvent diminuer l'intensité de ces qualités , et altérer les effets de ces formes , sans les modifier dans ce qui compose l'essence de l'espèce ; et ces modifications qui dénaturent l'espèce , peuvent aussi se succéder , sans que les organes cessent de jouer avec assez de liberté et de force pour conserver le feu de la vie des individus.

Quels sont donc les caractères distinctifs des espèces ? ou pour mieux dire , *qu'est-ce qu'une espèce ?*

Tous ceux qui cultivent la science de

la Nature , emploient à chaque instant ce mot *espèce* , comme une expression très - précise. Ils disent que tel animal appartient à telle espèce , ou qu'il en est une variété passagère ou constante , ou qu'il ne peut pas en faire partie ; cependant combien peu de naturalistes ont une notion distincte du sens qu'ils attachent à ce mot , même lorsqu'ils ont donné des règles pour parvenir à l'appliquer ! Quelques auteurs l'ont défini ; mais si on déterminoit les limites des espèces d'après leurs principes , combien ne réuniroit-on pas d'êtres plus différens les uns des autres que ceux que l'on tiendrait séparés !

Que la lumière du métaphysicien conduise donc ici l'ami de la Nature.

Les individus composent l'espèce ; les espèces , le genre ; les genres , l'ordre ; les ordres , la classe ; les classes , le règne ; les règnes , la Nature.

Nous aurons fait un grand pas vers la détermination de ce mot *espèce* , si nous indiquons les différences qui se trouvent entre les rapports des individus avec

l'espèce , et ceux des espèces avec le genre.

Tous les individus d'une espèce peuvent se ressembler dans toutes leurs parties , et de manière qu'on ne puisse les distinguer les uns des autres qu'en les voyant à la fois ; les espèces d'un genre doivent différer les unes des autres par un trait assez marqué pour que chacune de ces espèces , considérée même séparément , ne puisse être confondue avec une des autres dans aucune circonstance.

L'idée de l'individu amène nécessairement l'idée de l'espèce : on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. Une espèce existeroit donc , quoiqu'elle ne présentât qu'un seul individu , et quand bien même on la supposeroit seule. On ne peut imaginer un genre avec une seule espèce , qu'autant qu'on le fait contraster avec un autre genre.

On doit donc rapporter à la même espèce deux individus qui se ressemblent en tout. Mais lorsque deux individus présentent des différences qui les distinguent , d'après quel principe faudra-

t-il se diriger pour les comprendre ou ne pas les renfermer dans la même espèce ? De quelle nature doivent être ces dissemblances offertes par deux êtres organisés, du même âge et du même sexe, pour qu'on les considère comme de deux espèces différentes ? Quel doit être le nombre de ces différences ? Quelle doit être la constance de ces signes distinctifs ? ou, pour mieux dire, quelles doivent être la combinaison ou la compensation de la nature, du nombre et de la permanence de ces marques caractéristiques ? En un mot, de quelle manière en doit-on tracer l'échelle ? Et lorsque cette mesure générale aura été graduée, par combien de degrés faudra-t-il que deux êtres soient séparés, pour n'être pas regardés comme de la même espèce ?

Il y a long-temps que nous avons tâché de faire sentir la nécessité de la solution de ces problèmes. Plusieurs habiles naturalistes partagent maintenant notre opinion à ce sujet. Nous pouvons donc concevoir l'espérance de voir réaliser le grand travail que nous désirons à cet égard,

Les principes généraux , fondés sur l'observation , dirigeront la composition et la graduation de l'échelle que nous proposons , et dont il faudra peut-être autant de modifications qu'il y a de grandes classes d'êtres organisés. Mais , nous sommes obligés de l'avouer , la détermination du nombre de degrés qui constituera la diversité d'espèce , ne pourra être constante et régulière qu'autant qu'elle sera l'effet d'une sorte de convention entre ceux qui cultivent la science. Et pourquoi ne pas proclamer une vérité importante ? Il en est de l'espèce comme du genre , de l'ordre et de la classe ; elle n'est au fond qu'une abstraction de l'esprit , qu'une idée collective , nécessaire pour concevoir , pour comparer , pour connoître , pour instruire. La Nature n'a créé que des êtres qui se ressemblent , et des êtres qui diffèrent. Si nous ne voulions inscrire dans une espèce que les individus qui se ressemblent en tout , nous pourrions dire que l'espèce existe véritablement dans la Nature et par la Nature. Mais les produits

de la même portée ou de la même ponte sont évidemment de la même espèce; et cependant combien de différences au moins superficielles ne présentent-ils pas très-fréquemment! Dès l'instant que nous sommes obligés d'appliquer ce mot *espèce* à des individus qui ne se ressemblent pas dans toutes leurs parties, nous ne nous arrêtons à un nombre de dissemblances plutôt qu'à un autre, que par une vue de l'esprit fondée sur des probabilités plus ou moins grandes; nous sommes dirigés par des observations comparées plus ou moins convenablement: mais nous ne trouvons dans la Nature aucune base de notre choix, solide, immuable, indépendante de toute volonté arbitraire.

En attendant que les naturalistes aient établi sur la détermination de l'espèce la convention la plus raisonnable, nous suivrons cette sorte de définition vague, ce résultat tacite d'une longue habitude d'observer, ce tact particulier, fruit de nombreuses expériences, qui a guidé jusqu'ici les naturalistes les plus recommandables par la variété de leurs connois-

sances et la rectitude de leur esprit. Et afin que cet emploi forcé d'une méthode imparfaite à quelques égards ne puisse jeter aucune défaveur sur les conséquences que nous allons présenter, nous restreindrons toujours dans des limites si étroites l'étendue de l'espèce, qu'aucune manière plus parfaite de la considérer ne pourra à l'avenir nous obliger à rapprocher davantage ces bornes, ni par conséquent à nous faire regarder comme appartenant à deux espèces distinctes, deux individus que nous aurons considérés comme faisant partie de la même.

Une espèce peut s'éteindre de deux manières.

Elle peut périr toute entière, et dans un temps très-court, lorsqu'une catastrophe violente bouleverse la portion de la surface du globe sur laquelle elle vivoit, et que l'étendue ainsi que la rapidité du mouvement qui soulève, renverse, transporte, brise et écrase, ne permettent à aucun individu d'échapper à la destruction. Ces phénomènes funestes sont des événemens que l'on peut consi-

dérer, relativement à la durée ordinaire des individus, et même des espèces, comme extraordinaires dans leurs effets, et irréguliers dans leurs époques. Nous ne devons donc pas nous servir de la comparaison de leurs résultats pour tâcher de parcourir la route que nous nous sommes tracée.

Mais, indépendamment de ces grands coups que la Nature frappe rarement et avec éclat, une espèce disparoît par une longue suite de nuances insensibles et d'altérations successives. Trois causes principales peuvent l'entraîner ainsi de dégradation en dégradation.

Premièrement, les organes qu'elle présente, peuvent perdre de leur figure, de leur volume, de leur souplesse, de leur élasticité, de leur irritabilité, au point de ne pouvoir plus produire, transmettre ou faciliter les mouvemens nécessaires à l'existence.

Secondement, l'activité de ces mêmes organes peut s'accroître à un si haut degré, que tous les ressorts tendus avec trop de force, ou mis en jeu avec trop

de rapidité , et ne pouvant pas résister à une action trop vive ni à des efforts trop fréquens , soient dérangés , réformés et brisés.

Troisièmement, l'espèce peut subir un si grand nombre de modifications dans ses formes et dans ses qualités , que , sans rien perdre de son aptitude au mouvement vital, elle se trouve, par sa dernière conformation et par ses dernières propriétés , plus éloignée de son premier état que d'une espèce étrangère : elle est alors métamorphosée en une espèce nouvelle. Les élémens dont elle est composée dans sa seconde manière d'être , sont de même nature qu'auparavant ; mais leur combinaison a changé : c'est véritablement une seconde espèce qui succède à l'ancienne ; une nouvelle époque commence : la première durée a cessé pour être remplacée par une autre ; et il faut compter les instans d'une seconde existence.

Maintenant si nous voulons savoir dans quel ordre s'opèrent ces diminutions , ces accroissemens , ces changemens de la

conformation de l'espèce , de ses propriétés , de ses attributs , si nous voulons chercher quelle est la série naturelle de ces altérations , et reconnoître la succession dans laquelle ces dégradations paroissent le plus liées les unes aux autres , nous trouverons que l'espèce descend vers la fin de sa durée par une échelle composée de douze degrés principaux.

Nous verrons au premier de ces degrés les modifications qu'éprouvent les tégumens dans leur contexture et dans les ramifications des vaisseaux qui les arrosent , au point d'influer sur la faculté de réfléchir ou d'absorber la lumière , et de changer par conséquent le ton ou la disposition des couleurs.

Ces modifications peuvent être plus grandes ; et alors les tégumens variant , non seulement dans les nuances dont ils sont peints , mais encore dans leur nature , offrent le second degré de la dégénération de l'espèce.

Le changement de la grandeur et celui des proportions offertes par les dimensions , constituent le troisième et le quatrième degré de l'échelle.

Au cinquième degré nous plaçons les altérations des formes extérieures ; au sixième , celles des organes intérieurs ; et nous trouvons au septième l'affoiblissement ou l'exaltation de la sensibilité dans les êtres qui en sont doués. Nous y découvrons par conséquent toutes les nuances de perfection ou d'hébétation que peuvent montrer le tact et le goût , ces deux sens nécessaires à tout être animé ; et nous y voyons de plus toutes les variétés qui résultent de la présence ou de l'absence de l'odorat , de la vue et de l'ouïe , et de toutes les diversités d'intensité que peuvent offrir ces trois sens moins essentiels à l'existence de l'animal.

Les qualités qui proviennent de ces grandeurs , de ces dimensions , de ces formes , de ces combinaisons de sens plus ou moins actifs et plus ou moins nombreux , appartiennent au huitième degré ; la force et la puissance que ces qualités font naître , constituent par leurs variations le neuvième degré de l'échelle des altérations que nous voulons étu-

dier ; et lorsque l'espèce parcourt , pour ainsi dire , le dixième , le onzième et le douzième degré de sa durée , elle offre des modifications successives , d'abord dans ses habitudes , ensuite dans les mœurs , qui se composent de l'influence des habitudes les unes sur les autres , et enfin dans l'étendue et la nature de son séjour sur le globe.

Lorsque les causes qui produisent cette série naturelle de pas faits par l'espèce vers sa disparition , agissent dans un ordre différent de celui qu'elles observent ordinairement , elles dérangent la succession que nous venons d'exposer : les changemens subis par l'espèce sont les mêmes ; mais les époques où ils se manifestent , ne sont plus coordonnées de la même manière.

La dépendance mutuelle de ces époques est encore plus troublée , lorsque l'Art se joint à la Nature pour altérer une espèce et en abrégier la durée.

L'Art , en effet , dont un des caractères distinctifs est d'avoir un but limité , pendant que la Nature a toujours

des points de vue immenses , franchit tout intervalle inutile au succès particulier qu'il desire , et auquel il sacrifie tout autre avantage. Il est , pour ainsi dire , de l'essence de l'Art , de tyranniser par des efforts violens les êtres que la Nature régit par des forces insensibles : et l'on s'en convaincra d'autant plus qu'on réfléchira avec quelque constance sur les différences que nous allons faire remarquer entre la manière dont la Nature fait succéder une espèce à une autre , et les moyens que l'Art emploie pour altérer celle sur laquelle il agit ; ce qu'il appelle la perfectionner , et ce qui ne consiste cependant qu'à la rendre plus propre à satisfaire ses besoins.

Lorsque la Nature crée dans les espèces , des rouages trop compliqués qui s'arrêtent , ou trop simples qui se dérangent ; des ressorts trop foibles qui se débandent , ou trop tendus qui se rompent ; des organes extérieurs trop disproportionnés par leur nombre , leur division , ou leur étendue , aux fonctions qu'ils doivent remplir ; des muscles trop

inertes , ou trop irritables ; des nerfs trop peu sensibles , ou trop faciles à émouvoir ; des sens soustraits par leur place et par leurs dimensions à une assez grande quantité d'impressions , ou trop exposés par leur épanouissement à des ébranlemens violens et fréquemment répétés ; et enfin , des mouvemens trop lents ou trop rapides ; elle agit par des forces foiblement graduées , par des opérations très-prolongées , par des changemens insensibles.

L'Art , au contraire , lorsqu'il parvient à faire naître des altérations analogues , les produit avec rapidité , et par une suite d'actions très-distinctes et peu nombreuses.

La Nature étend son pouvoir sur tous les individus ; elle les modifie en même temps et de la même manière ; elle change véritablement l'espèce.

L'Art , ne pouvant soumettre à ses procédés qu'une partie de ces individus , donne le jour à une espèce nouvelle , sans détruire l'ancienne : il n'altère pas , à proprement parler , l'espèce ; il la double.

Il ne dispose pas , comme la Nature , de l'influence du climat. Il ne détermine ni les élémens du fluide dans lequel l'espèce est destinée à vivre , ni sa densité ¹ , ni sa profondeur ² , ni la chaleur dont les rayons solaires ou les émanations terrestres peuvent le pénétrer , ni son humidité ou sa sécheresse ; en un mot , aucune des qualités qui , augmentant ou diminuant l'analogie de ce fluide avec les organes de la respiration , le rendent plus ou moins propre à donner aux sucs

¹ Tout égal d'ailleurs , un fluide reçoit et perd la chaleur avec d'autant plus de facilité que sa densité est moindre.

² Le savant et habile physicien baron de Humboltz a trouvé que l'eau de la mer a , sur tous les bas-fonds , une température plus froide de deux , trois ou quatre degrés , qu'au-dessus des profondeurs voisines. Cette observation est consignée dans une lettre adressée par ce célèbre voyageur , de Caraccas en Amérique , à mon confrère Lalande , et que cet astronome a bien voulu me communiquer.

nourriciers le mouvement vivifiant et réparateur *.

Lorsque la Nature fixe le séjour d'une

* Nous avons déjà montré, dans le premier Discours et dans plusieurs articles particuliers de cette Histoire, comment un fluide très-chaud, très-sec, ou composé de tel ou tel principe, pouvoit donner la mort aux animaux forcés de le respirer par un organe peu approprié, et par conséquent comment, lorsque l'action de ce fluide n'étoit pas encore aussi funeste, elle pouvoit cependant altérer les facultés, diminuer les forces, vicier les formes des individus, modifier l'espèce, en changer les caractères, en abrégér la durée. Au reste, nous sommes bien aises de faire remarquer que l'opinion que nous avons émise en appliquant ces principes à la mort des poissons retenus hors de l'eau, est conforme aux idées de physique adoptées dans la Grèce et dans l'Asie mineure dès le temps d'Homère, et recueillies dans l'un des deux immortels ouvrages de ce beau génie. Ce père de la poésie européenne compare en effet, dans le vingt-deuxième livre de son *Odyssée*, les poursuivans de Pénélope, défaits par Ulysse, à des poissons entassés sur un sable aride, regrettant les ondes qu'ils viennent de quitter, et palpitant par l'effet de la *chaleur* et de la *sécheresse* de l'*air*, qui bientôt leur ôtent la vie.

espèce auprès d'un aliment particulier, la quantité que les individus en consomment, n'est déterminée que par les besoins qu'ils éprouvent.

L'Art, en altérant les individus par la nourriture, contraint leur appétit, les soumet à des privations, ou les force à s'assimiler une trop grande quantité de substances alimentaires. La Nature ne commande que la qualité de ces mêmes alimens; l'Art en ordonne jusqu'à la masse.

Ce n'est qu'à des époques incertaines et éloignées, et par l'effet de circonstances que le hasard seul paroît réunir, que la Nature rapproche des êtres qui, remarquables par un commencement d'altération dans leur couleur, dans leurs formes ou dans leurs qualités, se perpétuent par des générations, dans la suite desquelles ces traits particuliers, que de nouveaux hasards maintiennent, fortifient et accroissent, peuvent constituer une espèce nouvelle.

La réunion des individus dans lesquels on apperçoit les premiers linéamens de la

nouvelle espèce que l'on desire de voir paroître , leur reproduction forcée , et le rapprochement des produits de leur mélange , qui offrent le plus nettement les caractères de cette même espèce , sont au contraire un moyen puissant , prompt et assuré , que l'Art emploie fréquemment pour altérer les espèces , et par conséquent pour en diminuer la durée.

La Nature change ou détruit les espèces en multipliant au-delà des premières proportions d'autres espèces prépondérantes , en propageant , par exemple , l'espèce humaine , qui donne la mort aux êtres qu'elle redoute et ne peut asservir , et relègue du moins dans le fond des déserts , dans les profondeurs des forêts ou dans les abîmes des mers , les animaux dangereux qu'elle ne peut ni enchaîner ni immoler.

L'Art seconde sans doute cet acte terrible de la Nature , en armant la main de l'homme de traits plus meurtriers ou de rets plus inévitables : mais d'ailleurs il attire , au lieu de repousser ; il séduit ,

au lieu d'effrayer; il trompe, au lieu de combattre; il hâte par la ruse les effets d'une force qui n'acqueroit toute sa supériorité que par une longue suite de générations trop lentes à son gré; il s'adresse aux besoins des espèces sur lesquelles il veut régner; il achète leur indépendance en satisfaisant leurs appétits; il affecte leur sensibilité; il en fait des voisins constants, ou des cohabitans assidus, ou des serviteurs affectionnés et volontaires, ou des esclaves contraints et retenus par des fers; et dans tous les degrés de son empire, il modifie avec promptitude les formes par l'aliment, et les qualités par l'imitation, par l'attachement ou par la crainte.

Mais pour mieux juger de tous les objets que nous venons d'exposer, pour mieux déterminer les changemens dans les qualités qui entraînent des modifications dans les habitudes, pour mieux reconnoître les variétés successives que peuvent présenter les formes, pour mieux voir la dépendance mutuelle des formes, des qualités et des mœurs, il faut consi-

dérer avec soin la nature de l'influence des diverses conformations.

Premièrement, il faut rechercher si la nouvelle conformation que l'on reconnoît, peut accroître ou diminuer d'une manière un peu remarquable les facultés de l'animal; si elle peut modifier sensiblement ses instrumens, ses armes, sa vitesse, ses vaisseaux, ses sucs digestifs, ses alimens, sa respiration, sa sensibilité, etc. Par exemple, un de nos plus habiles anatomistes modernes, mon confrère le citoyen Cuvier, a démontré qu'il existoit entre les éléphans d'Asie, ceux d'Afrique, et ceux dont les ossemens fossiles ont été entassés en tant d'endroits de l'Asie ou de l'Europe boréale, des différences de conformation assez grandes pour qu'ils doivent être considérés comme appartenant à trois espèces distinctes; et cependant des naturalistes ne pourroient pas se servir de cette belle observation pour contester à des géologues la ressemblance des habitudes et des besoins de l'éléphant d'Asie avec ceux que devoit offrir l'éléphant de Sibérie, puisque ce

même éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique présentent les mêmes facultés et les mêmes mœurs , quoique leurs formes soient pour le moins aussi dissemblables que celles des éléphants asiatiques et des éléphants sibériens.

Secondement , une forme particulière qui donne à un être une faculté nouvelle, doit être soigneusement distinguée d'une forme qui retrancheroit au contraire une ancienne faculté. La première peut n'interrompre aucune habitude ; la seconde altère nécessairement la manière de vivre de l'animal. On sera convaincu de cette vérité , si l'on réfléchit que , par exemple, la conformation qui doueroit une espèce du pouvoir de nager , ne la confinerait pas au milieu des eaux , tandis que celle qui la priveroit de cette faculté , lui interdirait un grand nombre de ses actes antérieurs. Ajoutons à cette considération importante , que la même conformation qui accroît une qualité essentielle dans certaines circonstances , peut l'affoiblir dans d'autres ; et pour préférer de citer les faits les plus analogues à l'objet

général de cet ouvrage, ne verroit-on pas aisément que les espèces aquatiques peuvent recevoir d'une tête alongée, d'un museau pointu, d'un appendice antérieur très-délié, en un mot d'un avant de très-peu de résistance, une natation plus rapide, lorsque l'animal ne s'en sert qu'au milieu de lacs paisibles, de fleuves peu impétueux, de mers peu agitées; mais que cette même conformation, en surchargeant leur partie antérieure, en gênant leurs mouvemens, en éloignant du centre de leurs forces le bout du levier qui doit contre-balancer l'action des flots, peut diminuer beaucoup la célérité de leur poursuite, ainsi que la promptitude de leurs évolutions, au milieu de l'océan bouleversé par la tempête?

Tâchons maintenant d'éclaircir ce que nous venons de dire, en particularisant nos idées, en appliquant quelques uns des principes que nous avons posés, en réalisant quelques unes des vues que nous avons proposées.

L'espèce humaine, ce grand et premier objet des recherches les plus im-

portantes , ne doit cependant pas être dans ce moment celui de notre examen particulier.

L'homme a créé l'art par son intelligence ; et bravant avec succès , par le secours de son industrie , presque toutes les attaques de la Nature , contre-balançant sa puissance , combattant avec avantage le froid , le chaud , l'humidité , la sécheresse , tous ses agens les plus puissans , parvenu à se garantir des impressions physiques , en même temps qu'il s'est livré aux sensations morales , il a gagné autant de stabilité dans les attributs des êtres vivans et animés , que de mobilité dans ceux qui font naître le sentiment , l'imagination et la pensée.

D'ailleurs , que savons-nous de l'histoire de cette espèce privilégiée ? Avons-nous découvert dans le sein de la terre quelques restes échappés aux ravages des siècles reculés , et qui puissent nous instruire de son état primitif * ? La Nature

* Consultez particulièrement à ce sujet un Mémoire très-judicieux et très-important que le savant Fortis vient de publier dans le *Journal de physique* de floréal an 8.

nous a-t-elle laissé quelques monumens qui nous révèlent les formes et les qualités qui distinguoient cette espèce supérieure dans les temps voisins de son origine ? A-t-elle transmis elle-même quelques documens de ces âges antiques témoins de sa première existence ? A-t-elle pu élever quelque colonne milliaire sur la route du temps , avant que plusieurs siècles n'eussent déjà donné à son intelligence tout son développement , à ses attributs toute leur supériorité , à son pouvoir toute sa prééminence ?

Si nous jetons les yeux sur l'une ou l'autre des trois races principales que nous avons cru devoir admettre dans l'espèce humaine * , que dirons-nous d'abord des modifications successives de la race nègre , de cette race africaine dont nous connoissons à peine les traits actuels , les

* J'ai exposé mes idées sur le nombre et les caractères distinctifs des différentes races et variétés de l'espèce humaine , dans le Discours d'ouverture du cours de zoologie que j'ai donné en l'an 6. Ce Discours a été imprimé chez le citoyen Plassan.

facultés, le génie, les habitudes, le séjour? Parlerons-nous de cette race mongole qui occupe, depuis le commencement des temps historiques, la plus belle et la plus étendue partie de l'Asie, mais qui, depuis des milliers d'années, constante dans ses affections, persévérante dans ses idées, immuable dans ses lois, dans son culte, dans ses sciences, dans ses arts, dans ses mœurs, ne nous montre l'espèce humaine que comme stationnaire, et, ne nous présentant aucun changement actuel, ne nous laisse soupçonner aucune modification passée?

Si nous considérons enfin la race arabe ou européenne, celle que nous pouvons le mieux connoître, parce qu'elle a le plus exercé ses facultés, cultivé son talent, développé son génie, entrepris de travaux, transmis de pensées, tracé de récits, effacé les distances des temps et des lieux par l'emploi des signes de la parole ou de l'expression du sentiment, parce qu'elle nous entoure de tous les côtés, parce que nous en faisons partie, quelle différence spécifique trouvons-nous, par exemple,

entre les Grecs des siècles héroïques et les Européens modernes? L'homme d'aujourd'hui possède plus de connoissances que l'homme de ces siècles fameux : mais il raisonne comme celui des premiers jours de la Grèce; mais il sent comme l'homme du temps d'Homère; et voilà pourquoi aucun poète ne surpassera jamais Homère; et voilà pourquoi aucun statuaire ne l'emportera sur l'auteur de l'Apollon Pythien, pendant que, le trésor des sciences recevant à chaque instant des faits nouveaux, il n'est point de savant du jour qui ne puisse être plus instruit que le Newton de la veille; et voilà pourquoi encore les progrès des arts pouvant être renfermés dans des limites déterminées comme les combinaisons des sentimens *, les chefs-d'œuvre qu'ils pro-

* Il faut faire une exception relativement aux arts, tels que la peinture, la musique, etc. dont les procédés, en se perfectionnant chaque jour, multiplient les moyens d'exécution, et par conséquent le nombre des créations possibles.

Il est d'ailleurs évident que cette détermination de limites n'a point lieu pour les arts, lorsqu'en

duisent peuvent parvenir à la postérité avec la gloire de leurs auteurs , pendant que , les progrès des sciences devant être sans limites , comme les combinaisons des faits et des pensées , les découvertes sont impérissables , ainsi que la renommée des hommes de génie auxquels on les doit : mais les ouvrages mêmes de ces hommes fameux passent presque tous , et sont remplacés par d'autres , à moins que le style qui les a tracés , et qui appartient à l'art , ne les sauve de cette destinée et ne leur donne l'immortalité.

Les animaux qui ressemblent le plus à l'homme , les mammifères , les oiseaux , appliquant leur puissance à de nouveaux objets , en combinant leurs produits , et en leur donnant , pour ainsi dire , par ces opérations , la nature des sciences , le génie les rend propres à exprimer un plus grand nombre de sentimens , à peindre des sujets plus variés ou plus nombreux , à présenter de plus vastes tableaux , à toucher par conséquent avec plus de force , et à faire naître des impressions plus durables. Voyez ce que nous avons dit , à cet égard , dans la *Poétique de la musique* , imprimée en 1785.

les quadrupèdes ovipares et les serpens , ne seront pas non plus les sujets des réflexions par lesquelles nous terminerons ce Discours : nous préférerons d'appliquer les idées que nous venons d'émettre , à ceux qui , dans la progression de simplicité des êtres , suivent ces animaux , lesquels , de même que l'homme , respirent par des poumons. En nous arrêtant aux poissons pour les considérations qu'il nous reste à présenter , nous attacherons notre attention à des animaux dont non seulement cet ouvrage est destiné à faire connoître l'histoire , mais encore qui vivent dans un fluide particulier , où ils sont exposés à moins de circonstances perturbatrices , de variations subites et funestes , d'accidens extraordinaires , et qui d'ailleurs , par une suite de la nature de leur séjour , de la date de leur origine , de la contexture solide et résistante du plus grand nombre de leurs parties , et de la propriété qu'ont ces mêmes portions de se conserver dans le sein de la terre au moins pendant un temps assez long pour y former une

empreinte durable, ont dû laisser, et ont laissé en effet, des monumens de leur existence passée, bien plus nombreux et bien plus faciles à reconnoître, que presque toutes les autres classes des êtres vivans et sensibles.

Nous avons compté douze modifications principales par lesquelles une espèce peut passer de dégradation en dégradation, jusqu'à la perte totale de ses caractères distinctifs, de son essence, et par conséquent de l'existence proprement dite.

Parcourons ces modifications.

Nous avons chaque jour sous les yeux des exemples d'espèces de poissons qui, transportées dans des eaux plus troubles ou plus claires, plus lentes ou plus rapides, plus chaudes ou plus froides, non seulement se montrent avec des couleurs nouvelles, mais éprouvant encore des changemens plus marqués dans leurs tegumens, baignées, attaquées et pénétrées par un fluide différent de celui qui les arrosoit, présentent des écailles, des verrues, des tubercules, des aiguillons

très-peu semblables par leur figure, leur dureté, leur nombre ou leur position, à ceux dont ils étoient revêtus. Il est évident que ces modifications produites dans le même temps et dans un lieu différent, ont pu et dû naître dans un temps différent et dans le même lieu, et contribuer par conséquent, dans la suite des siècles, à diminuer la durée de l'espèce, aussi-bien qu'à restreindre les limites de son habitation lors d'une époque déterminée.

Si l'on rappelle ce que nous avons dit dans les articles particuliers du *requin* et du *squale roussette*, sur la grandeur de ces espèces à une époque un peu reculée, on les verra nous offrir deux exemples bien frappans de la cinquième modification qu'une espèce peut subir, c'est-à-dire, de la diminution de grandeur qu'elle peut éprouver. En effet, on doit en conclure que les requins dont on a conservé des restes, et dont nous avons mesuré des dents trouvées dans le sein de la terre, l'emportoient sur les requins actuels par leur grandeur proprement dite, c'est-à-dire par leur masse, par

l'ensemble de leurs dimensions , dans le rapport de 343 à 27. Leur grandeur a donc été réduite au douzième au moins de son état primitif. Une réduction plus frappante encore a été opérée dans l'espèce de la roussette , puisque nous avons donné les moyens de voir que des dents de ce squalé , découvertes dans des couches plus ou moins profondes du globe , devoient avoir appartenu à des individus d'un volume dix-neuf cent cinquante-trois fois plus grand que celui des roussettes qui infestent maintenant les rivages de l'Europe. Et relativement à ces deux exemples des altérations dans les dimensions que peuvent offrir les espèces d'animaux , nous avons deux considérations à proposer. Premièrement , la diminution subie par la roussette a été à proportion 166 fois plus grande que celle du requin , et cependant , au point où cette dégradation a commencé , le volume du requin n'étoit pas trois fois plus considérable que celui de la roussette. Il est à présumer que si , à cette époque , il avoit été six ou huit fois supérieur , la modifica-

tion imposée à la roussette auroit été plus grande encore, proportionnellement à celle du requin. En général, on ne sauroit faire trop d'attention à un principe très-important, que nous ne cesserons de rappeler : les forces de la Nature, celles qui détruisent comme celles qui produisent, celles qui troublent comme celles qui maintiennent, agissent très-souvent, et tout égal d'ailleurs, en raison des surfaces, soit extérieures, soit intérieures, des corps qu'elles attaquent ou régissent; mais tout le monde sait que plus les corps sont petits, et plus à proportion leurs surfaces sont étendues. Il ne faut donc pas être étonné de voir les grands volumes opposer une résistance bien plus longue proportionnellement que celle des petits, aux causes qui tendent à restreindre leurs dimensions dans des limites plus rapprochées. Secondement, il est curieux d'observer que les deux espèces qui ont perdu, l'une les onze douzièmes, et l'autre une portion bien plus étonnante encore de ses dimensions primitives, sont des espèces marines, et par

conséquent ont dû être exposées à un nombre de causes altérantes d'autant moins grand, que la température et la nature des eaux des fleuves sont bien plus variables que celles de l'océan, et que, s'il faut admettre les conjectures les plus généralement adoptées, toutes les espèces de poissons ayant commencé par appartenir à la mer, les fluviatiles ont été exposées à une sorte de crise assez forte et à des changemens très-marqués, lorsqu'elles ont abandonné les eaux salées pour aller séjourner au milieu des eaux douces.

Les exemples des proportions changées et des formes altérées, soustraites ou introduites dans une espèce, à mesure qu'elle se dégrade et s'avance vers le terme de sa durée, peuvent être saisis avec facilité dans les diverses empreintes qu'ont laissées des individus de différens genres, enfouis par des catastrophes subites.

Il n'en est pas de même de la sixième et de la septième modification générale : des hasards très-rares peuvent seuls con-

server des individus dans un tel état d'intégrité, ou de destruction commencée et de dissection naturelle, qu'on puisse reconnoître la forme de leurs organes intérieurs, et celle des parties de leur corps dans lesquelles résidoient les sens dont ils avoient été doués.

Il est encore plus difficile de remonter à la connoissance des qualités, de la force, des habitudes, des mœurs qui distinguoient une espèce à une époque plus ou moins enfoncée dans les âges écoulés. Ces propriétés ne sont que des résultats dont l'existence peut sans doute être l'objet de conjectures plus ou moins vraisemblables, inspirées par l'inspection des formes qui les ont produits, mais sur la nature desquels nous n'avons cependant de notions précises que lorsque des observateurs habiles ont recueilli ces notions et les ont transmises avec fidélité.

La détermination des endroits dans lesquels habitoit une espèce dans les temps anciens, est au contraire plus facile que celle de toutes les modifications dont nous venons de parler. Les

traces que des individus laissent de leur existence , doivent être distinctes jusqu'à un certain degré , pour qu'on puisse , en les examinant , reconnoître dans leurs détails les dimensions et les formes de ces individus ; mais un très-foible vestige suffit pour constater la place où ils ont péri , et par conséquent celle où ils avoient vécu.

Cette douzième modification des espèces , cette limitation de leur séjour à telle ou telle portion de la surface de la terre , peut être liée avec une ou plusieurs des autres altérations dont nous avons tâché d'exposer l'ordre ; et elle peut en être indépendante. Il en résulte premièrement des espèces altérées dans leurs qualités , dans leurs formes ou dans leurs dimensions , et reléguées dans telle ou telle contrée ; secondement , des espèces modifiées trop peu profondément dans leur conformation pour que leurs propriétés aient éprouvé un changement sensible , non altérées même dans leurs formes ou dans leurs dimensions , et cependant confinées sous tel ou tel climat ;

et troisièmement , des espèces dégradées dans leurs qualités , ou seulement dans leurs formes , mais habitant encore dans les mêmes parties du globe qu'avant le temps où leur métamorphose n'avoit pas commencé.

Nous avons assez parlé de ces dernières.

Quant aux autres espèces , combien ne pourrions-nous pas en citer ! Ici les exemples nous environnent. Le seul mont volcanique de Bolca , auprès de Vérone , a déjà montré sur ses couches entr'ouvertes , des fragmens très-bien conservés et très-reconnoissables d'une ou deux raies , de deux gobies , et de plusieurs autres poissons qui ne vivent aujourd'hui que dans les mers de l'Asie , de l'Afrique , ou de l'Amérique méridionale , dont plusieurs traits sont altérés , et qui cependant offrent les caractères qui constituoient leur espèce , lorsque , réunis en troupes nombreuses vers le fond de la mer Adriatique , une grande catastrophe les surprit au milieu de leurs courses , de leurs poursuites , de leurs combats , et , leur donnant la mort la plus prompte , les ense-

velit au-dessous de produits volcaniques, de substances préservatrices, et de matières propres à les garantir des effets de l'humidité ou de tout autre principe corrupteur *.

De plus, parmi les espèces qui n'ont subi, au moins en apparence, aucune modification dans leurs formes, ni dans leurs proportions, ni dans leur grandeur, ni dans leurs tégumens, nous comptons

* Nous avons dit plus d'une fois que M. le comte de Gazola a commencé de donner au public un grand ouvrage sur les poissons pétrifiés, conservés ou empreints dans les couches du mont Bolca. Si ce savant recommandable, auquel je suis heureux de pouvoir témoigner souvent mon estime, ne termine pas son importante entreprise, je tâcherai d'arranger mes travaux de manière à le suppléer en partie, en publiant la figure, la description et la comparaison des poissons fossiles, ou des empreintes de poissons, trouvés dans ce même mont Bolca, recueillis à Vérone avec un soin très-éclairé, apportés au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et formant aujourd'hui une des parties les plus précieuses de l'immense et riche collection de la république françoise.

une fistulaire du Japon ou de l'Amérique équatoriale , enfouie sous des couches schisteuses du centre de l'Europe ; un pégase de l'Inde , deux ou trois chétodons de l'Inde ou du Bresil , et des individus de plus de trente autres espèces de l'Asie , de l'Afrique , ou des rivages les plus chauds de l'Amérique , saisis entre les lits solidifiés de ce même mont Bolca , si digne d'attirer notre attention.

Nous venons de porter rapidement nos regards , premièrement , sur les espèces altérées dans leurs organes , et repoussées loin du séjour qu'elles avoient autrefois préféré ; secondement , sur les espèces non altérées , mais reléguées ; troisièmement , sur les espèces altérées , et non confinées dans une portion du globe différente de celle qu'elles avoient occupée : il nous reste à considérer un instant celles qui n'ont été ni dégradées , ni chassées de leur ancienne patrie , dont nous trouvons des individus , ou des fragmens , ou des empreintes très-reconnoissables , au-dessous des mêmes couches terrestres que l'une des dernières catastrophes du

globe a étendues au-dessus des espèces que nous avons déjà indiquées , et qui , par conséquent , ont résisté , avec plus de facilité que ces dernières , aux diverses causes qui modifient les espèces et en précipitent la durée.

Contentons-nous cependant , pour ne pas entrer dans des discussions particulières que les bornes de ce Discours nous interdisent , et sur lesquelles nous reviendrons un jour , de jeter les yeux sur deux de ces endroits remarquables du globe qui ont fourni à l'étude du naturaliste les empreintes les plus nettes ou les restes les mieux conservés d'un grand nombre d'espèces de poissons. Ne citons que les environs du Bolca Véronois , et ceux d'Æningen auprès du lac de Constance *.

* Voyez ce que le célèbre Saussure a écrit au sujet de la carrière d'Æningen , et des poissons dont l'intérieur de cette carrière renferme les restes ou les images ; on trouvera la description qu'en donne cet habile naturaliste , au paragraphe 1533 du tome III de son *Voyage dans les Alpes*. Le nom de ce grand géologue rappelle à mon ame affligée les travaux , la gloire et les malheurs de son illustre

Nous trouvons dans les carrières d'Ænningen ou de Bolca le pétromyzon pricka, le squalé requin, la murène anguille, le scombrequin, le caranx trachure, le cotto chabot, la trigle malarma, la trigle milan, le pleuronecte carrelet, le cobite loche, le cobite barbotte, le salmone fario, l'ésoce brochet, l'ésoce bélone, la clupée alose, la clupée hareng, le cyprin carpe, le cyprin goujon, le cyprin tanche, et douze autres cyprins, l'hamburge, le céphale, le vaudois, la dobule, le grislagine, le spirin, le bouvier, l'able, la brème, le véron, le roux et le nez.

ami, de son savant émule, mon collègue Dolomieu, qui, depuis dix-huit mois, lutte avec une constance héroïque contre une affreuse captivité, que n'ont pu faire cesser encore les pressantes réclamations de notre patrie qu'il honore, de notre gouvernement qui l'estime, de plusieurs puissances étrangères qui partagent pour lui l'intérêt des François, du roi d'Espagne, qui manifeste ses sentimens à cet égard de la manière la plus digne de la nation qu'il gouverne, et d'un si grand nombre de ceux qui, en Europe, chérissent et font vénérer l'antique loyauté, les vertus et les grands talens.

Tous ces poissons vivent encore dans les diverses mers européennes qui entourent, pour ainsi dire, et le lac de Constance et le territoire vénitien ; et la comparaison la plus exacte ne feroit remarquer entre les individus que l'on pêcheroit dans ces mers européennes, et ceux qui sont encore gisans sous les couches d'Æningen ou du Bolca, aucune différence plus grande que celles qui séparent souvent des produits de la même ponte.

La limite de toutes les altérations que nous venons de décrire, est l'anéantissement de l'espèce.

Pendant que nous avons sous les yeux un si grand nombre de poissons qui ont résisté aux causes perturbatrices de leurs formes, de leurs qualités et de leurs habitudes, n'avons-nous pas aussi à considérer des exemples de leurs extrêmes, c'est-à-dire, d'espèces qui, par une suite de dégradations, se sont entièrement éteintes ?

Il paroît qu'on peut citer quelques unes de ces espèces perdues. Les voyageurs, les naturalistes, les pêcheurs, ne re-

trouvent , du moins dans aucune mer , ni dans aucune rivière , ni dans aucun lac , quelques poissons dont le corps presque tout entier a frappé les regards des observateurs qui ont examiné avec attention les pierres extraites des environs du Bolca , ou d'autres contrées du globe. Il semble qu'on doit particulièrement indiquer deux espèces décrites par le savant Gazola , dans le bel ouvrage qu'il a commencé de publier sur les poissons pétrifiés du Véronois , et dont nous avons déjà eu occasion de faire mention. Ces deux espèces sont , premièrement , celle qu'il nomme *uranoscope rateau* (*uranoscopus rastrum*), et secondement , celle qu'il désigne par la dénomination de *kurte porte-voile* (*kurtus velifer*). Après les avoir examinées avec beaucoup de soin , j'ai même cru qu'elles différoient assez des espèces connues et actuellement vivantes , pour qu'on ne dût les rapporter à aucun de leurs genres ; et en conséquence ce *rateau* et ce *porte-voile* ne sont à mes yeux ni un véritable *uranoscope* , ni un véritable *kurte*.

Je ne balancerois pas non plus à regar-

der comme une espèce éteinte, celle de quelques autres animaux conservés dans l'intérieur des pièces de la collection ichthyolithologique de Vérone qui ont été adressées au Muséum d'histoire naturelle de France, et notamment un chétodon (à filament dorsal, double et très-long) dont j'ai vu plusieurs exemplaires conservés d'une manière très-curieuse.

Cependant ce n'est qu'avec une grande réserve que nous devons dire qu'une espèce a terminé sa durée : nous ne connaissons pas assez la surface du globe, ni les mers qui l'entourent, pour prononcer formellement qu'on ne trouvera dans aucune eau douce, ni dans aucun parage, des analogues très-ressemblans des individus fossiles que nous n'avons pu encore inscrire dans aucune espèce décrite et vivante.

En effet, il nous reste à découvrir d'immenses contrées situées à des distances plus ou moins grandes de la ligne, dans l'un et l'autre hémisphère, et notamment l'intérieur de la nouvelle Hollande et de la terre de Diémen, celui

de la nouvelle Guinée et de la Louisiade , le vaste plateau du milieu de l'Afrique , compris entre le tropique du capricorne et le dixième degré de latitude boréale , et cette longue bande qui s'étend dans la partie occidentale de l'Amérique septentrionale , au nord du nouveau Mexique , commence près du quarantième degré de latitude , s'avance pendant un grand nombre de degrés vers le nord , et règne sur une largeur de plus de soixante-dix myriamètres entre la lisière encore très-peu connue qui touche le rivage de la mer , et cette chaîne de montagnes très-élevées , nommées maintenant *stony mountains* , dont nous avons conjecturé l'existence , la position , la direction et la hauteur * , et qui vont depuis Cattana-Howes , où le voyageur

* Dans un mémoire sur les parties du globe encore inconnues , que je lus dans la séance publique de la société philotechnique , le 20 floréal de la même année , et que mon célèbre collègue , le citoyen Fourcroy , voulut bien lire quelques jours après dans une séance publique du Lycée républicain de Paris.

anglois M. Fidler est parvenu en 1792, jusqu'au bord occidental de l'embouchure dans l'Océan glacial arctique, de la rivière vue par M. Kensie le 12 juillet 1789*.

Mais n'avons-nous pas encore à reconnoître presque toute la côte occidentale et une partie de la côte du nord de la nouvelle Hollande, plusieurs rivages du nord-est de l'Asie et des îles qui en sont voisines, presque tous les points de la côte orientale et de la côte occidentale de l'Afrique, depuis une distance assez petite du cap de Bonne-Espérance jusqu'auprès de la ligne équinoxiale, et par conséquent dans une étendue de plus de sept cents myriamètres ?

Combien de fleuves, combien de lacs, combien de parages inconnus ! Combien ces habitations qui se sont jusqu'à présent dérobées à nos recherches, peuvent renfermer d'espèces plus ou moins ana-

* Consultez une carte très-intéressante d'une grande partie de l'Amérique septentrionale, présentée à la compagnie angloise d'Hudson par M. Arrowsmith, et dont la guerre nous a empêchés d'avoir connoissance avant l'année dernière.

logues à celles dont des individus vivans , ou des restes fossiles , ont été l'objet de nos descriptions !

Cependant élevons - nous encore plus haut au-dessus des objets que nous venons de contempler.

Avons-nous quelque moyen de juger de l'ancienneté de ces modifications dont nous venons d'examiner les caractères et d'indiquer la succession ? Ne pouvons-nous pas du moins déterminer quelques époques pendant lesquelles subsistoient encore ou existoient déjà une ou plusieurs de ces modifications ? L'espèce humaine , trop récente sur le globe , n'a pas pu observer les durées des diverses nuances de ces altérations , et compter pendant le cours de ces durées le nombre des périodes lunaires ou solaires qui se sont succédées. Mais la Nature n'a-t-elle pas gravé sur le globe quelques ères auxquelles nous pourrions au moins rapporter une partie de ces manières d'être des espèces ?

Nous ne mesurerons pas le temps par le retour d'un corps céleste au même point

du ciel , mais par ces bouleversemens terribles qui ont agi sur notre planète plus ou moins profondément.

Nous n'appliquerons pas l'existence des dégradations des espèces à des temps réguliers et déterminés comme les années ou les siècles ; mais nous verrons leur concordance avec des événemens dont on connoît déjà les relations des époques , en attendant qu'on ait dévoilé leur ancienneté absolue.

Ici le flambeau de la géologie nous aide à répandre quelque clarté au milieu de la nuit des temps.

Elle nous montre comment , en pénétrant dans les couches du globe , et en examinant l'essence ainsi que le gisement des minéraux qui les composent , nous pouvons savoir si nous avons sous les yeux des monumens de l'une ou de l'autre des trois époques que l'on doit distinguer dans la suite des catastrophes les moins anciennes de notre terre , les seules qu'il nous soit permis de reconnoître de loin.

La moins récente de ces révolutions est le dernier bouleversement général que

notre globe a éprouvé , et qui a laissé de profondes empreintes sur l'universalité de la surface de la terre.

Après cette catastrophe universelle , il faut placer dans l'ordre des temps les bouleversemens moins étendus, qui n'ont répandu leurs ravages que sur une grande partie du globe.

L'on ne peut pas , dans l'état actuel des connoissances humaines , déterminer les rapports des dates de ces événemens particuliers : on ne peut que les attacher tous à la seconde époque , sans leur assigner à chacun une place fixée avec précision sur la route du temps.

A la troisième époque , nous mettons les bouleversemens circonscrits comme les seconds , et qui de plus présentent les caractères distinctifs de l'action terrible et destructive des volcans , des feux souterrains , des foudres et des ébranlemens électriques de l'intérieur du globe.

Maintenant si nous voulons appliquer un moment ces principes , nous reconnoîtrons que nous ne pouvons encore rapporter à une de ces époques qu'un petit

nombre des modifications par lesquelles les espèces tombent , de dégradation en dégradation , jusqu'à la non-existence.

Nous pouvons dire que le temps où , par exemple , le genre des squales présente une grandeur si supérieure à celle des squales observés de nos jours , et où le volume de l'une de leurs espèces l'emportoit près de deux mille fois sur le volume qu'elle offre maintenant , appartient à la seconde des époques que nous venons d'indiquer , et a touché celui où le globe a éprouvé le dernier des bouleversemens non universels et non volcaniques qui aient altéré sa surface auprès de la chaîne des Pyrénées , dont les environs nous ont montré les restes de ces grandes espèces marines , si réduites maintenant dans leurs dimensions.

Nous pouvons assurer également que , lors des convulsions de la terre , des éruptions volcaniques , des vastes incendies et des orages souterrains , dont les effets redoutables se montrent encore si facilement à des yeux exercés et attentifs , auprès de Venise et de l'extrémité

de la mer Adriatique, plusieurs espèces, dont les flancs du mont Bolca recèlent les empreintes ou la dépouille, n'avoient pas éprouvé les dégradations dont nous pouvons compter toutes les nuances, ou n'avoient pas encore été reléguées dans les mers chaudes de l'Asie, de l'Afrique ou de l'Amérique méridionale, ou se montroient déjà avec tous les traits qu'elles présentent, ainsi que dans les contrées qu'elles habitent aujourd'hui; et enfin, que celles que l'on seroit tenté de considérer comme éteintes, et que du moins on n'a encore retrouvées dans aucun fleuve, dans aucun lac, dans aucune mer, figuroient encore dans l'ensemble des êtres sortis des mains de la puissance créatrice.

Lorsque la science aura étendu son domaine, que de nouveaux observateurs auront parcouru dans tous les sens les terres et les mers, que le génie aura conquis le monde, qu'il aura découvert, compté, décrit et comparé et les êtres qui vivent et les fragmens de ceux dont il ne reste que des dépouilles,

qu'il connoîtra et ce qui est et une partie de ce qui a été , qu'au milieu des monts escarpés , sur les rivages de l'Océan , dans le fond des mines et des cavernes souterraines , il interrogera la Nature au nom du Temps , et le Temps au nom de la Nature , quelles comparaisons fécondes ne naîtront pas de toutes parts ! quels admirables résultats ! quelles vérités sublimes ! quels immenses tableaux ! quel nouveau jour se levera sur l'état primitif des espèces , sur les rapports qui les lioient dans ces âges si éloignés du nôtre , sur leur nombre plus petit à cette époque antique , sur leurs grandeurs plus rapprochées , sur leurs traits plus différens , sur leurs habitudes plus dissemblables , sur leurs alliances plus difficiles , sur leurs durées plus longues ! O heureuse postérité ! à combien de jouissances n'es-tu pas réservée , si les passions funestes , l'ambition délirante , la vile cupidité , le dédain de la gloire , l'ignorance présomptueuse , et la fausse science , plus redoutable encore , n'enchaînent tes nobles destinées !

VINGT-CINQUIÈME GENRE.

LES TRICHIURES.

Point de nageoire caudale; le corps, et la queue très-alongés, très-comprimés, et en forme de lame; les opercules des branchies placés très-près des yeux.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. LE TRICHIURE
LEPTURE. | { La mâchoire inférieure plus
avancée que la supérieure. |
| 2. LE TRICHIURE
ÉLECTRIQUE. | { Les deux mâchoires égale-
ment avancées. |
-

LE TRICHIURE LEPTURE *.

LES trichiures sont encore de ces poissons apodes qui ne présentent aucune nageoire à l'extrémité de la queue. On les sépare cependant très-aisément de ces osseux qui n'ont pas de véritable nageoire caudale. En effet, leur corps très-allongé et très-comprimé ressemble à une lame d'épée, ou, si on le veut, à un ruban; et voilà pourquoi le lepture, qui réunit à cette conformation la couleur et l'éclat de l'argent, a été nommé *ceinture d'argent*, ou *ceinture argentée*. D'ailleurs les opercules des branchies sont placés beaucoup plus près des yeux sur les trichiures que sur les autres poissons avec lesquels on pourroit les confondre.

A ces traits généraux réunissons les

* *Trichiurus lepturus*; *paille-en-cul*, par plusieurs voyageurs et naturalistes.



1. *TRICHIURE* *Lepture* .
2. *ODONTOGNATHE* *Aiguallone* .
3. *KURTE* *Blochien* .



traits particuliers du lepture, et voyons, si je puis employer cette expression, cette bande argentine et vivante se dérouler, pour ainsi dire, s'agiter, se plier, s'étendre, se raccourcir, s'avancer en différens sens, décrire avec rapidité mille courbes enlacées les unes dans les autres, monter, descendre, s'élancer, et s'échapper enfin avec la vitesse d'une flèche, ou plutôt, en quelque sorte, avec celle de l'éclair.

La tête du lepture est étroite, allongée, et comprimée comme son corps et sa queue. L'ouverture de sa bouche est grande. Ses dents sont mobiles, au moins en très-grand nombre; et ce caractère que nous avons vu dans les squales, et par conséquent dans les plus féroces des cartilagineux, observons d'avance que nous le remarquerons dans la plupart des osseux qui se font distinguer par leur voracité. Indépendamment de cette mobilité qui donne à l'animal la faculté de présenter ses crochets sous l'angle le plus convenable, et de retenir sa proie avec plus de facilité, plusieurs des dents des

mâchoires du lepture , et particulièrement celles qui avoisinent le bout du museau , sont longues et recourbées vers leur pointe ; les autres sont courtes et aiguës. On n'en voit pas sur la langue , ni sur le palais ; mais on en apperçoit de très-petites sur deux os placés vers le gosier.

Les yeux sont grands , très-rapprochés du sommet de la tête , et remarquables par un iris doré et bordé de blanc autour de la prunelle.

L'opercule , composé d'une seule lame , et membraneux dans une partie de son contour , ferme une large ouverture branchiale *. Une ligne latérale couleur d'or s'étend sans sinuosités depuis cet opercule jusqu'à l'extrémité de la queue. L'anüs est assez près de la tête.

Les nageoires pectorales sont très-petites et ne renferment que onze rayons ; mais la nageoire dorsale en comprend ordinairement cent dix-sept , et règne

* On compte sept rayons à la membrane des branchies.

depuis la nuque jusqu'à une très-petite distance du bout de la queue.

On ne voit pas de véritable nageoire de l'anús : à la place qu'occuperoit cette nageoire, on trouve seulement de cent à cent vingt, et le plus souvent cent dix aiguillons très-courts, assez éloignés les uns des autres, dont la première moitié, ou à peu près, est recourbée vers la queue, et dont la seconde moitié est fléchie vers la tête.

La queue du lepture, presque toujours très-déliée et terminée par une sorte de prolongation assez semblable à un fil ou à un cheveu, a fait donner à ce poisson le nom de *lepture*, qui signifie *petite queue*, ainsi que celui de *trichiure*, qui veut dire *queue en cheveu*, et que l'on a étendu, comme nom générique, à toute la petite famille dont nous nous occupons. Cependant, comme cette queue très-longue est en même temps assez comprimée pour avoir été comparée à une lame, comme le corps et la tête présentent une conformation semblable, et que tous les muscles de l'animal paroissent doués d'une énergie

très-soutenue , on supposera sans peine dans le lepture une mobilité rare , une natation très-rapide , une grande souplesse dans les mouvemens , pour peu que l'on rappelle ce que nous avons déjà exposé plus d'une fois sur la cause de la natation célère des poissons *. Et en effet , les voyageurs s'accordent à attribuer au lepture une agilité singulière et une

* La collection du Muséum renferme une variété de lepture , qu'il est aisé de distinguer par la forme du bout de la queue. Cette partie , au lieu de se terminer par une prolongation filamenteuse , paroît comme tronquée assez loin de sa véritable extrémité ; elle présente , à l'endroit où elle finit , une ligne droite et verticale. Et quoique nous ayons vu deux individus avec cette conformation particulière , nous ne savons pas si , au lieu d'une variété plus ou moins constante , nous n'avons pas eu uniquement sous les yeux deux produits d'accidens semblables ou analogues , deux résultats d'une sorte d'amputation extraordinaire , dont on trouve plusieurs exemples parmi les animaux à sang froid , qu'ils peuvent subir sans en périr , et qui , pour les deux individus dont nous parlons , auroit emporté la portion la plus délicate de leur queue.

vélocité extraordinaire. S'agitant presque sans cesse par de nombreuses sinuosités, ondulant en différens sens, serpentant aussi facilement que tout autre habitant des eaux, il s'élève, s'abaisse, arrive et disparoît avec une promptitude dont à peine on peut se former une idée. Frappant violemment l'eau par ses deux grandes surfaces latérales, il peut se donner assez de force pour s'élancer au-dessus de la surface des fleuves et des lacs; et comme il est couvert par-tout de très-petites écailles blanches et éclatantes, et, si je puis parler ainsi, d'une sorte de poussière d'argent que relève l'or de ses iris et de ses lignes latérales, il brille et dans le sein des ondes, et au milieu de l'air, particulièrement lorsque, cédant à sa voracité qui est très-grande, animé par une affection puissante, ajoutant par l'effet de ses mouvemens à la vivacité de ses couleurs, et déployant sa riche parure sous un ciel enflammé, il jaillit de dessus les eaux, et, poursuivant sa proie avec plus d'ardeur que de précautions, saute jusque dans les barques et au milieu des

pêcheurs. Cette bande d'argent si décorée , si élastique , si vive , si agile , a quelquefois plus d'un mètre de longueur.

Le lepture vit au milieu de l'eau douce. On le trouve , comme plusieurs gymnotes , dans l'Amérique méridionale. Il n'est pas étranger néanmoins aux contrées orientales de l'ancien continent : il se trouve dans la Chine ; et nous avons vu une image très-fidèle de ce poisson dans un recueil de peintures chinoises données par la république batave à la république françoise , déposées maintenant dans le Muséum national d'histoire naturelle , et dont nous avons déjà parlé dans cet ouvrage.

Au reste , la beauté et la vivacité du lepture sont si propres à plaire aux yeux , à parer une retraite , à charmer des loisirs , qu'il n'est pas surprenant que les Chinois l'aient remarqué , observé , dessiné ; et vraisemblablement ce peuple , qui a su tirer un si grand parti des poissons pour ses plaisirs , pour son commerce , pour sa nourriture , ne se sera

pas contenté de multiplier les portraits de cette espèce; il aura voulu aussi en répandre les individus dans ses nombreuses eaux, dans ses larges rivières, dans ses lacs enchanteurs.

~~_____~~

LE TRICHIURE ÉLECTRIQUE *.

ON a reconnu dans ce trichiure une faculté analogue à celle de la torpille et du gymnote torporifique. Mais comme, en découvrant ses effets, on n'a observé aucun phénomène particulier propre à jeter un nouveau jour sur cette puissance que nous avons long-temps considérée en traitant du gymnote engourdissant et de la torpille, nous croyons devoir nous contenter de dire que le trichiure électrique est séparé du lepture, non seulement par la conformation de ses mâchoires, qui sont toutes les deux également avancées, mais encore par la forme de ses dents, toutes extrêmement petites. D'ailleurs le bout de la queue n'est pas aussi aigu que dans le lepture. De plus, au lieu de présenter l'or et l'argent qui

* *Paille-en-cul*, par quelques naturalistes et voyageurs.

décorent ce dernier poisson, il n'offre que des couleurs ternes ; il est brun et tacheté. S'il a été doué de la puissance, il est donc bien éloigné d'avoir reçu l'éclat de la beauté. C'est dans les mers de l'Inde qu'il exerce le pouvoir qui lui a été départi.

VINGT-SIXIÈME GENRE.

LES NOTOPTÈRES.

Des nageoires pectorales, de l'anus et du dos; point de nageoire caudale; le corps très-court.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. LE NOTOPTÈRE
KAPIRAT. | { La nageoire du dos très-
courte. |
| 2. LE NOTOPTÈRE
ÉCAILLEUX. | { La nageoire du dos très-
longue; le corps couvert
de petites écailles arron-
dies. |
-

LE NOTOPTÈRE KAPIRAT.

LES deux poissons dont nous allons donner la description, ont été jusqu'à présent confondus avec les gymnotes : mais la précision que nous croyons devoir introduire dans la distribution des objets de notre étude, et les principes sur lesquels la classification des animaux nous a paru devoir être fondée, ne nous ont pas permis de laisser réunis des poissons dont les uns n'ont reçu le nom de *gymnotes* que parce que leur dos est entièrement dénué de nageoire, et d'autres osseux qui au contraire ont une nageoire dorsale plus ou moins étendue. Nous avons donné à l'ensemble de ces derniers le nom générique de *notoptère*, dont plusieurs naturalistes se sont servis jusqu'à présent pour désigner le kapiirat, la première espèce de ce groupe, et qui, venant de deux mots grecs, dont l'un

signifie *dos*, et l'autre *aile* ou *nageoire*, indique la présence d'une nageoire dorsale. Les noms de ces deux genres très-voisins annoncent donc la véritable différence qui les sépare ; on pourroit même, à la rigueur, dire la seule différence générique bien sensible et bien constante qui les écarte l'un de l'autre. Le kapirot sur-tout seroit aisément assimilé en tout, ou presque en tout, à un gymnote, si on le privoit de la nageoire qu'il a sur le dos.

Ce poisson qui fait le sujet de cet article, se trouve dans la mer voisine d'Amboine. Il ne parvient ordinairement qu'à la longueur de deux ou trois décimètres. Son museau est court et arrondi ; on apperçoit une petite ouverture, ou un pore très-sensible, au-dessus de ses yeux qui sont grands. La mâchoire supérieure est garnie de dents égales et très-peu serrées ; la mâchoire inférieure en présente sur son bord extérieur de plus grandes et de plus éloignées encore les unes des autres ; et de plus, on voit sur le bord intérieur de cette même mâchoire

d'en-bas , ainsi que sur celui du palais , une série de dents très-petites. L'opercule des branchies est garni d'écailles et membraneux dans son contour. La gorge et l'anus sont très-rapprochés. L'étendue de la nageoire de l'anus*, et la forme très-alongée de la queue , sont assez remarquables pour avoir fait donner au kapi-rat, par Bontius, le nom d'*hippuris*, qui veut dire *queue de cheval*. Et enfin ce notoptère brille des couleurs de l'or et de l'argent qui sont répandues sur les très-petites écailles dont sa peau est revêtue.

* A la membrane des branchies.	6 rayons.
à la nageoire du dos.....	7
à chacune des nageoires pectorales	13
à la nageoire de l'anus.....	116

LE NOTOPTÈRE ÉCAILLEUX.

COMME nous n'avons pas vu ce poisson , nous ne pouvons que présumer qu'il ne présente pas de véritable nageoire caudale. Si le bout de sa queue étoit cependant garni d'une nageoire distincte et véritablement propre à cette extrémité , il faudroit le séparer des notoptères , et le comprendre dans un genre particulier. Mais si au contraire , et comme nous le pensons , il n'a point de nageoire que l'on doive appeler *caudale* , il offre tous les caractères que nous avons assignés au genre des notoptères , et il doit être inscrit à la suite du kaporat. Il diffère néanmoins de ce dernier animal , non seulement parce que sa nageoire dorsale , au lieu d'être courte et de ne renfermer que sept rayons , en comprend un très-grand nombre et s'étend presque depuis la nuque jusqu'à la queue , mais encore parce qu'il

est revêtu , même sur la tête , d'écailles assez grandes et presque toujours arrondies , qui nous ont suggéré son nom spécifique.

On voit au-devant de chacune de ses narines un petit barbillon qui paroît comme tronqué. Il y a sur la tête plusieurs pores très-visibles , et cinq très-petits enfoncemens. Les dents sont acérées ; et l'entre-deux des branches de la mâchoire supérieure en est garni. La ligne latérale est droite , excepté au-dessus de l'an us , où elle se fléchit vers le bas. La couleur de l'écailleux est obscure , avec des bandes transversales brunes. Il devient ordinairement un peu plus grand que le kapi rat , et il habite , comme ce dernier poisson , dans les mers de l'Asie *.

Tous les vrais gymnotes connus jusqu'à présent vivent donc dans les eaux de l'Amérique méridionale ou de l'Afrique occidentale , excepté le fier asfer , que l'on a pêché dans la Méditerranée , pendant qu'on ne trouve que dans les mers de l'Asie les notoptères déjà découverts.

* A la membrane des branchies , 5 rayons.

VINGT-SEPTIEME GENRE.

LES OPHISURES.

Point de nageoire caudale; le corps et la queue cylindriques et très-alongés relativement à leur diamètre; la tête petite; les narines tubulées; la nageoire dorsale et celle de l'anus, très-longues et très-basses.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. L'OPHISURE | { | De grandes taches rondes ou ovales. |
| OPHIS. | | |
| 2. L'OPHISURE | { | Point de taches, ou de très-petites taches. |
| SERPENT. | | |



L'OPHISURE OPHIS.

CEUX qui auront un peu réfléchi aux différens principes qui nous dirigent dans nos distributions méthodiques, ne seront pas surpris que nous séparions les deux espèces suivantes du genre des murènes, dans lequel elles ont été inscrites jusqu'à présent. En effet, elles en diffèrent par l'absence d'une nageoire caudale. On leur a depuis long-temps donné le nom de *serpens marins*; et comme un des grands rapports qui les lient avec les véritables serpens, consiste dans la forme déliée du bout de leur queue, dénué de nageoire*, ainsi que l'extrémité de la queue des

- * A la membrane des branchies. 10 rayons.
à chacune des nageoires pecto-
rales..... 10
à la nageoire du dos..... 136
à celle de l'anüs..... 79

vrais reptiles , nous avons cru devoir donner au groupe qu'elles vont composer , le nom d'*ophisure*, qui veut dire *queue de serpent*.

La première de ces deux espèces est celle à laquelle j'ai conservé le nom particulier d'*ophis*, qui , en grec , signifie *serpent*. Son ensemble a beaucoup de conformité avec celui des véritables reptiles ; et sa manière de semouvoir sinueuse, vive et rapide, rapproche ses habitudes de celles de ces derniers animaux. Il se contourne d'ailleurs avec facilité ; il se roule et déroule ; et ces évolutions sont d'autant plus agréables à voir , que ses proportions sont très-sveltes, et ses couleurs gracieuses. Le plus souvent son diamètre le plus grand n'est que la trentième ou même la quarantième partie de sa longueur totale , qui s'étend quelquefois au-delà de plus d'un mètre ; et sa petite tête , son corps, sa queue, ainsi que sa longue et très-basse nageoire dorsale , présentent sur un fond blanc, ou blanchâtre, plusieurs rangs longitudinaux de taches rondes ou ovales, qui , par leur nuance

foncée et leur demi-régularité, contrastent très-bien avec la teinte du fond.

On voit des dents recourbées, non seulement le long des mâchoires, mais encore au palais. L'ophis habite dans les mers européennes.

L'OPHISURE SERPENT.

CETTE seconde espèce d'ophisure est plus grande que la première : elle parvient fréquemment à la longueur de près de deux mètres. Elle habite non seulement dans les eaux salées voisines de la Campagne de Rome , mais encore dans plusieurs autres parties de la mer Méditerranée. Elle y a été nommée plus souvent que presque tous les autres poissons , *serpent marin* , et elle y a été connue d'Aristote , qui la distinguoit par le même nom de *serpent marin* , de *serpent de mer*. Ses habitudes ressemblent beaucoup à celles de l'ophis : ses mouvemens sont aussi agiles , ses inflexions aussi multipliées , ses circonvolutions aussi faciles , sa natation aussi rapide , et ses courses ou ses jeux plus propres encore à charmer les yeux de ceux qui sont à portée de l'observer , parce qu'elle offre des dimensions

plus grandes, sans cesser d'avoir des proportions aussi sveltes. On ne voit pas sur son corps les taches rondes ou ovales qui distinguent l'ophis. Elle est jaunâtre sur le dos, blanchâtre sur sa partie inférieure; et sa nageoire dorsale, ainsi que celle de l'anus, sont lisérées de noir.

On compte dix rayons à la membrane des branchies, et seize à chacune des nageoires pectorales.

VINGT-HUITIÈME GENRE.

LES TRIURES.

La nageoire de la queue très-courte; celle du dos et celle de l'anus étendues jusqu'au-dessus et au-dessous de celle de la queue; le museau avancé en forme de tube; une seule dent à chaque mâchoire.

ESPÈCE.

CARACTÈRES.

LE TRIURE
BOUGAINVILLIEN.

} Une valvule en forme de croissant, et fermant, à la volonté de l'animal, la partie de l'ouverture des branchies laissée libre par la membrane branchiale qui est attachée à la tête ou au corps dans presque tout son contour.

LE TRIURE BOUGAINVILLIEN.

Nous venons d'écrire l'histoire des poissons apodes renfermés dans la première division des osseux , et qui sont dénués de nageoire caudale : examinons maintenant ceux du même ordre qui en sont pourvus ; et commençons par ceux qui , n'en ayant qu'une assez courte , lient , par une nuance intermédiaire , les premiers avec les seconds. Plaçons ici , en conséquence , ce que nous avons à dire d'un poisson du premier ordre des osseux , dont les manuscrits du savant Commerson nous ont présenté la description , qui n'a été encore observé par aucun autre naturaliste , et que nous avons dû inscrire dans un genre particulier.

Nous avons déjà donné le nom de *Commerson* à une lophie ; donnons au

poisson que nous allons décrire , le nom de notre fameux navigateur et mon respectable confrère Bougainville , avec lequel Commerson voyageoit dans la mer du Sud , lorsqu'il eut occasion d'examiner le triure dont nous allons parler.

Ce fut entre le 26 et le 27^e degré de latitude australe , et près du 103 ou du 104^e degré de longitude , qu'un hasard mit Commerson à même de voir cette espèce, très-digne d'attention par ses formes extérieures. On venoit de prendre plusieurs poissons du genre des scombres. Commerson les ayant promptement disséqués , trouva dans l'estomac d'un seul de ces animaux cinq triures très-entiers , et que la force digestive du scombres n'avoit encore altérés en aucune manière. Leur forme extraordinaire frappa , dit Commerson , les gens de l'équipage , qui s'écrièrent tous qu'ils n'avoient jamais vu de semblables poissons. Quant à lui , il crut bientôt après avoir retiré ces cinq triures de l'estomac du scombres , en voir plusieurs de la même espèce se jouer sur la surface de la mer. Il étoit alors dans le

mois de février de 1768 (*v. st.*). Quoiqu'il en soit, voici quels sont les traits de cette espèce d'osseux apode, dont les individus examinés par le très-exact et très-éclairé Commerson, avoient à peu près la grandeur et l'aspect d'un hareng ordinaire.

La couleur du triure bougainvillien est d'un brun rougeâtre qui se change en argenté sous la tête, et en incarnat, ou plutôt en vineux blanchâtre, sur les côtés, ainsi que sur la partie inférieure du corps et de la queue, et qui est relevé par une tache d'un blanc très-éclatant derrière la base des nageoires pectorales.

L'ensemble du corps et de la queue est comprimé, et alongé de manière que la longueur totale de l'animal, sa plus grande hauteur et sa plus grande largeur, sont dans le même rapport que 71, 18 et 10. Ce même ensemble est d'ailleurs entièrement dénué de piquans, et revêtu d'écaillés si petites et si enfoncées, pour ainsi dire, dans la peau à laquelle elles sont attachées, qu'à la première inspec-

tion , on pourroit croire l'animal entièrement sans écailles.

La tête , qui est comprimée comme le corps , et qui de plus est un peu aplatie par-dessus , se termine par un museau très-prolongé , fait en forme de tube assez étroit , et dont l'extrémité présente pour toute ouverture de la bouche , un orifice rond , et que l'animal ne peut pas fermer.

Dans le fond de cette sorte de tuyau sont les deux mâchoires osseuses , composées chacune d'une seule dent incisive et triangulaire. On n'apperçoit pas d'autres dents ni sur le palais , ni sur la langue , qui est très-courte , cartilagineuse , et cependant un peu charnue dans son bout antérieur , lequel est arrondi.

Les ouvertures des narines sont très-petites et placées plus près des orbites que de l'extrémité du museau. Les yeux sont assez grands , peu convexes , dépourvus de ce voile membraneux que nous avons fait remarquer sur ceux des gymnotes , des ophisures , et d'autres poissons ; et l'iris brille des couleurs de l'or et de l'argent.

C'est au-dessous de la peau qu'est placé chaque opercule branchial , qui d'ailleurs est composé d'une lame osseuse , longue , et en forme de faux. La membrane branchiale renferme cinq rayons un peu aplatis et courbés , qu'on ne peut cependant appercevoir qu'à l'aide de la dissection. Cette membrane est attachée à la tête ou au corps dans presque tout son contour , de manière qu'elle ne laisse pour toute ouverture des branchies qu'un très-petit orifice situé dans le point le plus éloigné du museau. Nous avons vu une conformation analogue en traitant des syngnathes ; nous la retrouverons sur les callionymes et sur quelques autres poissons : mais ce qui la rend sur-tout très-remarquable dans le triure que nous faisons connoître, c'est qu'elle offre un trait de plus dont nous ne connoissons pas d'exemple dans la classe entière des poissons ; et voilà pourquoi nous en avons tiré le caractère distinctif du bougainvillien. Cette particularité consiste dans une valvule en forme de croissant , charnue , mollassse , et qui , attachée au bord

antérieur de l'orifice branchial , le ferme à la volonté de l'animal , en se rabattant sur le côté postérieur. Le triure bougainvillien est donc de tous les poissons connus celui qui a reçu l'appareil le plus compliqué pour empêcher l'eau d'entrer dans la cavité branchiale , ou de sortir de cette cavité en passant par l'ouverture des branchies ; il a un opercule , une membrane et une valvule ; et la réunion , dans cet animal , de ces trois moyens d'arrêter l'entrée ou la sortie de l'eau , est d'autant plus digne d'attention , que , d'après les expressions de Commerson , il paroît que ce triure ne peut pas fermer à sa volonté l'orifice placé à l'extrémité du long tube formé par son museau , et que ce tube peut servir de passage à l'eau pour entrer par la bouche dans la véritable cavité branchiale ou pour en sortir.

Mais nous avons assez parlé des organes du triure relatifs à la respiration.

On ne voit pas de ligne latérale bien sensible. Le bas du ventre se termine en carène aiguë dans presque toute sa longueur ; et l'anus , qui est situé à l'ex-

rémité de l'abdomen , consiste dans une ouverture un peu alongée.

Les nageoires pectorales sont petites , délicates , transparentes , paroissent presque triangulaires lorsqu'elles sont déployées , et renferment douze ou treize rayons.

La nageoire de l'anús , composée de quinze rayons mous , ou environ , se dirige en arrière ; et sa pointe aiguë s'étend presque aussi loin que le bord postérieur de la nageoire de la queue , dont elle représente un supplément , et paroît même former une partie.

La nageoire dorsale ne se montre pas moins comme une auxiliaire de la nageoire de la queue. Formée d'un égal nombre de rayons que celle de l'anús , partant d'un point plus éloigné de la tête , et ayant un tiers de longueur de plus , elle s'étend en arrière non seulement presque autant que la nageoire caudale , mais encore plus loin que cette dernière. Et comme les deux nageoires dorsale et de l'anús touchent d'ailleurs la nageoire de la queue , cette nageoire caudale semble ,

au premier coup d'œil, être composée de trois parties bien distinctes ; on croit voir trois queues à l'animal ; et de là viennent les dénominations de *triurus*, de *triplurus*, de *tricaud*, c'est-à-dire, d'animal à trois queues, de *bacha de la mer*, etc. employées par Commerson, et dont nous avons conservé le nom générique de *triu-rus*, *triure*.

Au reste, la nageoire caudale proprement dite est si courte, que, quoique composée d'une vingtaine de rayons, elle ressemble beaucoup plus à l'ébauche d'un organe qu'à une partie entièrement formée. Elle paroît frangée, parce que les rayons qu'elle renferme sont mous, articulés, et très-divisés vers leur extrémité.

Le triure bougainvillien n'auroit donc pas vraisemblablement une grande force pour nager au milieu des eaux de la mer, si la nature et le peu de surface de sa véritable nageoire caudale n'étoient compensés par la forme, la position et la direction de la nageoire du dos et de celle de l'anús ; mais nous pensons, avec Commerson, que, par le secours de ces deux

nageoires accessoires , le triure doit se mouvoir avec facilité , et s'élancer avec vitesse dans le sein des mers qu'il habite.

Telle est l'image que nous pouvons former du triure bougainvillien , en réunissant les traits précieux transmis par Commerson.

Quant à l'organisation intérieure de ce poisson , voici ce qu'en a écrit notre voyageur.

Le foie est d'un rouge très-pâle , parsemé de points sanguins , et composé de deux lobes convexes , inégaux , et dont le droit est le plus grand.

Le canal intestinal est étroit , diminue insensiblement de grosseur depuis le pyllore , se recourbe et se replie sur sa direction quatre ou cinq fois.

Commerson n'a trouvé qu'une matière liquide et blanchâtre dans l'estomac , qui est petit , et placé transversalement.

Le cœur est presque triangulaire , d'un rouge pâle , avec une oreillette très-rouge.

Commerson n'a pas vu de vésicule na-

tatoire ; mais il ne sait pas si son scalpel ne l'a pas détruite.

Le poids du plus grand des triures bougainvilliens examinés par ce naturaliste, étoit, à très-peu près, de 132 grammes.

VINGT-NEUVIÈME GENRE.

LES APTÉRONOTES.

*Une nageoire de la queue ; point de nageoire
du dos ; les mâchoires non extensibles.*

ESPÈCE.

CARACTÈRES.

L'APTÉRONOTE	{	Un long filament charnu , placé au-dessus de la par- tie supérieure de la queue.
PASSAN.		

L'APTÉRONOTE PASSAN.

LE nom d'*aptéronote*, qui veut dire *sans nageoire sur le dos*, désigne la même conformation que celui de *gymnote*, qui signifie *dos nud*. Et en effet, le *passan*, comme les *gymnotes*, n'a pas de nageoire dorsale ; mais nous avons dû le séparer de ces derniers, parce qu'indépendamment d'autres grandes différences, il a une nageoire caudale, dont il ne présente aucun linéament. Nous l'avons donc inscrit dans un genre particulier, auquel cependant nous avons été bien aises de donner un nom qui, en faisant éviter toute équivoque, rappelât ses rapports, et, pour ainsi dire, sa parenté avec la famille des *gymnotes*.

Le *passan* a le museau très-obtus ; la tête dénuée d'écailles sensibles, et parsemée de très-petits trous destinés à répandre une humeur visqueuse ; l'ouver-

ture de la bouche étendue jusqu'au-delà des yeux , qui sont voilés par une membrane , comme ceux des gymnotes ; les orifices des narines à une distance à peu près égale des yeux et du bout du museau ; et les deux mâchoires festonnées de manière que la mâchoire supérieure présente une portion saillante à son extrémité , ainsi que quatre autres parties avancées , deux d'un côté et deux de l'autre , et que la mâchoire inférieure oppose un enfoncement à chaque saillie et une saillie à chaque enfoncement de la mâchoire d'en - haut , dans laquelle d'ailleurs elle s'emboîte.

Les opercules des branchies sont attachés dans la plus grande partie de leur contour , et les ouvertures branchiales un peu en demi-cercle.

Par une conformation bien rare , et bien remarquable même à côté de celles qu'offrent les apodes de la première division des osseux et particulièrement les gymnotes , l'anüs est si près de la tête , qu'il est situé dans le petit espace anguleux qui sépare les deux membranes

branchiales, et très-près du point où elles se réunissent. Derrière l'anús, on voit un orifice que l'on croit destiné à la sortie de la laite, ou des œufs.

Mais nous allons décrire une conformation plus singulière encore.

Vers le milieu de la partie supérieure de l'animal comprise entre la tête et la nageoire caudale, commence une sorte de filament, ou de lanière charnue très-longue et très-déliée. Le savant naturaliste du Nord, le célèbre Pallas, auquel on doit un si grand nombre de découvertes en histoire naturelle, a le premier fait attention à cette espèce de lanière. En voyant que ce long filament convexe par-dessus et comme excavé par-dessous répondoit à une sorte de canal longitudinal dont les dimensions paroissoient se rapporter exactement à celles du filament, il fut d'abord tenté de croire que l'on avoit entaillé le dos de l'animal, et qu'on en avoit détaché une lanière, au point qu'elle ne fût retenue que par son extrémité antérieure. Il s'aperçut cependant bientôt que la conformation

qu'il avoit sous ses yeux , étoit naturelle : mais l'état d'altération dans lequel étoit apparemment le passan de la collection de l'académie de Pétersbourg , empêcha ce savant professeur de connoître dans tous ses détails la véritable conformation du filament ; et comme depuis la description publiée par ce naturaliste on n'a pas cru devoir chercher à ajouter à ce qu'il a écrit , la vraie forme de cette portion du passan n'est pas encore connue de ceux qui cultivent les sciences naturelles. La voici telle que j'ai pu la voir sur un individu très-bien conservé qui faisoit partie de la collection donnée à la France par la république batave ; et la figure que j'ai fait dessiner et graver , en donnera une idée très-nette.

Cette lanière charnue est en effet convexe par-dessus , concave par-dessous , attachée par son gros bout vers le milieu du dos de l'aptéronote , et répondant à un canal dont les dimensions diminuent à mesure qu'elle devient plus déliée , ainsi que l'a très-bien dit le professeur Pallas ; mais ce que ce naturaliste n'a

pas été à même de voir , et ce qui est plus extraordinaire , c'est que ce filament est attaché aussi , par son bout le plus menu , très-près de l'origine de la nageoire de la queue. Lorsqu'on le soulève , on le voit retenu par ses deux bouts , formant une espèce d'arc dont la queue de l'animal est la corde ; et de plus on apperçoit très-distinctement une douzaine de petits fils qui vont du canal longitudinal à cette lanière , la retiennent comme par autant de liens , sont inclinés vers la nageoire caudale , et se couchent dans le canal longitudinal , lorsqu'on laisse retomber le grand filament dans la longue gouttière , qu'il remplit alors en entier.

C'est de la présence de cette lanière que nous avons tiré le caractère spécifique du passan.

La nageoire de l'anüs * commençant très - près de cette dernière ouverture , s'étend presque depuis la gorge jusqu'à

* A chacune des nageoires pectorales , de..... 15 à 16 rayons.
à celle de la queue , de... 20 à 24

la base de la nageoire caudale ; elle comprend de 147 à 152 rayons.

Le corps et la queue sont couverts d'écailles petites et arrondies.

L'animal est de deux couleurs , d'un noir plus ou moins foncé , et d'un blanc éclatant. Ce blanc de neige s'étend sur le museau ; il règne ensuite en forme de bande étroite depuis le devant de la tête jusqu'à la partie postérieure de la queue , qui est blanche ainsi que la nageoire caudale , et la dernière partie de celle de l'anús. C'est cette portion très-blanche de la nageoire de l'anús , dont l'image a été oubliée par quelques uns de ceux qui ont représenté le passan ; et voilà pourquoi on lui a attribué une nageoire de l'anús beaucoup plus courte que celle qu'il a réellement.

Cet aptéronote parvient quelquefois jusqu'à la longueur de quatre décimètres. On le trouve dans les environs de Surinam.

TRENTIEME GENRE.

LES RÉGALECS.

Des nageoires pectorales, du dos, et de la queue; point de nageoire de l'anus, ni de série d'aiguillons à la place de cette dernière nageoire; le corps et la queue très-alongés.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

1. LE RÉGALEC GLESNE.

Un long filament auprès de chaque nageoire pectorale; une nageoire dorsale régnant depuis la nuque jusqu'à la nageoire de la queue, avec laquelle elle est réunie.

2. LE RÉGALEC LANCÉOLÉ.

La nageoire de la queue, lancéolée; les opercules composées seulement de deux ou trois pièces.

LE RÉGALEC GLESNE.

Plus on fait de progrès dans l'étude des corps organisés, et plus on est convaincu de cette vérité importante, que toutes les formes compatibles avec la conservation des espèces, non seulement existent, mais encore sont combinées les unes avec les autres de toutes les manières qui peuvent se concilier avec la durée de ces mêmes espèces. L'histoire des poissons apodes de la première division des osseux nous fournit un exemple remarquable de cette variété de combinaisons. Dans les dix-neuf genres de cet ordre, les diverses nageoires du dos, de la poitrine, de l'anus et de la queue, montrent en effet, par leur présence ou par leur absence, un assez grand nombre de modes différens. Les cécilies sont absolument sans nageoires; les monoptères n'en ont qu'une qui est placée au bout

de la queue ; on en voit deux sur les leptocéphales , dont le dos est garni d'une de ces deux nageoires , pendant que l'autre est située entre leur queue et leur anus ; les trichiures n'en ont que sur le dos et des deux côtés de la poitrine ; les gymnotes , qui en ont de pectorales et une de l'anus , en sont dénués sur le dos et à l'extrémité de la queue ; les notoptères et les ophisures en déploient uniquement sur le dos , au-delà de l'anus , et des deux côtés de la partie antérieure de leur corps ; les triures ne réunissent aux nageoires du dos , de la poitrine et de l'anus , que des rudimens d'une nageoire de la queue ; on apperçoit une nageoire caudale , deux pectorales et une nageoire de l'anus sur les aptéronotes , mais leur dos est sans nageoire ; les quatre sortes de nageoires ont été données aux odontognathes , aux murènes , aux amodytes , aux ophidies , aux macrognathes , aux xiphias , aux anarhiques , aux coméphores , aux stromatées , aux rhombes ; et enfin les régalecs ont reçu une nageoire du dos , une nageoire de la

queue, et deux pectorales, sans aucune apparence de nageoire de l'anús.

Cette absence d'une nageoire anale suffiroit seule pour séparer le genre des régalecs de tous les autres genres de son ordre, excepté de celui des cécilies, de celui des monoptères, et de celui des trichiures; mais comme les trichiures ont une série d'aiguillons à la place de la nageoire anale, que les monoptères n'ont qu'une seule nageoire, et que les cécilies n'en ont pas du tout, on peut dire que cet entier dénuement de nageoire de l'anús distingue véritablement les régalecs de tous les apodes inscrits dans la première division des poissons osseux, et avec lesquels on pourroit les confondre.

Le naturaliste Ascanius est le premier auteur qui ait fait mention du régalec. On n'a compté jusqu'à présent dans ce genre, qu'une espèce que l'on nomme *glesne*, et qui habite auprès des côtes de Norvège. Le régalec glesne a d'assez grands rapports avec les trichiures et les ophisures. Le corps et la queue sont très-

alongés et comprimés, les mâchoires armées de dents nombreuses, les opercules composés de cinq ou six pièces, les membranes branchiales soutenues par cinq ou six rayons, les nageoires pectorales très-petites. Au-dessous de chacune de ces deux dernières nageoires, on voit un filament renflé par le bout, et dont la longueur est égale ordinairement au tiers de celle de l'animal. On compte, en quelque sorte, deux nageoires dorsales : la première, qui cependant est une série de piquans plutôt qu'une véritable nageoire, commence dès le sommet de la tête, et est composée de huit aiguillons; la seconde s'étend depuis la nuque jusqu'à la nageoire caudale, avec laquelle elle se réunit et se confond.

Tout le corps du poisson est argenté, semé de petits points noirs disposés en raies longitudinales, et varié dans ses nuances par trois bandes brunes placées transversalement sur la partie postérieure de la queue.

Comme on le rencontre souvent, ainsi que la chimère arctique, au milieu des

innombrables légions de harengs, qu'il est argenté comme ces derniers animaux, qu'il a l'air de les conduire, et qu'il parvient à des dimensions assez considérables, on l'a nommé, ainsi que la chimère du Nord, *roi des harengs*; et c'est ce que désigne le nom générique de *régalec*, qui lui a été conservé.

LE RÉGALEC LANCÉOLÉ *.

Nous plaçons dans le même genre que le glesne, une espèce de poisson dont nous avons vu une figure coloriée, exécutée avec beaucoup de soin, et parmi les dessins chinois cédés par la Hollande à la France, et desquels nous avons déjà parlé plusieurs fois. Nous avons donné à ce régalec, dont les naturalistes d'Europe n'ont encore publié aucune description, le nom spécifique de *lancéolé*, parce que la nageoire qui termine sa queue a la forme d'un fer de lance. Cet animal est dénué d'une nageoire de l'anús comme le glesne; il a, comme ce dernier osseux, deux nageoires dorsales, très-basses et très-rapprochées; mais ces deux nageoires sont, en quelque sorte, triangulaires : la

* Ce régalec est représenté sous le nom d'*ophidie chinoise*, dans la planche 4 du troisième volume de cette *Histoire des poissons*,

première n'est point composée d'aiguillons détachés, et la seconde ne se confond pas avec l'anale comme sur le glesne. Chacun des opercules n'est composé que de deux ou trois pièces, tandis qu'on en compte cinq ou six dans chaque opercule du régalec de Norvège. Le lancéolé a d'ailleurs le corps très-allongé et serpentiniforme, comme le régalec d'Europe; mais ce poisson chinois, au lieu d'être argenté, est d'une couleur d'or mêlée de brun.

TRENTE-UNIÈME GENRE.

LES ODONTOGNATHES.

Une lame longue, large, recourbée, dentelée, placée de chaque côté de la mâchoire supérieure, et entraînée par tous les mouvemens de la mâchoire de dessous.

ESPÈCE.

CARACTÈRES.

L'ODONTOGNATHE
AIGUILLONNÉ.

{ Huit aiguillons recourbés,
situés sur la poitrine;
vingt-huit autres aiguil-
lons disposés sur deux
rangs longitudinaux, et
placés sur le ventre.

L'ODONTOGNATHE

AIGUILLONNÉ.

PARMI plusieurs poissons que le citoyen Leblond nous a fait parvenir assez récemment de Cayenne , s'est trouvé celui que j'ai cru devoir nommer *odontognathe aiguillonné*. Non seulement cet osseux n'a encore été décrit par aucun naturaliste, mais il ne peut être placé dans aucun des genres admis jusqu'à présent par ceux qui cultivent l'histoire naturelle. Sa tête, son corps et sa queue sont très-comprimés. Mais ce qui doit le faire observer avec le plus d'attention , c'est le mécanisme particulier que présentent ses mâchoires, et dont on ne trouve d'exemple dans aucun poisson connu. Montrons en quoi consiste ce mécanisme.

La mâchoire inférieure , plus longue que la supérieure , est très-relevée contre

cette dernière, lorsque l'animal a sa bouche entièrement fermée ; elle est même si redressée dans cette position, qu'elle paroît presque verticale. Elle s'abaisse, en quelque sorte, comme un pont-levis, lorsque le poisson ouvre sa bouche ; et on s'apperçoit facilement alors qu'elle forme une espèce de petite nacelle écailleuse, très-transparente, sillonnée par-dessous, et finement dentelée sur ses bords.

Cette mâchoire de dessous entraîne en avant, lorsqu'elle s'abaisse, deux pièces très-longues, ou, pour mieux dire, deux lames très-plates, irrégulières, de substance écailleuse, un peu recourbées à leur bout postérieur, plus larges à leur origine qu'à leur autre extrémité, dentelées sur leur bord antérieur, et attachées, l'une d'un côté, l'autre de l'autre, à la partie la plus saillante de la mâchoire supérieure. Lorsque ces deux lames ont obéi le plus possible au mouvement en en-bas de la mâchoire inférieure, elles se trouvent avancées de manière que leurs extrémités dépassent la verticale que l'on peut sup-

poser tirée du bout du museau vers le plan horizontal sur lequel le poisson repose. C'est au milieu de ces deux pièces que l'on voit alors la mâchoire inférieure abaissée et étendue en avant; et dans cette attitude, le contour de la bouche est formé par cette même nageoire de dessous, et par les deux lames dentelées qui sont devenues comme les deux côtés de la mâchoire supérieure.

Tant que la bouche reste ouverte, les lames dépassent par le bas la mâchoire inférieure; mais lorsque celle-ci remonte pour s'appliquer de nouveau contre la mâchoire supérieure et fermer la bouche, chacune des deux pièces se couche contre un des opercules, et paroît n'en être que le bord antérieur dentelé.

C'est des dentelures que nous venons d'indiquer en montrant le singulier mécanisme des mâchoires de l'aiguillonné, que nous avons tiré le nom générique de cet animal, *odontognathe* signifiant par un seul mot, ainsi que cela est nécessaire pour la dénomination d'un genre, à mâchoires dentelées.

Au milieu de ces mâchoires organisées d'une manière si particulière , on voit une langue pointue et assez libre dans ses mouvemens. Les opercules , composés de plusieurs pièces , sont très-transparens dans leur partie postérieure , écailleux et très-argentés dans leur partie antérieure. La membrane des branchies , qui est soutenue par cinq rayons , est aussi argentée par-dessus ; et il n'est pas inutile de faire observer à ceux qui auront encore présentes à leur esprit les idées que notre premier Discours renferme sur les couleurs des poissons , que dans un très-grand nombre d'osseux qui vivent aux environs de la Guiane et d'autres contrées équatoriales de l'Amérique, la membrane branchiale est plus ou moins couverte de ces écailles très-petites et très-éclatantes qui argentent les diverses parties sur lesquelles elles sont répandues.

La poitrine , terminée vers le bas en carène aiguë , présente sur cette sorte d'arête huit aiguillons recourbés. On distingue de plus , au travers des tégumens et de chaque côté du corps , quatorze

côtes peu courbées , dont chacune est terminée par un aiguillon saillant à l'extérieur , et se réunit , pour former le dessous du ventre , à celle qui lui est analogue dans le côté du corps opposé à celui auquel elle appartient. Il résulte de cet arrangement , que la carène du ventre est garnie de vingt-huit aiguillons disposés sur deux rangs longitudinaux ; et c'est de cette double rangée que vient le nom spécifique d'*aiguillonné* , par lequel nous avons cru devoir distinguer le poisson osseux que nous décrivons.

La nageoire de l'an us est très-longue , et s'étend presque jusqu'à la base de celle de la queue , qui est fourchue *.

Celle du dos est placée sur la queue proprement dite , vers les trois quarts de la longueur totale de l'animal ; mais elle est très-petite.

D'après l'état dans lequel nous avons vu l'individu envoyé au Muséum natio-

- * A chacune des nageoires pectorales 12 rayons.
à la nageoire du dos..... 6 ou 7
à celle de l'an us..... 80
à celle de la queue..... 19

nal d'histoire naturelle par le citoyen Leblond , et conservé déjà depuis quelque temps dans de l'alcool affoibli , nous pouvons seulement conjecturer que l'odontognathe aiguillonné présente , sur presque tout son corps , le vif éclat de l'argent. Nous le présumons d'autant plus , que cet animal a reçu dans les environs de Cayenne , suivant le citoyen Leblond , le nom vulgaire de *sardine* , nom donné depuis long-temps à une clupée argentée sur une grande partie de son corps , et qui d'ailleurs n'a aucune ressemblance extérieure bien frappante avec l'aiguillonné. Comme la sardine , l'odontognathe dont nous parlons , est bon à manger , et vit dans l'eau salée. Il parvient à la longueur de trois décimètres.

TRENTE-DEUXIÈME GENRE.

LES MURÈNES.

Des nageoires pectorales, dorsale, caudale et de l'anús; les narines tubulées; les yeux voilés par une membrane; le corps serpentiniforme et visqueux.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

1. LA MURÈNE ANGUILLE.

La mâchoire inférieure plus avancée que la supérieure; cent rayons, ou environ, à la nageoire de l'anús; le dessus du corps et de la queue sans tache.

2. LA MURÈNE TACHETÉE.

La mâchoire inférieure plus avancée que la supérieure; trente-six rayons, ou environ, à la nageoire de l'anús; la couleur verdâtre; de petites taches noires; une grande tache de chaque côté et auprès de la tête.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

3. LA MURÈNE
MYRE.

{ Le museau un peu pointu ;
deux petits appendices un
peu cylindriques à la lèvre
supérieure ; la nageoire du
dos toute cendrée , ou
blanche et lisérée de noir.

4. LA MURÈNE
CONGRE.

{ Deux appendices un peu cy-
lindriques à la lèvre supé-
rieure ; la ligne latérale
blanche.



LA MURÈNE ANGUILE *.

IL est peu d'animaux dont on doive se retracer l'image avec autant de plaisir que celle de la murène anguille. Elle peut être offerte , cette image gracieuse , et à l'enfance folâtre , que la variété des évolutions amuse , et à la vive jeunesse , que la rapidité des mouvemens enflamme ,

* *Muræna anguilla* ; *margaignon* (anguille mâle), *fine* (anguille femelle), dans plusieurs départemens méridionaux de France ; *paglietane*, *gavonchi*, *musini*, dans plusieurs contrées d'Italie ; *miglioramenti*, lorsqu'elle pèse six kilogrammes, auprès des lacs ou marais de Commachio, d'Orbitello, etc. en Italie ; *capitoni*, lorsqu'elle a le même poids ; *rocche*, lorsque son poids est de deux kilogrammes ; *anguillacci*, lorsque son poids n'est que d'un kilogramme et demi ; *presciatti*, lorsqu'elle est très-petite. *Ahl*, en allemand ; *al*, en suédois ; *eel*, en anglois.

et à la beauté , que la grace , la souplesse , la légèreté , intéressent et séduisent , et à la sensibilité , que les affections douces et constantes touchent si profondément , et à la philosophie même , qui se plaît à contempler et le principe et l'effet d'un instinct supérieur. Nous l'avons déjà vu , cet instinct supérieur , dans l'énorme et terrible requin : mais il y étoit le ministre d'une voracité insatiable , d'une cruauté sanguinaire , d'une force dévastatrice. Nous avons trouvé dans les poissons électriques une puissance , pour ainsi dire , magique ; mais ils n'ont pas eu la beauté en partage. Nous avons eu à représenter des formes remarquables ; presque toujours leurs couleurs étoient ternes et obscures. Des nuances éclatantes ont frappé nos regards ; rarement elles ont été unies avec des proportions agréables ; plus rarement encore elles ont servi de parure à un être d'un instinct élevé. Et cette sorte d'intelligence , ce mélange de l'éclat des métaux , et des couleurs de l'arc céleste , cette rare conformation de toutes les parties qui

forment un même tout et qu'un heureux accord a rassemblées , quand les avons-nous vus départis avec des habitudes , pour ainsi dire , sociales , des affections douces , et des jouissances , en quelque sorte , sentimentales ? C'est cette réunion si digne d'intérêt , que nous allons cependant montrer dans l'anguille. Et lorsque nous aurons compris sous un seul point de vue sa forme déliée , ses proportions sveltes , ses couleurs élégantes , ses flexions gracieuses , ses circonvolutions faciles , ses élans rapides , sa natation soutenue , ses mouvemens semblables à ceux du serpent , son industrie , son instinct , son affection pour sa compagne , son espèce de sociabilité , et les avantages que l'homme en retire chaque jour , on ne sera pas surpris que les Grecques et les Romaines les plus fameuses par leurs charmes aient donné sa forme à un de leurs ornemens les plus recherchés , et que l'on doive en reconnoître les traits , de même que ceux des murénophis , sur de riches bracelets antiques , peut - être aussi souvent que ceux des

couleuvres venimeuses dont on a voulu pendant long - temps retrouver exclusivement l'image dans ces objets de luxe et de parure ; on ne sera pas même étonné que ce peuple ancien et célèbre qui adoroit tous les objets dans lesquels il voyoit quelque empreinte de la beauté , de la bonté , de la prévoyance , du pouvoir ou du courroux célestes , et qui se prosternoit devant les ibis et les crocodiles , eût aussi accordé les honneurs divins à l'animal que nous examinons. C'est ainsi que nous avons vu l'énorme serpent devin obliger , par l'effroi , des nations encore peu civilisées des deux continens, à courber une tête tremblante devant sa force redoutable , que l'ignorance et la terreur avoient divinisée ; et c'est ainsi encore que par l'effet d'une mythologie plus excusable sans doute , mais bien plus surprenante , car, fille cette fois de la reconnoissance et non pas de la crainte , elle consacroit l'utilité et non pas la puissance , les premiers habitans de l'île Saint-Domingue , de même que les Troglodytes dont Pline a parlé dans son

Histoire naturelle, vénéroient leur dieu sous la forme d'une tortue *.

On ne s'attendoit peut-être pas à trouver dans l'anguille tant de droits à l'attention. Quel est néanmoins celui qui n'a pas vu cet animal ? Quel est celui qui ne croit pas être bien instruit de ce qui concerne un poisson que l'on pêche sur tant de rivages , que l'on trouve sur tant de tables frugales ou somptueuses , dont le nom est si souvent prononcé , et dont la facilité à s'échapper des mains qui le retiennent avec trop de force , est devenue un objet de proverbe pour le sens borné du vulgaire , aussi-bien que pour la prudence éclairée du sage ? Mais , depuis Aristote jusqu'à nous , les natura-

* Le citoyen François (de Neufchâteau), membre de l'Institut national, m'écrivoit le 16 germinal de l'an 6, pendant qu'il étoit encore membre du Directoire exécutif, et dans une lettre savante et philosophique : « J'ai vu à Saint-Domingue des vases
« qui servoient dans les cérémonies des premiers
« habitans de l'île. Ces vases, composés d'une sorte
« de lave grossièrement taillée, figurent des tor-
« tues. »

listes , les Apicius , les savans , les ignorans , les têtes fortes , les esprits foibles , se sont occupés de l'anguille ; et voilà pourquoi elle a été le sujet de tant d'erreurs séduisantes , de préjugés ridicules , de contes puériles , au milieu desquels très-peu d'observateurs ont distingué les formes et les habitudes propres à inspirer ainsi qu'à satisfaire une curiosité raisonnable.

Tâchons de démêler le vrai d'avec le faux ; représentons l'anguille telle qu'elle est.

Ses nageoires pectorales sont assez petites , et ses autres nageoires assez étroites , pour qu'on puisse la confondre de loin avec un véritable serpent : elle a de même le corps très-alongé et presque cylindrique. Sa tête est menue , le museau un peu pointu , et la mâchoire inférieure plus avancée que la supérieure.

L'ouverture de chaque narine est placée au bout d'un très-petit tube qui s'élève au-dessus de la partie supérieure de la tête ; et une prolongation des tégumens les plus extérieurs s'étend en forme de

membrane au-dessus des yeux, et les couvre d'un voile demi-transparent comme celui que nous avons observé sur les yeux des gymnotes, des ophisures et des aptéronotes.

Les lèvres sont garnies d'un grand nombre de petits orifices par lesquels se répand une liqueur onctueuse ; une rangée de petites ouvertures analogues compose, de chaque côté de l'animal, la ligne que l'on a nommée *latérale* ; et c'est ainsi que l'anguille est perpétuellement arrosée de cette substance qui la rend si visqueuse. Sa peau est, sur tous les points de son corps, enduite de cette humeur gluante qui la fait paroître comme vernie. Elle est pénétrée de cette sorte d'huile qui rend ses mouvemens très-souples ; et l'on voit déjà pourquoi elle glisse si facilement au milieu des mains inexpérimentées qui, la serrant avec trop de force, augmentent le jeu de ses muscles, facilitent ses efforts, et, ne pouvant la saisir par aucune aspérité, la sentent couler et s'échapper comme un fluide *. A la vérité,

* Le mot *muræna*, qui vient du mot grec *μύρανα*,

cette même peau est garnie d'écailles dont on se sert même , dans plusieurs pays du Nord , pour donner une sorte d'éclat argentin au ciment dont on enduit les édifices : mais ces écailles sont si petites , que plusieurs physiiciens en ont nié l'existence ; et elles sont attachées de manière que le toucher le plus délicat ne les fait pas reconnoître sur l'animal vivant , et que même un œil perçant ne les découvre que lorsque l'anguille est morte , et la peau assez desséchée pour que les petites lames écailleuses se séparent facilement.

On apperçoit plusieurs rangs de petites dents , non seulement aux deux mâchoires , à la partie antérieure du palais , et sur deux os situés au-dessus du gosier , mais encore sur deux autres os un peu plus longs , et placés à l'origine des branchies.

L'ouverture de ces branchies est petite , très-voisine de la nageoire pectorale , verticale , étroite , et un peu en croissant.

lequel signifie *couler, s'échapper*, désigne cette faculté de l'anguille et des autres poissons de son genre.

On a de la peine à distinguer les dix rayons que contient communément la membrane destinée à fermer cette ouverture ; et les quatre branchies de chaque côté sont garnies de vaisseaux sanguins dans leur partie convexe , et dénuées de toute apophyse et de tout tubercule dans leur partie concave.

Les nageoires du dos et de l'anús sont si basses , que la première s'élève à peine au-dessus du dos d'un soixantième de la longueur totale. Elles sont d'ailleurs réunies à celle de la queue , de manière qu'on a bien de la peine à déterminer la fin de l'une et le commencement de l'autre ; et on peut les considérer comme une bande très-étroite qui commence sur le dos à une certaine distance de la tête , s'étend jusqu'au bout de la queue , entoure cette extrémité , y forme une pointe assez aiguë , revient au-dessous de l'animal jusqu'à l'anús , et présente toujours assez peu de hauteur pour laisser subsister les plus grands rapports entre le corps du serpent et celui de l'anguille.

L'épaisseur de la partie membraneuse de ces trois nageoires réunies , fait qu'on ne compte que très-difficilement les petits rayons qu'elles renferment , et qui sont ordinairement au nombre de plus de mille , depuis le commencement de la nageoire dorsale jusqu'au bout de la queue.

Les couleurs que l'anguille présente sont toujours agréables , mais elles varient assez fréquemment ; et il paroît que leurs nuances dépendent beaucoup de l'âge de l'animal * , et de la qualité de l'eau au milieu de laquelle il vit. Lorsque cette eau est limoneuse , le dessus du corps de la murène que nous décrivons est d'un beau noir , et le dessous , d'un jaune plus ou moins clair. Mais si l'eau est pure et limpide , si elle coule sur un fond de sable , les teintes qu'offre l'anguille sont plus vives et plus riantes : sa partie supérieure est d'un verd nuancé , quelquefois

* *Voyage de Spallanzani dans les deux Siciles* , traduction du savant et élégant écrivain le citoyen Toscan , bibliothécaire du Muséum national d'histoire naturelle.

même rayé d'un brun qui le fait ressortir ; et le blanc du lait , ou la couleur de l'argent , brillent sur la partie inférieure du poisson. D'ailleurs la nageoire de l'anus est communément lisérée de blanc , et celle du dos , de rouge. Le blanc , le rouge et le verd , ces couleurs que la Nature sait marier avec tant de grace et fondre les unes dans les autres par des nuances si douces , composent donc l'une des parures élégantes que l'espèce de l'anguille a reçues , et celle qu'elle déploie lorsqu'elle passe sa vie au milieu d'une eau claire , vive et pure.

Au reste , les couleurs de l'anguille paroissent quelquefois d'autant plus variées par les différens reflets rapides et successifs de la lumière plus ou moins intense qui parvient jusqu'aux diverses parties de l'animal , que les mouvemens très-prompts et très-multipliés de cette murène peuvent faire changer à chaque instant l'aspect de ces mêmes portions colorées. Cette agilité est secondée par la nature de la charpente osseuse du corps et de la queue de l'animal. Ses vertèbres

un peu comprimées et par conséquent un peu étroites à proportion de leur longueur, pliantes et petites, peuvent se prêter aux diverses circonvolutions qu'elle a besoin d'exécuter. A ces vertèbres, qui communément sont au nombre de cent seize, sont attachées des côtes très-courtes, retenues par une adhérence très-légère aux apophyses des vertèbres, et très-propres à favoriser les sinuosités nécessaires à la natation de la murène. De plus, les muscles sont soutenus et fortifiés dans leur action par une quantité très-considérable de petits os disséminés entre leurs divers faisceaux, et connus sous le nom d'*arêtes* proprement dites, ou de *petites arêtes*. Ces os intermusculaires, que l'on ne voit dans aucune autre classe d'animaux que dans celle des poissons, et qui n'appartiennent même qu'à un certain nombre de poissons osseux, sont d'autant plus grands qu'ils sont placés plus près de la tête; et ceux qui occupent la partie antérieure de l'animal, sont communément divisés en deux petites branches.

Un instinct relevé ajoute aussi à la fré-

quence des mouvemens ; et nous avons déjà indiqué * que l'anguille , ainsi que les autres poissons osseux et serpenti-formes , avoit le cerveau plus étendu , plus alongé , composé de lobes moins inégaux , plus développés et plus nombreux , que le cerveau de la plupart des poissons dont il nous reste à parler , et particulièrement de ceux qui ont le corps très-applati , comme les pleuronectes.

Le cœur est quadrangulaire ; l'aorte grande ; le foie rougeâtre , divisé en deux lobes , dont le gauche est le plus volumineux ; la vésicule du fiel séparée du foie comme dans plusieurs espèces de serpens ; la rate alongée et triangulaire ; la vessie natatoire très-grande , attachée à l'épine et garnie par-devant d'un long conduit à gaz ; le canal intestinal dénué de ces appendices que l'on remarque auprès du pylore de plusieurs espèces de poissons , et presque sans sinuosités , ce qui indique la force des suc digestifs de l'anguille , et en général l'activité de ses

* Discours sur la nature des poissons.

humeurs et l'intensité de son principe vital.

Les murènes anguilles parviennent à une grandeur très-considérable : il n'est pas très-rare d'en trouver en Angleterre , ainsi qu'en Italie , du poids de huit à dix kilogrammes. Dans l'Albanie , on en a vu dont on a comparé la grosseur à celle de la cuisse d'un homme ; et des observateurs très-dignes de foi ont assuré que , dans des lacs de la Prusse , on en avoit pêché qui étoient longues de trois à quatre mètres. On a même écrit que le Gange en avoit nourri de plus de dix mètres de longueur ; mais ce ne peut être qu'une erreur , et l'on aura vraisemblablement donné le nom d'*anguille* à quelque grand serpent , à quelque boa devin que l'on aura apperçu de loin , nageant au-dessus de la surface du grand fleuve de l'Inde.

Quoi qu'il en soit , la croissance de l'anguille se fait très-lentement ; et nous avons sur la durée de son développement quelques expériences précises et curieuses qui m'ont été communiquées par un très-bon observateur , le citoyen Septfon-

taines, auquel j'ai eu plusieurs fois, en écrivant cette Histoire naturelle, l'occasion de témoigner ma juste reconnaissance.

Au mois de juin 1779 (*v. st.*), ce naturaliste mit soixante anguilles dans un réservoir; elles avoient alors environ dix-neuf centimètres. Au mois de septembre 1783, leur longueur n'étoit que de quarante à quarante-trois centimètres; au mois d'octobre 1786, cette même longueur n'étoit que de cinquante-un centimètres; et enfin, en juillet 1788, ces anguilles n'étoient longues que de cinquante-cinq centimètres au plus. Elles ne s'étoient donc alongées en neuf ans que de vingt-six centimètres.

Avec de l'agilité, de la souplesse, de la force dans les muscles, de la grandeur dans les dimensions, il est facile à la murenne que nous examinons, de parcourir des espaces étendus, de surmonter plusieurs obstacles, de faire de grands voyages, de remonter contre des courans rapides. Aussi va-t-elle périodiquement, tantôt des lacs ou des rivages voisins de la source

des rivières vers les embouchures des fleuves, et tantôt de la mer vers les sources ou les lacs. Mais , dans ces migrations régulières , elle suit quelquefois un ordre différent de celui qu'observent la plupart des poissons voyageurs. Elle obéit aux mêmes lois ; elle est régie de même par les causes dont nous avons tâché d'indiquer la nature dans notre premier Discours ; mais tel est l'ensemble de ses organes extérieurs et de ceux que son intérieur renferme , que la température des eaux , la qualité des alimens , la tranquillité ou le tumulte des rivages , la pureté du fluide , exercent , dans certaines circonstances, sur ce poisson vif et sensible, une action très-différente de celle qu'ils font éprouver au plus grand nombre des autres poissons non sédentaires. Lorsque le printemps commence de régner , ces derniers remontent des embouchures des fleuves vers les points les plus élevés des rivières ; quelques anguilles , au contraire , s'abandonnant alors au cours des eaux , vont des lacs dans les fleuves qui en sortent , et des fleuves vers les côtes maritimes.

Dans quelques contrées, et particulièrement auprès des lagunes de Venise, les anguilles remontent, dans le printemps, ou à peu près, de la mer Adriatique vers les lacs et les marais, et notamment vers ceux de Commachio, que la pêche des anguilles a rendus célèbres. Elles y arrivent par le Pô, quoique très-jeunes; mais elles n'en sortent pendant l'automne pour retourner vers les rivages de la mer, que lorsqu'elles ont acquis un assez grand développement, et qu'elles sont devenues presque adultes. La tendance à l'imitation, cette cause puissante de plusieurs actions très-remarquables des animaux, et la sorte de prudence qui paroît diriger quelques unes des habitudes des anguilles, les déterminent à préférer la nuit au jour pour ces migrations de la mer dans les lacs, et pour ces retours des lacs dans la mer. Celles qui vont, vers la fin de la belle saison, des marais de Commachio dans la mer de Venise, choisissent même pour leur voyage les nuits les plus obscures, et sur-tout celles dont les ténèbres sont épaissies par la présence de nuages ora-

geux. Une clarté plus ou moins vive, la lumière de la lune, des feux allumés sur le rivage, suffisent souvent pour les arrêter dans leur natation vers les côtes marines. Mais lorsque ces lueurs qu'elles redoutent ne suspendent pas leurs mouvemens, elles sont poussées vers la mer par un instinct si fort, ou, pour mieux dire, par une cause si énergique, qu'elles s'engagent entre des rangées de roseaux que les pêcheurs disposent au fond de l'eau pour les conduire à leur gré, et que, parvenant sans résistance et par le moyen de ces tranchées aux enceintes dans lesquelles on a voulu les attirer, elles s'entassent dans ces espèces de petits parcs, au point de surmonter la surface de l'eau, au lieu de chercher à revenir dans l'habitation qu'elles viennent de quitter.

Pendant cette longue course, ainsi que pendant le retour des environs de la mer vers les eaux douces élevées, les anguilles se nourrissent, aussi-bien que pendant qu'elles sont stationnaires, d'insectes, de vers, d'œufs et de petites espèces de poissons. Elles attaquent quelquefois des

animaux un peu plus gros. Le citoyen Septfontaines en a vu une de quatre-vingt-quatre centimètres présenter un nouveau rapport avec les serpens, en se jetant sur deux jeunes canards éclos de la veille, et en les avalant assez facilement pour qu'on pût les retirer presque entiers de ses intestins. Dans certaines circonstances, elles se contentent de la chair de presque tous les animaux morts qu'elles rencontrent au milieu des eaux; mais elles causent souvent de grands ravages dans les rivières. Le citoyen Noël nous écrit que dans la basse Seine elles détruisent beaucoup d'éperlans, de clupées feintes, et de brèmes.

Ce n'est pas cependant sans danger qu'elles recherchent l'aliment qui leur convient le mieux : malgré leur souplesse, leur vivacité, la vitesse de leur fuite, elles ont des ennemis auxquels il leur est très-difficile d'échapper. Les loutres, plusieurs oiseaux d'eau, et les grands oiseaux de rivage, tels que les grues, les hérons et les cigognes, les pêchent avec habileté et les retiennent.

avec adresse ; les hérons sur-tout ont dans la dentelure d'un de leurs ongles , des espèces de crochets qu'ils enfoncent dans le corps de l'anguille , et qui rendent inutiles tous les efforts qu'elle fait pour glisser au milieu de leurs doigts. Les poissons qui parviennent à une longueur un peu considérable , et , par exemple , le brochet et l'acipensère esturgeon , en font aussi leur proie ; et comme les esturgeons l'avalent toute entière et souvent sans la blesser , il arrive que , déliée , visqueuse et flexible , elle parcourt toutes les sinuosités de leur canal intestinal , sort par leur anus , et se dérobe , par une prompte natation , à une nouvelle poursuite. Il n'est presque personne qui n'ait vu un lombric avalé par des canards sortir de même des intestins de cet oiseau , dont il avoit suivi tous les replis ; et cependant c'est le fait que nous venons d'exposer , qui a donné lieu à un conte absurde accrédité pendant long-temps , à l'opinion de quelques observateurs très-peu instruits de l'organisation intérieure des animaux , et qui ont dit que l'an-

guille entroit ainsi volontairement dans le corps de l'esturgeon , pour aller y chercher des œufs dont elle aimoit beaucoup à se nourrir.

Mais voici un trait très-remarquable dans l'histoire d'un poisson , et qui a été vu trop de fois pour qu'on puisse en douter. L'anguille, pour laquelle les petits vers des prés, et même quelques végétaux, comme , par exemple , les pois nouvellement semés , sont un aliment peut-être plus agréable encore que des œufs ou des poissons , sort de l'eau pour se procurer ce genre de nourriture. Elle rampe sur le rivage par un mécanisme semblable à celui qui la fait nager au milieu des fleuves ; elle s'éloigne de l'eau à des distances assez considérables, exécutant avec son corps serpentiforme tous les mouvemens qui donnent aux couleuvres la faculté de s'avancer ou de reculer ; et après avoir fouillé dans la terre avec son museau pointu , pour se saisir des pois ou des petits vers , elle regagne en serpentant le lac ou la rivière dont elle étoit sortie , et vers lequel elle tend avec assez

de vitesse, lorsque le terrain ne lui oppose pas trop d'obstacles, c'est-à-dire, de trop grandes inégalités.

Au reste, pendant que la conformation de son corps et de sa queue lui permet de se mouvoir sur la terre sèche, l'organisation de ses branchies lui donne la faculté d'être pendant un temps assez long hors de l'eau douce ou salée sans en périr. En effet, nous avons vu qu'une des grandes causes de la mort des poissons que l'on retient dans l'atmosphère, est le grand desséchement qu'éprouvent leurs branchies, et qui produit la rupture des artères et des veines branchiales, dont le sang, qui n'est plus alors contrebalancé par un fluide aqueux environnant, tend d'ailleurs sans contrainte à rompre les membranes qui le contiennent. Mais l'anguille peut conserver plus facilement que beaucoup d'autres poissons, l'humidité, et par conséquent la ductilité et la ténacité des vaisseaux sanguins de ses branchies; elle peut clore exactement l'ouverture de sa bouche; l'orifice branchial, par lequel un air

desséchant paroîtroit devoir s'introduire en abondance , est très-étroit et peu alongé ; l'opercule et la membrane sont placés et conformés de manière à fermer parfaitement cet orifice ; et de plus , la liqueur gluante et copieuse dont l'animal est imprégné , entretient la mollesse de toutes les portions des branchies. Nous devons encore ajouter que , soit pour être moins exposée aux attaques des animaux qui cherchent à la dévorer, et à la poursuite des pêcheurs qui veulent en faire leur proie , soit pour obéir à quelque autre cause que l'on pourroit trouver sans beaucoup de peine, et qu'il est, dans ce moment, inutile de considérer, l'anguille ne va à terre , au moins le plus fréquemment , que pendant la nuit. Une vapeur humide est très-souvent alors répandue dans l'atmosphère ; le dessèchement de ses branchies ne peut avoir lieu que plus difficilement ; et l'on doit voir maintenant pourquoi , dès le temps de Pline , on avoit observé en Italie que l'anguille peut vivre hors de l'eau jusqu'à six jours , lorsqu'il ne souffle pas

un vent méridional , dont l'effet le plus ordinaire , dans cette partie de l'Europe , est de faire évaporer l'humidité avec beaucoup de vîtesse. .

Pendant le jour , la murène anguille , moins occupée de se procurer l'aliment qu'elle desire , se tient presque toujours dans un repos réparateur , et dérobée aux yeux de ses ennemis par un asyle qu'elle prépare avec soin. Elle se creuse avec son museau une retraite plus ou moins grande dans la terre molle du fond des lacs et des rivières ; et par une attention particulière , résultat remarquable d'une expérience dont l'effet se maintient de génération en génération , cette espèce de terrier a deux ouvertures , de telle sorte que si elle est attaquée d'un côté , elle peut s'échapper de l'autre. Cette industrie , pareille à celle des animaux les plus précautionnés , est une nouvelle preuve de cette supériorité d'instinct que nous avons dû attribuer à l'anguille dès le moment où nous avons considéré dans ce poisson le volume et la forme du cerveau , l'organisation plus

soignée des sièges de l'odorat, et enfin la flexibilité et la longueur du corps et de la queue, qui, souples et continuellement humectés, s'appliquent dans toute leur étendue à presque toutes les surfaces, en reçoivent des impressions que des écailles presque insensibles ne peuvent ni arrêter, ni, en quelque sorte, diminuer, et doivent donner à l'animal un toucher assez vif et assez délicat.

Il est à remarquer que les anguilles, qui, par une suite de la longueur et de la flexibilité de leur corps, peuvent, dans tous les sens, agir sur l'eau presque avec la même facilité et par conséquent reculer presque aussi vite qu'elles avancent, pénètrent souvent la queue la première dans les trous qu'elles forment dans la vase, et qu'elles creusent quelquefois cette cavité avec cette même queue, aussi-bien qu'avec leur tête.

Lorsqu'il fait très-chaud, ou dans quelques autres circonstances, l'anguille quitte cependant quelquefois, même vers le milieu du jour, cet asyle qu'elle sait se donner. On la voit très-souvent alors

s'approcher de la surface de l'eau , se placer au-dessous d'un amas de mousse flottante ou de plantes aquatiques , y demeurer immobile , et paroître se plaire dans cette sorte d'inaction et sous cet abri passager. On seroit même tenté de croire qu'elle se livre quelquefois à une espèce de demi-sommeil sous ce toit de feuilles et de mousse. Le citoyen Septfontaines nous a écrit , en effet , dans le temps , qu'il avoit vu plusieurs fois une anguille dans la situation dont nous venons de parler ; qu'il étoit parvenu à s'en approcher , à élever progressivement la voix , à faire tinter plusieurs clefs l'une contre l'autre , à faire sonner très-près de la tête du poisson plus de quarante coups d'une montre à répétition , sans produire dans l'animal aucun mouvement de crainte , et que la murène ne s'étoit plongée au fond de l'eau que lorsqu'il s'étoit avancé brusquement vers elle , ou qu'il avoit ébranlé la plante touffue sous laquelle elle goûtoit le repos.

De tous les poissons osseux , l'anguille n'est cependant pas celui dont l'ouïe est

la moins sensible. On sait depuis longtemps qu'elle peut devenir familière au point d'accourir vers la voix ou l'instrument qui l'appelle et qui lui annonce la nourriture qu'elle préfère.

Les murènes anguilles sont en très-grand nombre par-tout où elles trouvent l'eau, la température, l'aliment qui leur conviennent, et où elles ne sont pas privées de toute sûreté. Voilà pourquoi, dans plusieurs des endroits où l'on s'est occupé de la pêche de ces poissons, on en a pris une immense quantité. Pline a écrit que dans le lac Benaco des environs de Vérone, les tempêtes qui, vers la fin de l'automne, en bouleversent les flots, agitoient, entraînoient et rouloient, pour ainsi dire, un nombre si considérable d'anguilles, qu'on les prenoit par milliers à l'endroit où le fleuve venoit de sortir du lac. Martini rapporte dans son Dictionnaire, qu'autrefois on en pêchoit jusqu'à soixante mille dans un seul jour et avec un seul filet. On lit dans l'ouvrage de Redi sur les animaux vivans dans les animaux vivans, que lors du second pas-

sage des anguilles dans l'Arno , c'est-à-dire , lorsqu'elles remontent de la mer vers les sources de ce fleuve de Toscane , plus de deux cent mille peuvent tomber dans les filets , quoique dans un très-court espace de temps. Il y en a une si grande abondance dans les marais de Commachio , qu'en 1782 on en pêcha 990,000 kilogrammes. Dans le Jutland , il est des rivages vers lesquels , dans certaines saisons , on prend quelquefois d'un seul coup de filet plus de neuf mille anguilles , dont quelques unes pèsent de quatre à cinq kilogrammes. Et nous savons , par le citoyen Noël , qu'à Cléon près d'Elbeuf , et même auprès de presque toutes les rives de la basse Seine , il passe des troupes ou plutôt des légions si considérables de petites anguilles , qu'on en remplit des seaux et des baquets.

Cette abondance n'a pas empêché le goût le plus difficile en bonne chère , et le luxe même le plus somptueux , de rechercher l'anguille , et de la servir dans leurs banquets. Cependant sa viscosité ,

le suc huileux dont elle est imprégnée, la difficulté avec laquelle les estomacs délicats en digèrent la chair, sa ressemblance avec un serpent, l'ont fait regarder dans certains pays, comme un aliment un peu mal-sain par les médecins, et comme un être impur par les esprits superstitieux. Elle est comprise parmi les poissons en apparence dénués d'écaillés, que les lois religieuses des Juifs interdisaient à ce peuple; et les réglemens de Numa ne permettoient pas de les servir dans les sacrifices, sur les tables des dieux. Mais les défenses de quelques législateurs, et les recommandations de ceux qui ont écrit sur l'hygiène, ont été peu suivies et peu imitées; la saveur agréable de la chair de l'anguille, et le peu de rareté de cette espèce, l'ont emporté sur ces ordres ou ces conseils: on s'est rassuré par l'exemple d'un grand nombre d'hommes, à la vérité, laborieux, qui, vivant au milieu des marais, et ne se nourrissant que d'anguilles, comme les pêcheurs des lacs de Commachio auprès de Venise, ont

cependant joui d'une santé assez forte, présenté un tempérament robuste, atteint une vieillesse avancée; et l'on a, dans tous les temps et dans presque tous les pays, consacré d'autant plus d'instans à la pêche assez facile de cette murène, que sa peau peut servir à beaucoup d'usages, que dans plusieurs contrées on en fait des liens assez forts, et que dans d'autres, comme, par exemple, dans quelques parties de la Tartarie, et particulièrement dans celles qui avoisinent la Chine, cette même peau remplace, sans trop de désavantage, les vitres des fenêtres.

Dans plusieurs pays de l'Europe, et notamment aux environs de l'embouchure de la Seine, on prend les anguilles avec des *haims* ou *hameçons*. Les plus petites sont attirées par des lombrics ou vers de terre, plus que par toute autre amorce; on emploie contre les plus grandes, des haims garnis de moules, d'autres animaux à coquille, ou de jeunes éperlans. Lorsqu'on pêche les anguilles pendant la nuit, on se sert d'un filet

nommé *seine drue* , et pour la description duquel nous renvoyons le lecteur à l'article de la *raie bouclée*. On substitue quelquefois à cette *seine* un autre filet appelé , dans la rivière de Seine, *dranguet* , ou *dranguet dru* , dont les mailles sont encore plus serrées que celles de la *seine drue* ; et le citoyen Noël nous fait observer , dans une note qu'il nous a adressée , que c'est par une suite de cette substitution , et parce qu'en général on exécute mal les lois relatives à la police des pêches , que les pêcheurs de la Seine détruisent une grande quantité d'anguilles du premier âge et qui n'ont encore atteint qu'une longueur d'un ou deux décimètres , pendant qu'ils prennent , peut-être plus inutilement encore , dans ce même dranguet , beaucoup de frai de barbeau , de vandoise , de brème , et d'autres poissons recherchés. Mais l'usage de ce filet à mailles très-serrées n'est pas la seule cause contraire à l'avantageuse reproduction , ou , pour mieux dire , à l'accroissement convenable des anguilles dans la Seine : le citoyen Noël

nous en fait remarquer deux autres dans la note que nous venons de citer. Premièrement, les pêcheurs de cette rivière ont recours quelquefois, pour la pêche de ces murènes, à la *vermille*, sorte de corde garnie de vers, à laquelle les très-jeunes individus de cette espèce viennent s'attacher très-fortement, et par le moyen de laquelle on enlève des milliers de ces petits animaux. Secondement, les fossés qui communiquent avec la basse Seine, ont assez peu de pente pour que les petites anguilles, poussées par le flux dans ces fossés, y restent à sec lorsque la marée se retire, et y périssent en nombre extrêmement considérable, par l'effet de la grande chaleur du soleil de prairial.

Au reste, c'est le plus souvent depuis le commencement du printemps jusque vers la fin de l'automne, qu'on pêche les murènes anguilles avec facilité. On a communément assez de peine à les prendre au milieu de l'hiver, au moins à des latitudes un peu élevées; elles se cachent, pendant cette saison, ou dans les ter-

riers qu'elles se sont creusés , ou dans quelques autres asyles à peu près semblables. Elles se réunissent même en assez grand nombre , se serrent de très-près , et s'amoncellent dans ces retraites , où il paroît qu'elles s'engourdissent lorsque le froid est rigoureux. On en a quelquefois trouvé cent quatre-vingts dans un trou de quarante décimètres cubes ; et le citoyen Noël nous mande qu'à Aisiey près de Quillebeuf , on en prend souvent , pendant l'hiver , de très-grandes quantités , en fouillant dans le sable , entre les pierres du rivage. Si l'eau dans laquelle elles se trouvent est peu profonde , si par ce peu d'épaisseur des couches du fluide elles sont moins à couvert des impressions funestes du froid , elles périssent dans leur terrier , malgré toutes leurs précautions ; et le savant Spallanzani rapporte qu'un hiver fit périr , dans les marais de Commachio , une si grande quantité d'anguilles , qu'elles pesoient 1,800,000 kilogrammes.

Dans toute autre circonstance , une grande quantité d'eau n'est pas aussi

nécessaire aux murènes dont nous nous occupons , que plusieurs auteurs l'ont prétendu. Le citoyen Septfontaines a pris dans une fosse qui contenoit à peine quatre cents décimètres cubes de ce fluide , une anguille d'une grosseur très-considérable ; et la distance de la fosse à toutes les eaux de l'arrondissement , ainsi que le défaut de toute communication entre ces mêmes eaux et la petite mare , ne lui ont pas permis de douter que cet animal n'eût vécu très-long-temps dans cet étroit espace , des effets duquel l'état de sa chair prouvoit qu'il n'avoit pas souffert.

Nous devons ajouter néanmoins que si la chaleur est assez vive pour produire une très-grande évaporation et altérer les plantes qui croissent dans l'eau , ce fluide peut être corrompu au point de devenir mortel pour l'anguille , qui s'efforce en vain , en s'abritant alors dans la fange , de se soustraire à l'influence funeste de cette chaleur desséchante.

On a écrit aussi que l'anguille ne supportoit pas des changemens rapides et

très-marqués dans la qualité des eaux au milieu desquelles elle habitoit. Cependant le citoyen Septfontaines a prouvé plusieurs fois qu'on pouvoit la transporter, sans lui faire courir aucun danger, d'une rivière bourbeuse dans le vivier le plus limpide, du sein d'une eau froide dans celui d'une eau tempérée. Il s'est assuré que des changemens inverses ne nuisoient pas davantage à ce poisson, et sur trois cents individus qui ont éprouvé sous ses yeux ces diverses transmigrations, et qui les ont essuyées dans différentes saisons, il n'en a péri que quinze, qui lui ont paru ne succomber qu'à la fatigue du transport, et aux suites de leur réunion et de leur séjour très-prolongé dans un vaisseau trop peu spacieux.

Néanmoins, lorsque leur passage d'un réservoir dans un autre, quelle que soit la nature de l'eau de ces viviers, a lieu pendant des chaleurs excessives, il arrive souvent que les anguilles gagnent une maladie épidémique pour ces animaux, et dont les symptômes consistent dans les

taches blanches qui leur surviennent. Nous verrons, dans notre Discours sur la manière de multiplier et de conserver les individus des diverses espèces de poisson, quels remèdes on peut opposer aux effets de cette maladie, dont des taches blanches et accidentelles dénotent la présence.

Les murènes dont nous parlons sont sujettes, ainsi que plusieurs autres poissons, et particulièrement ceux que l'homme élève avec plus ou moins de soin, à d'autres maladies dont nous traiterons dans la suite de cet ouvrage, et dont quelques unes peuvent être causées par une grande abondance de vers dans quelque partie intérieure de leur corps, comme, par exemple, dans leurs intestins.

Pendant la plupart de ces dérangemens, lorsque les suites peuvent en être très-graves, l'anguille se tient renfermée dans son terrier, ou, si elle manque d'asyle, elle remonte souvent vers la superficie de l'eau; elle s'y agite, va, revient sans but déterminé, tournoie sur

elle-même, ressemble par ses mouvemens à un serpent prêt à se noyer et luttant encore un peu contre les flots. Son corps enflé d'un bout à l'autre, et par-là devenu plus léger relativement au fluide dans lequel elle nage, la soulève et la retient ainsi vers la surface de l'eau. Au bout de quelque temps, sa peau se flétrit et devient blanche; et lorsqu'elle éprouve cette altération, signe d'une mort prochaine, on diroit qu'elle ne prend plus soin de conserver une vie qu'elle sent ne pouvoir plus retenir. Ses nageoires se remuent encore un peu; ses yeux paroissent encore se tourner vers les objets qui l'entourent: mais sans force, sans précaution, sans intérêt inutile pour sa sûreté, elles s'abandonne, pour ainsi dire, et souffre qu'on l'approche, qu'on la touche, qu'on l'enlève même sans qu'elle cherche à s'échapper.

Au reste, lorsque des maladies ne dérangent pas l'organisation intérieure de l'anguille, lorsque sa vie n'est attaquée que par des blessures, elle la perd assez difficilement; le principe vital paroît dissé-

miné d'une manière assez indépendante ; si je puis employer ce mot , dans les diverses parties de cette murène , pour qu'il ne puisse être éteint que lorsqu'on cherche à l'anéantir dans plusieurs points à la fois ; et , de même que dans plusieurs serpens , et particulièrement dans la vipère , une heure après la séparation du tronc et de la tête , l'une et l'autre de ces portions peuvent donner encore des signes d'une grande irritabilité.

Cette vitalité tenace est une des causes de la longue vie que nous croyons devoir attribuer aux anguilles , ainsi qu'à la plupart des autres poissons. Toutes les analogies indiquent cette durée considérable , malgré ce qu'ont écrit plusieurs auteurs , qui ont voulu limiter la vie de ces murènes à quinze ans , et même à huit années : et d'ailleurs nous savons , de manière à ne pouvoir pas en douter , qu'au bout de six ans une anguille ne pèse quelquefois que cinq hectogrammes ; que des anguilles conservées pendant neuf ans , n'ont acquis qu'une longueur de vingt-six centimètres ; que ces anguilles ,

avant d'être devenues l'objet d'une observation précise, avoient déjà dix-neuf centimètres, et par conséquent devoient être âgées de cinq ou six ans; qu'à la fin de l'expérience elles avoient au moins quatorze ans; qu'à cet âge de quatorze ans elles ne présentoient encore que le quart ou tout au plus le tiers de la longueur des grandes anguilles pêchées dans des lacs de la Prusse, et qu'elles n'auroient pu parvenir à cette dernière dimension qu'après un intervalle de quatre-vingts ans. Les anguilles de trois ou quatre mètres de longueur, vues dans des lacs de la Prusse par des observateurs dignes de foi, avoient donc au moins quatre-vingt-quatorze ans : nous devons dire que des preuves de fait et des témoignages irrécusables se réunissent aux probabilités fondées sur les analogies les plus grandes, pour nous faire attribuer une longue vie à la murène anguille.

Mais comment se perpétue cette espèce utile et curieuse ? L'anguille vient d'un véritable œuf, comme tous les poissons. L'œuf éclot le plus souvent dans le ventre

de la mère , comme celui des raies , des squales , de plusieurs blennies , de plusieurs silures ; la pression sur la partie inférieure du corps de la mère facilite la sortie des petits déjà éclos. Ces faits , bien vus , bien constatés par les naturalistes récents , sont simples et conformes aux vérités physiologiques les mieux prouvées , aux résultats les plus sûrs des recherches anatomiques sur les poissons , et particulièrement sur l'anguille ; et cependant combien , depuis deux mille ans , ils ont été altérés et dénaturés par une trop grande confiance dans des observations précipitées et mal faites , qui ont séduit les plus beaux génies , parmi lesquels nous comptons non seulement Pline , mais même Aristote ! Lorsque les anguilles mettent bas leurs petits , communément elles reposent sur la vase du fond des eaux ; c'est au milieu de cette terre ou de ce sable humecté qu'on voit frétiller les murènes qui viennent de paroître à la lumière : Aristote a pensé que leur génération étoit due à cette fange. Les mères vont quelquefois frot-

ter leur ventre contre des rochers ou d'autres corps durs , pour se débarrasser plus facilement des petits déjà éclos dans leur intérieur ; Pline a écrit que par ce frottement elles faisoient jaillir des fragmens de leur corps , qui s'animoient , et que telle étoit la seule origine des jeunes murènes dont nous exposons la véritable manière de naître. D'autres anciens auteurs ont placé cette même origine dans les chairs corrompues des cadavres des chevaux ou d'autres animaux jetés dans l'eau , cadavres autour desquels doivent souvent fourmiller de très - jeunes anguilles , forcées de s'en nourrir par le défaut de tout autre aliment placé à leur portée. A des époques bien plus rapprochées de nous , Helmont a cru que les anguilles venoient de la rosée du mois de mai ; et Leuwenhoeck a pris la peine de montrer la cause de cette erreur , en faisant voir que dans cette belle partie du printemps , lorsque l'atmosphère est tranquille et que le calme règne sur l'eau , la portion de ce fluide la plus chaude est la plus voisine de la surface , et que c'est

cette couche plus échauffée , plus vivifiante , et plus analogue à leur état de foiblesse, que les jeunes anguilles peuvent alors préférer. Schwenckfeld , de Breslaw en Silésie , a fait naître les murènes anguilles des branchies du cyprin bordelière ; Schoneveld , de Kiel dans le Holstein , a voulu qu'elles vinssent à la lumière sur la peau des gades morues , ou des salmones éperlans. Ils ont pris l'un et l'autre pour de très-petites murènes anguilles , des gordius , des sangsues , ou d'autres vers qui s'attachent à la peau ou aux branchies de plusieurs poissons. Eller, Charleton, Fahlberg, Gesner, Birckholtz, ont connu , au contraire, la véritable manière dont se reproduit l'espèce que nous décrivons. Plusieurs observateurs des temps récents sont tombés , à la vérité , dans une erreur combattue même par Aristote , en prenant les vers qu'ils voyoient dans les intestins des anguilles qu'ils disséquoient , pour des fœtus de ces animaux. Leuwenhoeck a eu tort de chercher les œufs de ces poissons dans leur vessie urinaire , et Vallisnieri dans leur

vessie natatoire : mais Muller , et peut-être Moudini , ont vu les ovaires ainsi que les œufs de la femelle ; et la laite du mâle a été également reconnue.

D'après toutes ces considérations , on doit éprouver un assez grand étonnement , et ce vif intérêt qu'inspirent les recherches et les doutes d'un des plus habiles et des plus célèbres physiciens , lorsqu'on lit dans le *Voyage de Spallanzani* , que des millions d'anguilles ont été pêchées dans les marais , les lacs ou les fleuves de l'Italie et de la Sicile , sans qu'on ait vu dans leur intérieur ni œufs ni fœtus. Ce savant observateur explique ce phénomène , en disant que les anguilles ne multiplient que dans la mer ; et voilà pourquoi , continue-t-il , on n'en trouve pas , suivant Senebier , dans le lac de Genève , jusqu'auquel la chute du Rhône ne leur permet pas de remonter , tandis qu'on en pêche dans le lac de Neuchâtel , qui communique avec la mer par le Rhin et le lac de Brenna. Il invite , en conséquence , les naturalistes à faire de nouvelles recherches sur les anguilles

qu'ils rencontreront au milieu des eaux salées, et de la mer proprement dite, dans le temps du frai de ces animaux, c'est-à-dire, vers le milieu de l'automne, ou le commencement de l'hiver.

Les œufs de l'anguille éclosant presque toujours dans le ventre de la mère, y doivent être fécondés : il est donc nécessaire qu'il y ait dans cette espèce un véritable accouplement du mâle avec la femelle, comme dans celles des raies, des squales, des syngnathes, des blennies et des silures; ce qui confirme ce que nous avons déjà dit de la nature de ses affections. Et comme la conformation des murènes est semblable en beaucoup de points à celle des serpens, l'accouplement des serpens et celui des murènes doivent avoir lieu, à peu près, de la même manière. Rondelet a vu, en effet, le mâle et la femelle entrelacés dans le moment de leur réunion la plus intime, comme deux couleuvres le sont dans des circonstances analogues; et ce fait a été observé depuis par plusieurs naturalistes.

Dans l'anguille, comme dans tous les

autres poissons qui éclosent dans le ventre de leur mère , les œufs renfermés dans l'intérieur de la femelle sont beaucoup plus volumineux que ceux qui sont pondus par les espèces de poissons auxquelles on n'a pas donné le nom de *vivipares* ou de *vipères* : le nombre de ces œufs doit donc être beaucoup plus petit dans les premiers que dans les seconds ; et c'est ce qui a été reconnu plus d'une fois.

L'anguille est féconde au moins dès sa douzième année. Le citoyen Septfontaines a trouvé des petits bien formés dans le ventre d'une femelle qui n'avoit encore que trente-cinq centimètres de longueur , et qui , par conséquent , pouvoit n'être âgée que de douze ans. Cette espèce croissant au moins jusqu'à sa quatre-vingt-quatorzième année , chaque individu femelle peut produire pendant un intervalle de quatre-vingt-deux ans ; et ceci sert à expliquer la grande quantité d'anguilles que l'on rencontre dans les eaux qui leur conviennent. Cependant , comme le nombre des petits qu'elles peuvent mettre au jour chaque année est très-

limité, et que, d'un autre côté, les accidens, les maladies, l'activité des pêcheurs, et la voracité des grands poissons, des loutres, et des oiseaux d'eau, en détruisent fréquemment une multitude, on ne peut se rendre raison de leur multiplication qu'en leur attribuant une vie et même un temps de fécondité beaucoup plus longs qu'un siècle, et beaucoup plus analogues à la nature des poissons, ainsi qu'à la longévité qui en est la suite.

Au reste, il paroît que dans certaines contrées, et dans quelques circonstances, il arrive aux œufs de l'anguille ce qui survient quelquefois à ceux des raies, des squales, des blennies, des silures, etc.; c'est que la femelle s'en débarrasse avant que les petits ne soient éclos; et l'on peut le conclure des expressions employées par quelques naturalistes en traitant de cette murène, et notamment par Redi dans son ouvrage des animaux vivans dans les animaux vivans.

Tous les climats peuvent convenir à l'anguille: on la pêche dans des contrées très-chaudes, à la Jamaïque, dans d'autres

portions de l'Amérique voisines des tropiques , dans les Indes orientales ; elle n'est point étrangère aux régions glacées, à l'Islande , au Groenland ; et on la trouve dans toutes les contrées tempérées, depuis la Chine , où elle a été figurée très-exactement pour l'intéressante suite de dessins donnés par la Hollande à la France et déposés dans le Muséum d'histoire naturelle , jusqu'aux côtes occidentales de la République et à ses départemens méridionaux , dans lesquels les murènes de cette espèce deviennent très-belles et très-bonnes, particulièrement celles qui vivent dans le bassin si célébré de la poétique fontaine de Vaucluse*.

Dans des temps plus reculés et antérieurs aux dernières catastrophes que le globe a éprouvées , ces mêmes murènes ont dû être aussi très-répandues en Europe , ou du moins très-multipliées dans un grand nombre de contrées , puisqu'on reconnoît leurs restes , ou leur em-

* Note communiquée vers 1788 par l'évêque d'Uzès , ami très-zélé et très-éclairé des sciences naturelles.

preinte, dans presque tous les amas de poissons pétrifiés ou fossiles que les naturalistes ont été à portée d'examiner, et sur-tout dans celui que l'on a découvert à Æningen, auprès du lac de Constance, et dont une notice a été envoyée dans le temps par le célèbre Lavater à l'illustre Saussure.

Nous ne devons pas cesser de nous occuper de l'anguille, sans faire mention de quelques murènes que nous considérerons comme de simples variétés de cette espèce, jusqu'au moment où de nouveaux faits nous les feront regarder comme constituant des espèces particulières. Ces variétés sont au nombre de cinq : deux diffèrent par leur couleur de l'anguille commune ; les autres trois en sont distinguées par leur forme. Nous devons la connoissance de la première à Spallanzani ; et la notice des autres nous a été envoyée par le citoyen Noël de Rouen, que nous avons si souvent le plaisir de citer.

Premièrement, celle de ces variétés qui a été indiquée par Spallanzani, se trouve

dans les marais de Chiozza auprès de Venise. Elle est jaune sous le ventre , constamment plus petite que l'anguille ordinaire ; et ses habitudes ont cela de remarquable , qu'elle ne quitte pas périodiquement ses marais , comme l'espèce commune , pour aller , vers la fin de la saison des chaleurs , passer un temps plus ou moins long dans la mer. Elle porte un nom particulier : on la nomme *acerrine*.

Secondement , des pêcheurs de la Seine disent avoir remarqué que les premières anguilles qu'ils prennent sont plus blanches que celles qui sont pêchées plus tard. Selon d'autres , de même que les anguilles sont communément plus rouges sur les fonds de roche , et deviennent en peu de jours d'une teinte plus foncée lorsqu'on les a mises dans des réservoirs , elles sont plus blanches sur des fonds de sable. Mais , indépendamment de ces nuances plus ou moins constantes que présentent les anguilles communes , on observe dans la Seine une anguille qui vient de la mer lorsque les marées sont fortes , et qui

remonte dans la rivière en même temps que les merlans. Sa tête est un peu menue. Elle est d'ailleurs très-belle et communément assez grosse. On la prend quelquefois avec la *seine* *; mais le plus souvent on la pêche avec une ligne dont les appâts sont des éperlans et d'autres petits poissons.

Troisièmement, le *pimperneau* est, suivant plusieurs pêcheurs, une autre anguille de la Seine, qui a la tête menue comme l'anguille blanche, mais qui de plus l'a très-allongée, et dont la couleur est brune.

Quatrièmement, une autre anguille de la même rivière est nommée *guiseau*. Elle a la tête plus courte et un peu plus large que l'anguille commune. Le guiseau a d'ailleurs le corps plus court; son œil est plus gros, sa chair plus ferme, sa graisse plus délicate. Sa couleur varie du noir au brun, au gris sale, au rousâtre.

On le prend depuis le *Hoc* jusqu'à *Vil-*

* Voyez, à l'article de la *raie bouclée*, la description du filet appelé *seine*.

lequier, et rarement au-dessus. Le citoyen Noël pense que le bon goût de sa chair est dû à la nourriture substantielle et douce qu'il trouve sur les bancs de l'embouchure de la Seine, ou au grand nombre de jeunes et petits poissons qui pullulent sur les fonds voisins de la mer. Il croit aussi que cette murène a beaucoup de rapports, par la délicatesse de sa chair, avec l'anguille que l'on pêche dans l'Eure, et que l'on désigne par le nom de *breteau*. Les troupes de guiseaux sont quelquefois *détrillées*, suivant l'expression des pêcheurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont, dans certaines circonstances, mêlés avec aucune autre murène; et d'autres fois on pêche, dans le même temps, des quantités presque égales d'anguilles communes et de guiseaux. Un pêcheur de Villequier a dit au citoyen Noël qu'il avoit pris, un jour, d'un seul coup de filet, cinq cents guiseaux, au pied du château d'Orcheb.

Cinquièmement, l'*anguille chien* a la tête plus longue que la commune, comme le pimperneau, et plus large, comme le

guiseau. Cette partie du corps est d'ailleurs applatie. Ses yeux sont gros. Ses dimensions sont assez grandes; mais son ensemble est peu agréable à la vue, et sa chair est filamenteuse. On dit qu'elle a des barbillons à la bouche. Je n'ai pas été à même de vérifier l'existence de ces barbillons, qui peut-être ne sont que les petits tubes à l'extrémité desquels sont placés les orifices des narines. L'*anguille chien* est très-goulue; et de là vient le nom qu'on lui a donné. Elle dévore les petits poissons qu'elle peut saisir dans les nasses, déchire les filets, ronge même les fils de fer des lignes. Lorsqu'elle est prise à l'hameçon, on remarque qu'elle a avalé l'haim de manière à le faire parvenir jusqu'à l'œsophage, tandis que les anguilles ordinaires ne sont retenues avec l'hameçon que par la partie antérieure de leur palais. On la pêche avec plus de facilité vers le commencement de l'automne; elle paroît se plaire beaucoup sur les fonds qui sont au-dessus de Candeleu. Dans l'automne de l'an 6 de l'ère françoise, une troupe d'*anguilles chiens*

remonta jusqu'au passage du Croisset : elle y resta trois ou quatre jours ; et n'y trouvant pas apparemment une nourriture suffisante ou convenable , elle redescendit vers la mer.

LA MURÈNE TACHETÉE,

E T

LA MURÈNE MYRE.

FORSKÆL a vu dans l'Arabie la murène tachetée, et en a publié le premier la description. Cette murène a la mâchoire inférieure plus avancée que la supérieure, comme l'anguille, avec laquelle elle a d'ailleurs beaucoup de ressemblance; mais elle en diffère par une callosité placée entre les yeux, par le nombre des rayons de ses nageoires ainsi que de sa membrane branchiale*, et par la dispo-

* A la membrane branchiale

de la murène tachetée.. 6 rayons.

à la nageoire du dos..... 43

à chacune des pectorales.. 9, ou à peu près.

à la nageoire de l'anus.... 36

à celle de la queue..... 10

sition de ses couleurs. Elle est d'un verd de mer, relevé par un grand nombre de taches noires; et une tache plus grande est placée auprès de la tête, de chaque côté du corps.

La myre habite dans une mer très-voisine des contrées dans lesquelles on a pêché la tachetée : on la trouve dans la Méditerranée. Son museau est un peu pointu ; les bords des mâchoires et le milieu du palais sont garnis de deux ou trois rangées de petites dents presque égales ; deux appendices très-courts et un peu cylindriques sont placés sur la lèvre supérieure *. Plusieurs raies blanchâtres, les unes longitudinales et les autres transversales, règnent sur la partie supérieure de la tête. La nageoire du dos, celle de la queue, et celle de l'anus, qui sont réunies, présentent une belle couleur blanche et un liséré d'un noir foncé. Telles sont du moins les couleurs

- * A la membrane des branchies de
la murène myre..... 10 rayons.
à chacune de ses nageoires pecto-
rales..... 16

que l'on remarque sur le plus grand nombre de myres : mais Forskael a fait connoître une murène qu'il regarde comme une variété de l'espèce que nous décrivons , et qui est d'un gris cendré sur toute sa surface. On a soupçonné que cette variété contenoit dans sa tête un poison plus ou moins actif. Pour peu qu'on se souvienne de ce que nous avons dit au sujet des qualités vénéneuses des poissons , on verra sans peine de quelle nature devront être les observations dont cette variété sera l'objet , pour que l'opinion des naturalistes soit fixée sur la faculté malfaisante attribuée à ces murènes myres d'une couleur cendrée. Au reste , si l'existence d'un véritable poison dans quelque vaisseau de la tête de cette variété est bien constatée, il faudra , sans hésiter , la considérer comme une espèce différente de toutes les murènes déjà connues.

LA MURÈNE CONGRE *.

LE congre a beaucoup de rapports avec l'anguille : mais il en diffère par les proportions de ses diverses parties ; par la plus grande longueur des petits appendices cylindriques placés sur le museau , et que l'on a nommés *barbillons* ; par le diamètre de ses yeux , qui sont plus gros ; par la nuance noire que présente presque toujours le bord supérieur de sa nageoire dorsale ; par la place de cette nageoire , ordinairement plus rapprochée de la tête ; par la manière dont se montre aux yeux la ligne latérale composée d'une longue série de points blancs ; par sa couleur , qui sur sa partie supérieure est blanche , ou cendrée , ou noire , sui-

* *Anguille de mer ; filat* , auprès des côtes méridionales de France ; *conger eel* , en Angleterre ; *bronco* , dans plusieurs contrées de l'Italie.

vant les plages qu'il fréquente , qui sur sa partie inférieure est blanche , et qui d'ailleurs offre fréquemment des teintes vertes sur la tête , des teintes bleues sur le dos , et des teintes jaunes sous le corps ainsi que sous la queue ; par ses dimensions supérieures à celles de l'anguille , puisqu'il n'est pas très-rare de lui voir de trente à quarante décimètres de longueur , avec une circonférence de près de cinq décimètres , et que , suivant Gesner , il peut parvenir à une longueur de près de six mètres ; et enfin par la nature de son habitation , qu'il choisit presque toujours au milieu des eaux salées. On le trouve dans toutes les grandes mers de l'ancien et du nouveau continent ; il est très-répandu sur-tout dans l'Océan d'Europe , sur les côtes d'Angleterre et de France , dans la Méditerranée , où il a été très-recherché des anciens , et dans la Propontide , où il l'a été dans des temps moins reculés. Ses œufs sont enveloppés d'une matière grasseuse très-abondante.

Il est très-vorace ; et comme il est

grand et fort, il peut se procurer aisément l'aliment qui lui est nécessaire.

La recherche à laquelle le besoin et la faim le réduisent, est d'ailleurs d'autant moins pénible, qu'il vit presque toujours auprès de l'embouchure des grands fleuves, où il se tient comme en embuscade pour faire sa proie et des poissons qui descendent des rivières dans la mer, et de ceux qui remontent de la mer dans les rivières. Il se jette avec vitesse sur ces animaux ; il les empêche de s'échapper, en s'entortillant autour d'eux, comme un serpent autour de sa victime ; il les renferme, pour ainsi dire, dans un filet, et c'est de là que vient le nom de *filat* (filet) qu'on lui a donné dans plusieurs départemens méridionaux de France. C'est aussi de cette manière qu'il attaque et retient dans ses contours sinueux les poulpes ou sépies, ainsi que les crabes qu'il rencontre dépouillés de leur tête. Mais s'il est dangereux pour un grand nombre d'habitans de la mer, il est exposé à beaucoup d'ennemis : l'homme le poursuit avec ardeur dans les pays où sa

chair est estimée; les très-grands poissons le dévorent; la langouste le combat avec avantage; et les murénophis, qui sont les murènes des anciens, le pressent avec une force supérieure. En vain, lorsqu'il se défend contre ces derniers animaux, emploie-t-il la faculté qu'il a reçue de s'attacher fortement avec sa queue qu'il replie; en vain oppose-t-il par là une plus grande résistance à la murénophis qui veut l'entraîner: ses efforts sont bientôt surmontés; et cette partie de son corps, dont il voudroit le plus se servir pour diminuer son infériorité dans une lutte trop inégale, est d'ailleurs dévorée, souvent dès la première approche, par la murénophis. On a pris souvent des congres ainsi mutilés, et portant l'empreinte des dents acérées de leur ennemie. Au reste, on assure que la queue du congre se reproduit quelquefois; ce qui seroit une nouvelle preuve de ce que nous avons dit de la vitalité des poissons, dans notre premier Discours.

Redi a trouvé dans plusieurs parties

de l'intérieur des congres qu'il a disséqués , et , par exemple , sur la tunique externe de l'estomac , le foie , les muscles du ventre , la tunique extérieure des ovaires , et entre les deux tuniques de la vessie urinaire , des hydatides à vessie blanche , de la grosseur d'une plume de coq , et de la longueur de vingt-cinq à trente centimètres *.

Sur plusieurs côtes de l'Océan européen , on prend les congres par le moyen de plusieurs lignes longues chacune de cent trente ou cent quarante mètres , chargées , à une de leurs extrémités , d'un plomb assez pesant pour n'être pas soulevé par l'action de l'eau sur la ligne , et garnies de vingt-cinq ou trente piles ou cordes , au bout de chacune desquelles sont un haim et un appât.

Lorsqu'on veut faire sécher des congres

- * A la membrane des branchies... 10 rayons.
à chacune des nageoires pecto-
rales. 19
aux trois nageoires réunies du dos ,
de la queue et de l'anus , plus
de..... 300

pour les envoyer à des distances assez grandes des rivages sur lesquels on les pêche, on les ouvre par-dessous, depuis la tête jusque vers l'extrémité de la queue; on fait des entailles dans les chairs trop épaisses; on les tient ouverts par le moyen d'un bâton qui va d'une extrémité à l'autre de l'animal; on les suspend à l'air; et lorsqu'ils sont bien secs, on les rassemble ordinairement par paquets dont chacun pèse dix myriagrammes, ou environ.

TRENTE-TROISIÈME GENRE.

LES AMMODYTES.

Une nageoire de l'anús; celle de la queue séparée de la nageoire de l'anús et de celle du dos; la tête comprimée et plus étroite que le corps; la lèvre supérieure double; la mâchoire inférieure étroite et pointue; le corps très-alongé.

ESPÈCE.

CARACTÈRE.

L'AMMODYTE
APPAT.

{ La nageoire de la queue,
fourchue.

L'AMMODYTE APPAT *.

ON n'a encore inscrit que cette espèce dans le genre de l'ammodyte : elle a beaucoup de rapports avec l'anguille , ainsi qu'on a pu en juger par la seule énonciation des caractères distinctifs de son genre ; et comme elle a d'ailleurs l'habitude de s'enfoncer dans le sable des mers , elle a été appelée *anguille de sable* en Suède , en Danemarck , en Angleterre , en Allemagne , en France , et a reçu le nom générique d'*ammodyte* , lequel désigne un animal qui plonge , pour ainsi dire , dans le sable. Sa tête comprimée , plus étroite que le corps , et pointue par-

* *Sül* , en Norvège ; *sandspiring* , en Allemagne ; *sand-eel* , *launce* , en Angleterre ; *grig* , dans son jeune âge , en Angleterre ; *lançon* , sur plusieurs côtes de France ; *tobis* , en Suède et en Danemarck.



1



2



3

1. AMMODYTE Appat 2. OPHIDIE Barbu.

3. MACROGNATHE Aiguillonne.



devant, est l'instrument qu'elle emploie pour creuser la vase molle, et pénétrer dans le sable des rivages jusqu'à la profondeur de deux décimètres ou environ. Elle s'enterre ainsi par une habitude semblable à l'une de celles que nous avons remarquées dans l'anguille, à laquelle nous venons de dire qu'elle ressemble par tant de traits; et deux causes la portent à se cacher dans cet asyle souterrain : non seulement elle cherche dans le sable les dragonneaux et les autres vers dont elle aime à se nourrir, mais encore elle tâche de se dérober dans cette retraite à la dent de plusieurs poissons voraces, et particulièrement des scombres, qui la préfèrent à tout autre proie. De petits cétacées même en font souvent leur aliment de choix; et on a vu des dauphins poursuivre l'ammodyte jusque dans le limon du rivage, retourner le sable avec leur museau, et y fouiller assez avant pour déterrer et saisir le foible poisson. Ce goût très-marqué des scombres et d'autres grands osseux pour cet ammodyte le fait employer comme

appât dans plusieurs pêches ; et voilà d'où vient le nom spécifique que nous lui avons conservé.

C'est vers le printemps que la femelle dépose ses œufs très-près de la côte. Mais nous avons assez parlé des habitudes de cette espèce : voyons rapidement ses principales formes.

Sa mâchoire inférieure est plus avancée que la supérieure ; deux os hérissés de petites dents sont placés auprès du gosier ; la langue est alongée , libre en grande partie , et lisse ; l'orifice de chaque narine est double ; les yeux ne sont pas voilés par une peau demi-transparente , comme ceux de l'anguille. La membrane des branchies est soutenue par sept rayons * ; l'ouverture qu'elle ferme est très-grande ; et les deux branchies antérieures sont garnies , dans leur concavité , d'un seul rang d'apophyses , tandis que

- * A la nageoire du dos..... 60 rayons.
- à chaque nageoire pectorale..... 12
- à la nageoire de l'anüs..... 28
- à celle de la queue..... 16

les deux autres en présentent deux rangées. On voit de chaque côté du corps trois lignes latérales ; mais au moins une de ces trois lignes paroît n'indiquer que la séparation des muscles. Les écailles qui recouvrent l'ammodyte appât, sont très-petites ; la nageoire dorsale est assez haute, et s'étend presque depuis la tête jusqu'à une très-petite distance de l'extrémité de la queue, dont l'ouverture de l'anus est plus près que de la tête.

Le foie ne paroît pas divisé en lobes ; un cœcum ou grand appendice est placé auprès du pylore ; le canal intestinal est grêle, long et contourné, et la surface du péritoine parsemée de points noirs.

On compte ordinairement soixante-trois vertèbres avec lesquelles les côtes sont légèrement articulées ; ce qui donne à l'animal la facilité de se plier en différens sens, et même de se rouler en spirale, comme une couleuvre. Les intervalles des muscles présentent de petites arêtes qui sont un peu appuyées contre l'épine du dos. La chair est peu délicate.

La couleur générale de l'ammodyte

appât est d'un bleu argentin, plus clair sur la partie inférieure du poisson que sur la supérieure. On voit des raies blanches et bleuâtres placées alternativement sur l'abdomen ; et une tache brune se fait remarquer auprès de l'anus.

TRENTE-QUATRIÈME GENRE.

LES OPHIDIES.

La tête couverte de grandes pièces écailleuses; le corps et la queue comprimés en forme de lame, et garnis de petites écailles; la membrane des branchies très-large; les nageoires du dos, de la queue et de l'anus, réunies.

PREMIER SOUS-GENRE.

Des barbillons aux mâchoires.

ESPÈCE.

CARACTÈRES.

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. L'OPHIDIE
BARBU. | { | Quatre barbillons à la mâchoire inférieure; la mâchoire supérieure plus avancée que l'inférieure. |
|------------------------|---|---|

SECOND SOUS-GENRE.

Point de barbillons aux mâchoires.

ESPÈCE.

CARACTÈRES.

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 2. L'OPHIDIE
IMBERBE. | { | La nageoire de la queue un peu arrondie. |
|--------------------------|---|--|

ESPÈCE.

CARACTÈRES.

3. L'OPHIDIE
UNERNAK.

Une ou plusieurs cannelures
longitudinales au-dessus
du museau ; la nageoire de
la queue pointue ; la mâ-
choire inférieure un peu
plus avancée que la supé-
rieure.

L'OPHIDIE BARBU *,

L'OPHIDIE IMBERBE,

E T

L'OPHIDIE UNERNAK.

C'EST au milieu des eaux salées qu'on rencontre les ophidies. Le barbu habite particulièrement dans la mer Rouge et dans la Méditerranée, dont il fréquente même les rivages septentrionaux. Il a beaucoup de ressemblance, ainsi que les autres espèces de son genre, avec les murènes et les ammodytes : mais la réunion des nageoires du dos, de la queue et de l'anus, suffiroit pour qu'on ne confondît pas les ophidies avec les ammodytes ; et les traits génériques que nous venons d'exposer à la tête du tableau

* *Donzelle*, sur les côtes françoises de la Méditerranée.

méthodique du genre que nous décrivons, séparent ce même genre de celui des murènes. Pour achever de donner une idée nette de la conformation du barbu, nous pouvons nous contenter d'ajouter aux caractères génériques, sous-génériques et spécifiques, que nous avons tracés dans cette table méthodique des ophidies, que le barbu a les yeux voilés par une membrane demi-transparente, comme les gymnotes, les murènes, et d'autres poissons; que sa lèvre supérieure est double et épaisse; que l'on voit de petites dents à ses mâchoires, sur son palais, auprès de son gosier; que sa langue est étroite, courte et lisse; que sa membrane branchiale présente sept rayons*; que sa ligne latérale est droite, et que l'anus est plus près de la tête que du bout de la queue.

Quant à ses couleurs, en voici l'ordre et les nuances. Le corps et la queue sont d'un argenté mêlé de teintes couleur de chair,

- * A la nageoire du dos du barbu.. 124 rayons.
- à chacune des pectorales..... 20
- à celle de l'anus..... 115

relevé sur le dos par du bleuâtre, et varié par un grand nombre de petites taches. La ligne latérale est brune; les nageoires pectorales sont également brunes, mais avec un liséré gris; et celles du dos, de l'anüs et de la queue, sont ordinairement blanches et bordées de noir.

Cet ophidion a la chair délicate, aussi bien que l'imberbe. Ce dernier, qui n'a pas de barbillons, ainsi qu'on peut le voir sur le tableau méthodique de son genre, et comme son nom l'indique, est d'une couleur jaune. On le trouve non seulement dans la Méditerranée, où on le pêche particulièrement auprès des côtes méridionales de France, mais encore dans l'Océan d'Europe, et même auprès de rivages très-septentrionaux*.

C'est vers ces mêmes plages boréales, et jusque dans la mer du Groenland, qu'habite l'unernak dont on doit la connaissance au naturaliste Othon Fabricius.

- * A la nageoire du dos de l'imberbe, 79 rayons.
à chacune des pectorales..... 11
à celle de l'anüs..... 41
à celle de la queue..... 18

Sa couleur n'est ni argentée comme celle du barbu , ni jaune comme celle de l'imberbe , mais d'un beau verd que l'on voit régner sur toutes les parties de son corps , excepté sur les nageoires du dos , de l'an us , de la queue , et le dessous du ventre , qui sont blancs. Ses mâchoires sont sans barbillons , comme celles de l'imberbe : sa tête est large ; ses yeux sont gros ; l'ouverture de sa bouche est très-grande *. Il est très-bon à manger comme les autres ophidies : mais comme il passe une grande partie de sa vie dans la haute mer , on le rencontre plus rarement.

Il parvient aux dimensions de plusieurs gades , avec lesquels on l'a souvent comparé , et par conséquent devient plus grand que le barbu , dont la longueur n'est ordinairement que de trois à quatre décimètres.

* A chacune des nageoires pectorales de l'unernak , 10 ou 11 rayons.

TRENTE-CINQUIÈME GENRE.

LES MACROGNATHES.

La mâchoire supérieure très-avancée et en forme de trompe; le corps et la queue comprimés comme une lame; les nageoires du dos et de l'anus distinctes de celle de la queue.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

- | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 1. LE MACROGNA- | { | Quatorze aiguillons au- |
| THE AIGUILONNÉ. | | |
| 2. LE MACROGNA- | { | Trente-trois aiguillons au- |
| THE ARMÉ. | | |
-

LE MACROGNATHE

AIGUILLONNÉ.

CE nom générique de *macrognathe*, qui signifie *longue mâchoire*, désigne le très-grand allongement de la mâchoire supérieure de l'espèce que nous allons décrire, et que nous avons cru devoir séparer des ophidies, non seulement à cause de sa conformation qui est très-différente de celle de ces derniers osseux, mais encore à cause de ses habitudes. En effet, les ophidies se tiennent au milieu des eaux salées, et l'aiguillonné habite dans les eaux douces; il y vit des petits vers et des débris de corps organisés qu'il trouve dans la vase du fond des lacs ou des rivières. Sa mâchoire supérieure lui donne beaucoup de facilité pour fouiller dans la terre humectée, et y chercher sa nourriture : elle est un peu

pointue , et extrêmement prolongée ; aussi a-t-elle été comparée à une sorte de trompe.

Le docteur Bloch , qui a examiné et décrit avec beaucoup de soin un individu de cette espèce , n'a vu de dents ni à cette mâchoire supérieure , ni à l'inférieure , ni au palais , ni au gosier ; ce qui s'accorde avec la nature molle des petits animaux sans défense , ou des parcelles végétales ou animales que recherche l'aiguillonné. L'opercule des branchies n'est composé que d'une lame. Au-devant de la nageoire du dos , on voit une rangée longitudinale de quatorze aiguillons recourbés , et séparés l'un de l'autre ; et deux autres aiguillons semblables sont placés entre la nageoire de l'an us et l'ouverture du même nom , qui est plus loin de la tête que du bout de la queue *.

D'ailleurs les couleurs de l'animal sont

* A la membrane des branchies...	16 rayons.
à la nageoire du dos.....	51
à chacune des nageoires pectorales	16
à celle de l'an us.....	53
a celle de la queue.....	14

agréables ; sa partie supérieure est rougeâtre , et l'inférieure argentée. Les nageoires pectorales sont brunes à leur base , et violettes dans le reste de leur surface. Celle du dos est rougeâtre variée de brun , et remarquable par deux taches rondes , noires , bordées de blanchâtre , et semblables à une prune entourée de son iris. La nageoire de l'anus est rougeâtre avec un liséré noir ; et un bleu nuancé de noir règne sur la nageoire de la queue , qui est un peu arrondie.

La chair de l'aiguillonné est très-bonne à manger. On le pêche dans les grandes Indes. Il parvient ordinairement à la longueur de seize à vingt-un centimètres.

LE MACROGNATHE ARMÉ.

Nous avons trouvé un individu de cette espèce encore inconnue aux naturalistes , dans une collection de poissons desséchés cédée par la Hollande à la France avec un grand nombre d'autres objets précieux d'histoire naturelle. Elle diffère de l'armé par plusieurs traits de sa conformation et par sa grandeur : l'individu que nous avons décrit , étoit long de près de trente-six centimètres , tandis que l'aiguillonné n'en a communément qu'une vingtaine de longueur totale. La mâchoire supérieure est façonnée en trompe : mais elle n'est pas aussi prolongée que dans l'aiguillonné ; elle ne dépasse l'inférieure que de la moitié de sa longueur. Les deux mâchoires sont garnies de plusieurs rangs de très-petites dents , et l'aiguillonné n'en a ni aux mâchoires , ni au gosier , ni au palais. On voit un

piquant auprès de chaque œil de l'armé , et trois piquans à chacun de ses opercules. Au lieu de quatorze rayons recourbés , on en compte trente-trois au-devant de la nageoire du dos , et chacun de ces aiguillons disposés en série longitudinale est renfermé en partie dans une sorte de gaine. Les nageoires du dos et de l'anus ne sont pas séparées par un grand intervalle de celle de la queue , comme dans l'aiguillonné ; mais elles la touchent immédiatement , et n'en sont distinguées que par une petite échancrure dans leur membrane. L'état dans lequel étoit l'individu que nous avons examiné , ne nous a pas permis de compter exactement le nombre des rayons de ses nageoires : mais nous en avons trouvé plus de soixante-dix dans celle du dos , et plus de vingt dans chaque pectorale ; et cependant le docteur Bloch n'en a vu que seize dans chacune des pectorales de l'aiguillonné , et cinquante-un dans la nageoire dorsale de ce dernier macrognathe.

Au reste , l'armé a , comme l'espèce

décrite par le docteur Bloch, deux aiguillons recourbés au-devant de la nageoire de l'anús.

Nous ignorons dans quel pays vit le macrognathe armé.

TRENTE-SIXIÈME GENRE.

LES XIPHIAS.

La mâchoire supérieure prolongée en forme de lame ou d'épée, et d'une longueur au moins égale au tiers de la longueur totale de l'animal.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

1. LE XIPHIAS
ESPADON.

{ La prolongation du museau, plate, sillonnée par-dessus et par-dessous, et tranchante sur ses bords.

2. LE XIPHIAS
ÉPÉE.

{ La prolongation du museau, convexe par-dessus, non sillonnée, et émoussée sur ses bords.





1. *XIPHIAS* Espadon 2. *ANARHIQUE* Loup

3. *STROMATÉE* Paru.

LE XIPHIAS ESPADON *.

Voici un de ces géans de la mer, de ces émules de plusieurs cétacées dont ils ont reçu le nom, de ces dominateurs de l'Océan qui réunissent une grande force à des dimensions très-étendues. Au premier aspect, le xiphias espadon nous rappelle les grands acipensères, ou plutôt les énormes squales et même le terrible requin. Il est l'analogue de ces derniers ; il tient parmi les osseux une place semblable à celle que les squales occupent parmi les cartilagineux ; il a reçu comme eux une grande taille, des muscles vigoureux, un corps agile, une arme redoutable, un courage intrépide, tous les attributs de la puissance ; et cependant tels sont les résultats de la différence de ses armes à celles du requin

* *Sword fisk*, en Suède ; *sword fish*, en Angleterre ; *pesce spada*, *emperador*, en Italie.

et des autres squales , qu'abusant bien moins de son pouvoir , il ne porte pas sans cesse autour de lui , comme ces derniers , le carnage et la dévastation.

Lorsqu'il mesure ses forces contre les grands habitans des eaux , ce sont plutôt des ennemis dangereux pour lui qu'il repousse , que des victimes qu'il poursuit. Il se contente souvent , pour sa nourriture , d'algues et d'autres plantes marines ; et bien loin d'attaquer et de chercher à dévorer les animaux de son espèce , il se plaît avec eux ; il aime sur-tout à suivre sa femelle , lors même qu'il n'obéit pas à ce besoin passager , mais impérieux , que ne peut vaincre la plus horrible férocité. Il paroît donc avoir et des habitudes douces et des affections vives. On peut lui supposer une assez grande sensibilité ; et si l'on doit comparer le requin au tigre , le xiphias peut être considéré comme l'analogue du lion.

Mais les effets de son organisation ne sont pas seuls remarquables : sa forme est aussi très-digne d'attention. Sa tête sur-tout frappe par sa conformation sin-

gulière. Les deux os de la mâchoire supérieure se prolongent en avant, se réunissent, et s'étendent de manière que leur longueur égale à peu près le tiers de la longueur totale de l'animal. Dans cette prolongation, leur matière s'organise de manière à présenter un grand nombre de petits cylindres, ou plutôt de petits tubes longitudinaux; ils forment une lame étroite et plate, qui s'amincit et se rétrécit de plus en plus jusqu'à son extrémité, et dont les bords sont tranchans comme ceux d'un espadon ou d'un sabre antique. Trois sillons longitudinaux règnent sur la surface supérieure de cette longue lame, au bout de laquelle parvient celui du milieu; et l'on apperçoit un sillon semblable sur la face inférieure de cette même prolongation. Une extension de l'os frontal triangulaire, pointue et très-alongée, concourt à la formation de la face supérieure de la lame, en s'étendant entre les deux os maxillaires, au moins jusque vers le tiers de la longueur de cette arme; et sur la face inférieure de cette lame osseuse, on voit

une extension analogue et également triangulaire des os palatins s'avancer entre les deux os maxillaires , mais moins loin que l'extension pointue de l'os frontal. Ce sabre à deux tranchans est d'ailleurs revêtu d'une peau légèrement chagrinée.

La mâchoire inférieure est pointue par-devant ; et sa longueur égalant le tiers de la longueur de la lame tubulée , c'est-à-dire , le neuvième de la longueur totale de l'animal , il n'est pas surprenant que l'ouverture de la bouche soit grande ; ses deux bords sont garnis d'un nombre considérable de petits tubercules très-durs, ou plutôt de petites dents tournées vers le gosier , auprès duquel sont quelques os hérissés de pointes. La langue est forte et libre dans ses mouvemens. Les yeux sont saillans , et l'iris est verdâtre.

L'espadon a d'ailleurs le corps et la queue très-alongés. L'orifice des branchies est grand , et son opercule composé de deux pièces ; sept ou huit rayons soutiennent la membrane branchiale. Les nageoires sont en forme de faux , excepté celle de la queue , qui est en

croissant *. Une membrane adipeuse placée au-dessous d'une peau mince , couvre tout le poisson.

La ligne latérale est pointillée de noir : cette même couleur règne sur le dos de l'animal , dont la partie inférieure est blanche. Les nageoires pectorales sont jaunâtres ; celle du dos est brune ; et toutes les autres présentent un gris cendré.

L'espadon habite dans un grand nombre de mers. On le trouve dans l'Océan d'Europe , dans la Méditerranée , et jusque dans les mers australes. On le rencontre aussi entre l'Afrique et l'Amérique : mais, dans ces derniers parages , sa nageoire du dos paroît être constamment plus grande et tachetée ; et c'est aux espadons , qui , par les dimensions et les couleurs de leur nageoire dorsale , composent une variété plus ou moins durable , que l'on doit , ce me semble , rapporter le nom brésilien de *guebucu*.

- * A la nageoire du dos..... 42 rayons.
- à chacune des pectorales..... 17
- à celle de l'anüs..... 18.
- à celle de la queue..... 26

Les xiphias espadons ont des muscles très-puissans : leur intérieur renferme de plus une grande vessie natatoire ; ils nagent avec vitesse ; ils peuvent atteindre avec facilité de très-grands habitans de la mer. Parvenus quelquefois à la longueur de plus de sept mètres , frappant leurs ennemis avec un glaive pointu et tranchant de plus de deux mètres , ils mettent en fuite , ou combattent avec avantage , les jeunes et les petits cétacées , dont les tégumens sont aisément traversés par leur arme osseuse , qu'ils poussent avec violence , qu'ils précipitent avec rapidité , et dont ils accroissent la puissance de toute celle de leur masse et de leur vitesse. On a écrit que dans les mers dont les côtes sont peuplées d'énormes crocodiles , ils savoient se placer avec agilité au-dessous de ces animaux cuirassés , et leur percer le ventre avec adresse à l'endroit où les écailles sont le moins épaisses et le moins fortement attachées. On pourroit même , à la rigueur , croire , avec Pline , que lorsque leur ardeur est exaltée , que leur instinct est troublé , ou qu'ils sont le jouet

de vagues furieuses qui les roulent et les lancent, ils se jettent avec tant de force contre les bords des embarcations, que leur arme se brise, et que la pointe de leur glaive pénètre dans l'épaisseur du bord, et y demeure attachée, comme on y a vu quelquefois également implantés des fragmens de l'arme dentelée du squalo scie, ou de la dure défense du narval.

Malgré cette vîtesse, cette vigueur, cette adresse, cette agilité, ces armes, ce pouvoir, l'espadon se contente souvent, ainsi que nous venons de le dire, d'une nourriture purement végétale. Il n'a pas de grandes dents incisives ni lanières; et les rapports de l'abondance et de la nature de ses sucs digestifs avec la longueur et la forme de son canal intestinal, sont tels, qu'il préfère fréquemment aux poissons qu'il pourroit saisir, des algues et d'autres plantes marines : aussi sa chair est-elle assez communément bonne à manger, et même très-agréable au goût; aussi, lorsque la présence d'un ennemi dangereux ne le contraint pas à faire usage de sa puissance, a-t-il des habi-

tudes assez douces. On ne le rencontre presque jamais seul : lorsqu'il voyage, c'est quelquefois avec un compagnon, et presque toujours avec une compagne ; et cette association par paires prouve d'autant plus que les espadons sont susceptibles d'affection les uns pour les autres, qu'on ne doit pas supposer qu'ils sont réunis pour atteindre la même proie ou éviter le même ennemi, ainsi qu'on peut le croire de l'assemblage désordonné d'un très-grand nombre d'animaux. Un sentiment différent de la faim ou de la crainte peut seul, en produisant une sorte de choix, faire naître et conserver cet arrangement deux à deux ; et de plus leur sensibilité doit être considérée comme assez vive, puisque la femelle ne donne pas le jour à des petits tout formés, que par conséquent il n'y a pas d'accouplement dans cette espèce, que cette même femelle ne va déposer ses œufs vers les rivages de l'Océan que lors de la fin du printemps ou au commencement de l'été, et que cependant le mâle suit fidèlement sa compagne dans toutes les saisons de l'année.

La saveur agréable et la qualité très-nourrissante de la chair de l'espadon font que dans plusieurs contrées on le pêche avec soin. Souvent la recherche qu'on fait de cet animal est d'autant plus infructueuse, qu'avec son long sabre il déchire et met en mille pièces les filets par le moyen desquels on a voulu le saisir. Mais d'autres fois, et dans certains temps de l'année, des insectes aquatiques s'attachent à sa peau au-dessous de ses nageoires pectorales, ou dans d'autres endroits d'où il ne peut les faire tomber, malgré tous ses efforts; et quoiqu'il se frotte contre les algues, le sable ou les rochers, ils se cramponnent avec obstination, et le font souffrir si vivement, qu'agité, furieux, en délire comme le lion et les autres grands animaux terrestres sur lesquels se précipite la mouche du désert, il va au-devant du plus grand des dangers, se jette au milieu des filets, s'élance sur le rivage, ou s'élève au-dessus de la surface de l'eau, et retombe jusque dans les barques des pêcheurs.

L E X I P H I A S É P É E.

LA description de cette espèce n'a encore été publiée par aucun naturaliste. Nous n'avons vu de ce poisson que la partie antérieure de la tête : mais comme c'est dans cette portion du corps que sont placés les caractères distinctifs des xiphias ; nous avons pu rapporter l'épée à ce genre ; et comme d'ailleurs cette même partie antérieure ne nous a pas seulement présenté les formes particulières à la famille dont nous nous occupons, mais nous a montré de plus des traits remarquables et très-différens de ceux de l'espadon, nous avons dû séparer de cette dernière espèce l'animal auquel avoit appartenu cette portion, et nous avons donné le nom d'épée à ce xiphias encore inconnu.

Voici les grandes différences qui distinguent l'épée de l'espadon, et qui suffiroient seules pour empêcher de les réu-

nir , quand bien même le corps et la queue de l'épée seroient entièrement semblables à la queue et au corps de l'espadaon.

Dans ce dernier animal , la prolongation est plate : elle est convexe dans l'épée.

L'arme de l'espadaon est aiguë sur ses bords comme un sabre à deux tranchans : celle de l'épée est très-arrondie le long de ses côtés , et par conséquent n'est point propre à tailler ou couper.

La lame de l'espadaon est très-mince : la défense de l'épée est presque aussi épaisse , ou , ce qui est ici la même chose , presque aussi haute que large.

On voit trois sillons longitudinaux sur la face supérieure du sabre de l'espadaon , et un sillon également longitudinal sur la face inférieure de ce même sabre : on n'apperçoit de sillon sur aucune des surfaces de la prolongation osseuse de l'épée.

Une extension de l'os frontal , pointue et triangulaire , s'avance au milieu des os maxillaires supérieurs de l'espadaon ,

jusqu'au-delà de sa mâchoire inférieure : une extension analogue n'est presque pas sensible dans l'épée.

Une seconde extension pointue et triangulaire , appartenant aux os intermaxillaires , se prolonge dans l'espadon sur la face inférieure de l'arme , mais ne va pas jusqu'au-dessus du bout de la mâchoire inférieure : dans l'épée , elle dépasse de beaucoup cette dernière extrémité.

La peau qui couvre la lame de l'espadon , est légèrement chagrinée : celle qui revêt la défense de l'épée , présente des grains bien plus gros ; et sous les os maxillaires , à l'endroit qui répond à la mâchoire inférieure , les tubercules de cette peau se changent , pour ainsi dire , en petites dents recourbées vers le gosier.

Voilà donc sept différences qui ne permettent pas de rapporter à la même espèce l'espadon et l'épée. Il peut d'ailleurs résulter de cette diversité dans la forme des armes , une variété assez grande dans les habitudes , une espèce ayant reçu un glaive qui tranche et coupe , et l'autre espèce une épée qui perce et déchire.

Au reste, la portion de la tête d'un xiphias épée qui nous a montré la conformation que nous venons d'exposer, fait partie de la collection du Muséum national d'histoire naturelle.

TRENTE-SEPTIÈME GENRE.

LES ANARHIQUES.

Le museau arrondi; plus de cinq dents coniques à chaque mâchoire; des dents molaires en haut et en bas; une longue nageoire dorsale.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. L'ANARHIQUE
LOUP. | { | Quatre os maxillaires à chaque mâchoire; les dents osseuses et très-dures. |
| 2. L'ANARHIQUE
KARRAK. | { | Huit dents cartilagineuses et très-aiguës à la partie antérieure de chaque mâchoire. |
| 3. L'ANARHIQUE
PANTHÉRIN. | { | Les lèvres doubles; la nageoire de la queue un peu lancéolée; des taches rondes et brunes sur le corps et la queue. |
-

L'ANARHIQUE LOUP *.

CE poisson peut figurer avec avantage à côté du xiphias , et par sa force , et par sa grandeur. Il parvient quelquefois , au moins dans les mers très-profondes , jusqu'à la longueur de cinq mètres ; et s'il n'est point armé d'un glaive comme l'espadon et l'épée , s'il ne paroît pas se mouvoir au milieu des ondes avec autant d'agilité que ces derniers animaux , il a reçu des dents redoutables , et par leur nombre , et par leur forme , et par leur dureté ; il présente même des moyens plus puissans de destruction que le xiphias , et il nage avec assez de vitesse pour atteindre facilement sa proie. Son organisation intérieure lui donne d'ailleurs une très-grande voracité. Féroce comme les squales , ter-

* *Sea-wolf*, en Angleterre.

rible pour la plupart des habitans des mers, vrai loup de l'Océan, il porte le ravage parmi le plus grand nombre de poissons, comme la bête sauvage dont il a reçu le nom, parmi les troupeaux sans défense; et bien loin d'offrir ces marques d'une affection douce, cette durée dans l'attachement, ces traits d'une sorte de sociabilité que nous avons vus dans le xiphias, il montre, par l'usage constant qu'il fait de ses armes, tous les signes de la cruauté, et justifie le nom de *ravis seur* qui lui a été donné dans presque toutes les contrées et par divers observateurs. Son corps et sa queue sont alongés et comprimés: aussi nage-t-il en serpentant comme les trichiures, ou plutôt comme les murènes et le plus grand nombre de poissons de l'ordre que nous examinons; et c'est vraisemblablement parce que les diverses ondulations de son corps et de sa queue lui permettent quelquefois, et pendant quelques momens, de ramper comme l'anguille, et de s'avancer le long des rivages, qu'il a été appelé *grimpeur* par quelques naturalistes. Sa peau est forte,

épaisse , gluante , ainsi que celle de l'anguille ; ce qui lui donne la facilité de s'échapper comme cette murène , lorsqu'on veut le saisir ; et les petites écailles dont ce tégument est revêtu , sont attachées à cette peau visqueuse , ou cachées sous l'épiderme , de manière qu'on ne peut pas aisément les distinguer.

La tête de l'anarhique que nous décrivons , est grosse , le museau arrondi , le front un peu élevé , l'ouverture de la bouche très-grande ; les lèvres sont membraneuses , mais fortes , et les mâchoires d'autant plus puissantes , que chacune de ces deux parties de la tête est composée , de chaque côté , de deux os bien distincts , grands , durs , solides , réunis par des cartilages , et s'arc - boutant mutuellement. C'est au - devant de ces doubles mâchoires qu'on voit , tant en haut qu'en bas , au moins six dents coniques propres à couper ou plutôt à déchirer , divergentes , et cependant ressemblant un peu , par leur forme , leur volume et leur position , à celles du loup et de plusieurs autres quadrupèdes carnassiers. On voit

d'ailleurs cinq rangs de dents molaires supérieures, plus ou moins irrégulières, plus ou moins convexes, et trois rangs de molaires inférieures semblables. La langue est courte, lisse, et un peu arrondie à son extrémité. Les yeux sont ovales.

Il résulte donc de l'ensemble de toutes ces formes que présente la tête de l'anarhique loup, que lorsque la gueule est ouverte, cette même tête a beaucoup de rapports avec celle de quelques quadrupèdes, et particulièrement de plusieurs phoques; et voilà donc cet anarhique rapproché des mammifères carnassiers, non seulement par ses habitudes, mais encore par la nature de ses armes et par ses organes extérieurs les plus remarquables.

Au reste, comment le loup ne seroit-il pas compris parmi les dévastateurs de l'Océan? Il montre ces dents terribles avec lesquelles une proie est si facilement saisie, retenue, déchirée ou écrasée: et de plus, ses intestins étant très-courts, ne doit-il pas avoir des sucs digestifs d'une

grande activité, et qui, par l'action qu'ils exercent sur ce canal intestinal, ainsi que sur son estomac, dans les momens où ils ne contiennent pas une nourriture copieuse, lui font éprouver vivement le tourment de la faim, et le forcent à poursuivre avec ardeur, et souvent à immoler avec une sorte de rage, de nombreuses victimes ? Quelques dents de moins, ou plutôt quelques décimètres de plus dans la longueur du canal intestinal, auroient rendu ses habitudes assez douces.

Mais les animaux n'ont pas, comme l'homme, cette raison céleste, cette intelligence supérieure qui rappelle, embrasse ou prévoit tous les instans et tous les lieux, qui combat avec succès la puissance de la Nature par la force du génie, et, compensant le moral par le physique, et le physique par le moral, accroît ou diminue à son gré l'influence de l'habitude, et donne à la volonté l'indépendance et l'empire.

L'anarchique loup, condamné donc, par sa conformation et par la qualité de

ses habitudes , à rechercher presque sans cesse un nouvel aliment , est non seulement féroce , mais très - vorace : il se jette goulument sur ce qui peut appaiser ses appétits violens. Il dévore non seulement des poissons , mais des crabes et des coquillages ; il les avale même avec tant de précipitation , que souvent de gros fragmens de dépouilles d'animaux testacées , et des coquilles entières , parviennent jusque dans son estomac , quoiqu'il eût pu les concasser et les broyer avec ses nombreuses molaires. Ces coquilles entières et ces fragmens ne sont cependant pas digérés ou dissous par ses sucs digestifs , quelque'actives que soient ces humeurs , pendant le peu de séjour qu'ils font dans un canal intestinal très-court , et dont le loup est pressé de les chasser , pour les remplacer par des substances nouvelles , propres à appaiser sa faim sans cesse renaissante. D'ailleurs l'estomac de cet anarhique n'a pas la force nécessaire pour les réduire , par la trituration , en très - petites parties : mais ce poisson s'en débarrasse presque

toujours avec beaucoup de facilité , parce que l'ouverture de son anus est très-considérable et susceptible d'une assez grande extension.

C'est dans l'Océan septentrional que se trouve le loup. On ne le voit ordinairement en Europe qu'à des latitudes un peu élevées ; on l'a reconnu à Botany-bay sur la côte orientale de la nouvelle Hollande : mais il se tient communément, pendant une grande partie de l'année, à des distances considérables de toute terre et dans les profondeurs des mers ; il ne se montre pas pendant l'hiver près des rivages septentrionaux de l'Europe et de l'Amérique , et c'est à la fin du printemps que sa femelle dépose ordinairement ses œufs sur les plantes marines qui croissent auprès des côtes.

Il s'élance avec impétuosité ; et malgré cette rapidité au moins momentanée , plusieurs naturalistes ont écrit que sa natation paroît lente quand on la compare à celle des xiphias : sa force est néanmoins très-grande , et ses dimensions sont favorables à des mouvemens rapides.

Ne pourroit-on pas dire que les muscles de sa tête, qui serre, déchire ou écrase avec tant de facilité, sont beaucoup plus énergiques que ceux de sa queue, tandis que, dans les xiphias, les muscles de la queue sont plus puissans que ceux de la tête, armée sans doute d'un glaive redoutable, mais dénuée de dents, et qui ne concasse ni ne brise ? Nous devons d'autant plus le présumer, que la natation, dont les vrais principes accélérateurs sont dans la queue, n'est ordinairement soumise à aucune cause retardatrice très-marquée, qui ne réside dans une partie antérieure de l'animal trop pesante ou trop étendue en avant. N'avons-nous pas vu que la prolongation de la tête des xiphias égale en longueur le tiers de l'ensemble du poisson ? et de quel pouvoir ne doivent pas être doués les muscles caudaux de ces animaux, pour leur imprimer, malgré la résistance de leur partie antérieure, la vîtesse dont on les voit jouir ?

Ne pourroit-on pas d'ailleurs ajouter que quand bien même la nature, la forme, le

volume et la position des muscles caudaux leur donneroient à proportion la même force dans le loup et dans les xiphias , cet anarhique devroit s'avancer , tout égal d'ailleurs , avec moins de rapidité que ces derniers , parce que sa tête assez grosse , arrondie et relevée , doit fendre l'eau de la mer avec moins de facilité que le glaive mince et étroit des xiphias ?

Quoi qu'il en soit de la force de la queue du loup , celle de sa tête est si considérable , et ses dents sont si puissantes , qu'on ne le pêche dans beaucoup d'endroits qu'avec des précautions particulières. Dans la mer d'Okotsk , auprès du Kamtschatka , vers le cinquante-troisième degré de latitude , on cherche à prendre le loup avec des *seines* ou filets faits de lanières de cuir , et par conséquent plus propres à résister à ses efforts. Dans ce même Kamtschatka , le célèbre voyageur Steller a vu un individu de cette espèce que l'on venoit de pêcher , irrité de ses blessures et de sa captivité , saisir avec fureur et briser comme un verre une sorte de coutelas avec lequel

on vouloit achever de le tuer , et mordre avec rage des bâtons et des morceaux de bois dont on se servoit pour le frapper.

Au reste , on va avec d'autant plus de constance à la poursuite du loup , qu'il peut fournir une grande quantité d'aliment , et que sa chair , suivant Ascagne , est , dans certaines circonstances , aussi bonne que celle de l'anguille. Les habitans du Groenland le pêchent aussi pour sa peau , qui leur sert à faire des bourses et quelques autres ustensiles.

Le loup a été nommé *crapaudine* , parce qu'on a regardé comme provenant de cet animal , de petits corps fossiles , connus depuis long-temps sous le nom de *bufonites* ou de *crapaudines*. Ces bufonites ont reçu la dénomination qu'on leur a donnée dès les premiers momens où l'on s'en est occupé , à cause de l'origine qu'on leur a dès-lors attribuée. On a supposé que ces petits corps étoient des pierres sorties de la tête d'un crapaud , en latin *bufo*. Ils sont d'une forme plus ou moins convexe d'un côté , plane ou concave de l'autre , d'une figure quel-

quefois régulière et quelquefois irrégulière, et communément gris, ou bruns, ou roux, ou d'un rouge noirâtre. Par une suite de la fausse opinion qu'on avoit adoptée sur leur nature, on les a considérés pendant quelque temps comme des pierres fines du second ordre; mais lorsque l'histoire naturelle a eu fait de plus grands progrès, on s'est bientôt aperçu que ces prétendues pierres fines n'étoient que des dents de poisson pétrifiées, et presque toujours des molaires. Les uns les ont regardées comme des dents d'anarhique, d'autres comme des dents du spare dorade, d'autres comme des dents de poissons osseux différens de la dorade et de l'anarhique. Ils ont tous eu raison, en ce sens qu'on doit rapporter ces fossiles à plusieurs espèces de poissons, très-peu semblables l'une à l'autre; et telle a été l'opinion de Wallérius. La plus grande partie de ces dents nous ont paru néanmoins avoir appartenu à des dorades ou à des anarhiques. Au reste, il est très-aisé de séparer parmi ces fossiles les dents molaires du loup d'avec

celles du spare dorade : les dernières ont une régularité et une convexité que l'on ne voit pas dans les premières. Mais pour être de quelque utilité aux géologues , et leur donner des bases certaines d'après lesquelles ils puissent lire sur les corps pétrifiés et fossiles quelques points de l'histoire des anciennes révolutions du globe , nous tâcherons de montrer , dans notre Discours sur les parties solides des poissons , les véritables caractères des dents d'un assez grand nombre d'espèces de ces animaux.

Le loup * est d'un noir cendré par-dessus , et d'un blanc plus ou moins pur

* A la membrane des branchies du loup.....	6 rayons.
à la nageoire dorsale.....	74
à chacune des nageoires pectorales.....	20
à celle de l'anús.....	46
à celle de la queue.....	16
On a compté à chacune des pectorales de l'anarhique strié..	18 rayons.
et à celle de la queue du même animal.....	13

par-dessous ; ce qui lui donne un nouveau rapport extérieur avec plusieurs cétacées. Mais peut-être ne doit-on regarder que comme une variété de cette espèce , l'anarhique que l'on a désigné par le nom de *strié* , qui présente en effet des stries irrégulières , presque transversales , et brunes , et qui a été pêché auprès des rivages de la Grande - Bretagne.

L'ANARHIQUE KARRAK,

E T

L'ANARHIQUE PANTHÉRIN *.

CES deux espèces habitent dans l'Océan septentrional ; la première dans la mer du Groenland , et la seconde dans la mer Glaciale. Elles ont d'ailleurs beaucoup de rapports l'une avec l'autre.

Le karrak a les yeux très-gros et rapprochés du sommet de la tête , qui a , dit-on , quelque ressemblance vague avec celle d'un chien. L'ouverture de sa bouche est grande ; les deux mâchoires présentent de chaque côté trois dents aiguës et inégales ; et dans l'intervalle qui sépare par-devant ces deux triolets , on compte deux autres dents plus petites.

* *Kusatschka* , en Russie.

La nageoire dorsale s'étend depuis le cou jusqu'à une très-petite distance de la nageoire de la queue *.

Le karrak est ordinairement d'un gris noirâtre , et ne parvient pas à des dimensions aussi considérables que le loup.

Peut-être le panthérin est-il communément encore moins grand que le karrak ; peut-être a-t-on eu raison d'écrire que sa longueur ordinaire n'est que d'environ un mètre. On lui a donné le nom que j'ai cru devoir lui conserver , parce que sur un fond plus ou moins jaunâtre , et par conséquent d'une teinte assez semblable à la couleur de la panthère , il présente , sur presque toute sa surface, des taches rondes et brunes.

Sa tête est un peu sphérique ; ses lèvres sont doubles. Au travers de la large ouverture de sa gueule , on apperçoit aisément , de chaque côté de la mâchoire supérieure , deux rangs de dents coniques

- * A la nageoire dorsale du karrak.. 70 rayons.
à chacune des pectorales..... 20
à celle de l'anüs..... 44
à celle de la queue..... 21

et plus ou moins recourbées , et deux rangées de dents molaires. Entre les quatre rangs de dents coniques , on voit quatre autres dents placées longitudinalement ; et entre les quatre rangées de dents molaires , paroît sur le palais une série longitudinale de sept dents très-fortes , et dont les deux premières sont ordinairement séparées des autres. La mâchoire inférieure est armée , de chaque côté , de deux rangs de dents molaires , et de deux ou trois rangées de dents coniques*.

Les yeux sont grands et assez éloignés l'un de l'autre. La nageoire du dos , qui ne commence qu'à une certaine distance de la nuque , touche celle de la queue ; et ces deux derniers caractères suffiroient pour séparer le panthérin du karrak , dont la nageoire caudale est un peu éloignée de celle du dos , et dont les yeux

* A la membrane branchiale du

panthérin.....	7 rayons.
à la nageoire dorsale.....	67
à chacune des pectorales.....	20
à celle de l'anus.....	44
à celle de la queue.....	20

sont rapprochés sur le sommet de la tête. Deux lames composent chaque opercule branchial ; on ne voit pas de ligne latérale. Les nageoires pectorales sont arrondies comme celles du loup ; la nageoire de la queue est un peu lancéolée.

Au reste , suivant l'auteur russe Zoview, qui a fait connoître le panthérin , on ne mange guère en Russie de cet anarhique , quoiqu'on y vante la bonté de sa chair.

TRENTE-HUITIÈME GENRE.

LES COMÉPHORES.

Le corps alongé et comprimé; la tête et l'ouverture de la bouche très-grandes; le museau large et déprimé; les dents très-petites; deux nageoires dorsales; plusieurs rayons de la seconde, garnis de longs filamens.

ESPÈCE.

CARACTÈRE.

LE COMÉPHORE	{	Les nageoires pectorales, de la longueur de la moitié du corps.
BAÏKAL.		

LE COMÉPHORE BAÏKAL.

CE poisson a déjà été décrit sous le nom de *callionyme* ; mais il manque de nageoires inférieures placées au-devant de l'anús. Dès-lors il ne peut être inscrit ni dans le genre ni même dans l'ordre des vrais callionymes , qui sont des jugulaires ; il doit être compris parmi les apodes ; et les caractères remarquables qui le distinguent, exigent qu'on le place, parmi ces derniers, dans un genre particulier.

Le célèbre professeur Pallas l'a fait connoître. Il l'a découvert dans le Baïkal , ce lac fameux de l'Asie russe , et si voisin du territoire chinois. Le coméphore que nous décrivons , se tient pendant l'hiver dans les endroits de ce lac où les eaux sont le plus profondes ; et ce n'est que pendant l'été qu'il s'approche des rivages en troupes nombreuses. Comme

plusieurs autres apodes de la première division des osseux, il a le corps alongé, comprimé, et enduit d'une matière huileuse très-abondante. La tête est grande, aplatie par-dessus et par les côtés, garnie de deux tubercules auprès des tempes; le museau large; la bouche très-ouverte; la mâchoire inférieure plus avancée que la supérieure, et hérissée comme cette dernière, excepté à son sommet, de dents très-petites, crochues et aiguës; la membrane branchiale très-lâche, et soutenue par des rayons très-éloignés l'un de l'autre; et la ligne latérale assez rapprochée du dos.

La première nageoire dorsale est peu étendue: mais quinze rayons au moins de la seconde sont terminés par de longs filamens semblables à des cheveux; et cette conformation nous a suggéré le nom générique de *porte-cheveux* (coméphore), que nous avons donné au baïkal. Les nageoires pectorales sont si prolongées, qu'elles égalent en longueur la moitié de l'animal; pour peu qu'elles eussent plus de surface, qu'elles fussent

plus facilement extensibles , et que le baïkal pût les agiter avec plus de vîtesse , ce poisson pourroit non seulement nager avec rapidité , mais s'élever et parcourir un arc de cercle considérable au - dessus de la surface des eaux comme quelques pégases , les trigles , les exocets , etc. ¹.

La nageoire de la queue est fourchue ².

¹ Discours sur la nature des poissons.

² A la membrane des branchies..	6 rayons.
à la première nageoire du dos..	8
à la seconde.....	28
à chacune des nageoires pectorales	13
à celle de l'anüs.....	32
à celle de la queue.....	13

TRENTE-NEUVIÈME GENRE.

LES STROMATÉES.

Le corps très-comprimé et ovale.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

1. LE STROMATÉE
FIATOLE.

Des dents au palais; deux
lignes latérales de chaque
côté; plusieurs bandes
transversales.

2. LE STROMATÉE
PARU.

Point de dents au palais; une
seule ligne latérale de cha-
que côté; point de bandes
transversales.

LE STROMATÉE FIATOLE *.

Tous les apodes de la première division des osseux que nous avons déjà examinés, ont le corps plus ou moins alongé, cylindrique et serpentiforme. Dans les stromatées, les proportions générales sont bien différentes : l'animal est très-comprimé par les côtés, et les deux surfaces latérales que produit cette compression, sont assez hautes, relativement à leur longueur, pour représenter un ovale plus ou moins régulier. Cette conformation unique parmi les apodes que nous décrivons, suffit pour empêcher de confondre les stromatées avec les autres genres de son ordre.

Parmi ces stromatées, l'espèce la plus anciennement connue est celle que l'on nomme *fiatole*, et que l'on trouve dans la mer Méditerranée ainsi que dans la

* *Lisette*, sur quelques rivages de la mer Adriatique ; *lampuga*, dans quelques contrées de l'Italie.

mer Rouge. Ses couleurs sont agréables et brillantes ; et leur éclat frappe d'autant plus les yeux , qu'elles sont répandues sur les larges surfaces latérales dont nous venons de parler. Ordinairement ce beau poisson est bleu dans sa partie supérieure , et blanc dans sa partie inférieure , avec du rouge autour des lèvres ; et ces trois couleurs , que leurs nuances et leurs reflets marient et fondent les unes dans les autres , plaisent d'autant plus sur la fiatole , qu'elles sont relevées par des raies transversales étroites , mais nombreuses , et communément dorées , qui s'étendent en zigzag sur chacun des côtés de l'animal.

La bouche est petite ; les mâchoires et le palais sont garnis de dents ; la langue est large et lisse ; chaque côté du corps présente deux lignes latérales , l'une courbe , et l'autre presque droite ; la nageoire de la queue est très-fourchue* ; et si on cherche , par le moyen

- * A la nageoire dorsale..... 46 rayons.
- à chacune des nageoires pectorales 25
- à celle de l'anus..... 34

de la dissection , à connoître les formes intérieures de la fiatole , on trouve un estomac rendu en quelque sorte double par un étranglement , et un très-grand nombre d'appendices ou de petits tubes intestinaux ouverts seulement par un bout et placés auprès du pylore.

LE STROMATÉE PARU.

CETTE espèce n'est pas peinte de couleurs aussi variées que la fiatole , mais elle resplendit de l'éclat de l'or et de l'argent ; l'or brille sur sa partie supérieure , et le dessous de ce poisson réfléchit une teinte argentée très-vive. Elle habite dans l'Amérique méridionale et dans les grandes Indes , particulièrement auprès de Tranquebar ; et sa chair est blanche , tendre et exquise.

Sa langue est large , lisse , et assez libre dans ses mouvemens ; ses mâchoires sont hérissées de dents petites et aiguës : mais on n'en voit pas sur le palais , comme dans la fiatole , et quelques osselets arrondis paroissent aux environs du gosier.

L'ouverture des branchies est très-grande ; l'opercule composé d'une seule lame bordée d'une membrane. Une seule ligne latérale assez large et argentée

règne de chaque côté de l'animal. Les écailles du paru sont petites , minces , et tombent facilement. Cet osseux ne présente jamais que de petites dimensions , non plus que la fiatole : aussi ne se nourrit-il que de vers marins , et de poissons très-jeunes et très-foibles*.

On trouve dans les eaux du Chili un stromatée décrit par Molina , dont le dos , au lieu d'être doré , est d'un bleu céleste , et qui ne parvient guère qu'à la longueur de deux ou trois décimètres. Nous pensons , avec le professeur Gmelin , que ce stromatée , qui ne paroît différer du paru que par la couleur du dos , n'est peut-être qu'une variété de cette dernière espèce.

* A la membrane des branchies.....	2 rayons.
à la nageoire du dos.....	50
à chacune des pectorales.....	24
à celle de l'anus.....	42
à celle de la queue , qui est très- fourchue.....	18

QUARANTIÈME GENRE.

LES RHOMBES.

Le corps très-comprimé et assez court; chaque côté de l'animal représentant une sorte de rhombe; des aiguillons ou rayons non articulés aux nageoires du dos ou de l'anus.

ESPÈCE.

CARACTÈRES.

LE RHOMBE
ALÉPIDOTE.

{ Le corps dénué d'écailles facilement visibles; les nageoires du dos et de l'anus, en forme de faux.

LE RHOMBE ALÉPIDOTE.

CE poisson, que le docteur Garden avoit envoyé de la Caroline à Linné, et que l'illustre naturaliste de Suède a fait connoître aux amis des sciences, a été inscrit jusqu'à présent dans le genre des chétodons : mais indépendamment de plusieurs autres traits qui le séparent de ces derniers osseux, l'absence de nageoires inférieures placées au-devant de l'anüs, non seulement l'écarte du genre des chétodons, mais oblige à ne pas le placer dans le même ordre que ces thoracins, et à le comprendre dans celui des apodes dont nous nous occupons. Nous l'y avons mis à la suite des stromatées, avec lesquels la très-grande compression, la hauteur et la brièveté de l'ensemble formé par son corps et par sa queue, lui donnent beaucoup de rapports. Il en diffère cependant par plusieurs caractères, et notamment

par la figure rhomboïdale des faces latérales , qui sont ovales dans les stromatées , et par la nature de plusieurs rayons de la nageoire du dos ou de celle de l'anús , dans lesquels on ne remarque aucune articulation , et qui sont de véritables aiguillons.

La peau de l'alépidote ne présente d'ailleurs aucune écaille facilement visible ; et cette sorte de nudité qui lui a fait attribuer le nom de *nud* , ainsi que celui que j'ai cru devoir lui conserver , empêcheroit seule de le confondre avec les stromatées , et lui donne une nouvelle ressemblance avec les cécilies , les gymnotes , les murènes , et plusieurs autres apodes de la première division des osseux.

Ses mâchoires ne présentent qu'un seul rang de dents ; on voit sur chaque côté de l'animal deux lignes latérales , dont la supérieure suit le contour du dos , et dont l'inférieure est droite , et paroît indiquer les intervalles des muscles. Les nageoires du dos et de l'anús sont placées au-dessus l'une de l'autre , et offrent la

forme d'une faux ; celle de la queue est fourchue*.

Le rhombe alépidote est bleuâtre dans sa partie supérieure. Nous ignorons si on le trouve dans quelque autre contrée que la Caroline.

* 6 rayons à la membrane branchiale.

3 aiguillons et 48 rayons articulés à la nageoire dorsale.

24 rayons à chaque nageoire pectorale.

3 aiguillons et 44 rayons articulés à la nageoire de l'anus.

23 rayons à la nageoire de la queue.

DIX-HUITIÈME ORDRE
DE LA CLASSE ENTIÈRE DES POISSONS,
OU SECOND ORDRE

DE LA 1^{re} DIVISION DES OSSEUX.

Poissons jugulaires, ou qui ont des nageoires situées sous la gorge.

QUARANTE-UNIÈME GENRE.

LES MURÉNOÏDES.

Un seul rayon à chacune des nageoires jugulaires; trois rayons à la membrane des branchies; le corps alongé, comprimé et en forme de lame.

ESPÈCE.

CARACTÈRE.

LE MURÉNOÏDE

{ Les mâchoires également
avancées.

SUJEF.

LE MURÉNOÏDE SUJEF.

Ce poisson a été inscrit parmi les blennies : mais il nous a paru en être séparé par de grandes différences. De plus, ses caractères ne permettent de le placer dans aucun autre genre des jugulaires. Nous nous sommes donc vus obligés de le comprendre dans un genre particulier; et comme les deux nageoires qu'il a sous la gorge sont très-petites, composées d'un seul rayon, et quelquefois difficiles à appercevoir, nous l'avons mis à la tête des jugulaires, qu'il lie avec les apodes par cette forme de nageoires inférieures. Il a d'ailleurs des rapports très-nombreux avec les murènes et les trichiures. Son corps est alongé, applati latéralement, et fait en forme de lame d'épée, ainsi que celui des trichiures; et les écailles qui le revêtent, sont aussi

difficiles à distinguer que celles des murènes et particulièrement de l'anguille. Un double rang de dents garnit les deux mâchoires. La tête présente quelquefois de petits tubercules : le dessus de cette partie est triangulaire et un peu convexe. Trois rayons soutiennent seuls la membrane des branchies. L'ouverture de l'anus est située à peu près vers le milieu de la longueur du corps. La couleur de l'animal est d'un gris cendré qui s'éclaircit et se change en blanchâtre sur la tête et sur le ventre. Ce murénoïde est ordinairement long de deux décimètres ; et nous lui avons donné le nom de *sujef*, afin de consacrer la reconnoissance que l'on doit au sayant qui l'a fait connoître.

QUARANTE-DEUXIÈME GENRE.

LES CALLIONYMES.

La tête plus grosse que le corps; les ouvertures branchiales sur la nuque; les nageoires jugulaires très-éloignées l'une de l'autre; le corps et la queue garnis d'écaillés à peine visibles.

PREMIER SOUS-GENRE.

Les yeux très-rapprochés l'un de l'autre.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

1. LE CALLIONYME
LYRE,

{ Le premier rayon de la première nageoire dorsale, de la longueur du corps et de la queue; l'ouverture de la bouche très-grande; la nageoire de la queue arrondie.

2. LE CALLIONYME
DRAGONNEAU.

{ Les rayons de la première nageoire du dos beaucoup plus courts que le corps et la queue; l'ouverture de la bouche très-grande; la nageoire de la queue arrondie.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

3. LECALLIONYME
FLÈCHE.

{ Trois rayons à la membrane
des branchies; l'ouverture
de la bouche petite; la
nageoire de la queue ar-
rondie.

4. LECALLIONYME
JAPONOIS.

{ Le premier rayon de la pre-
mière nageoire dorsale ter-
miné par deux filamens;
la nageoire de la queue
fourchue.

SECOND SOUS-GENRE.

Les yeux très-peu rapprochés l'un de l'autre.

ESPÈCE.

CARACTÈRES.

5. LECALLIONYME
POINTILLÉ.

{ L'ouverture de la bouche très-
petite; la nageoire de la
queue arrondie.





1. *CALLYONYME* Lyre. 2. *GADE* Morue.

3. *GADE* Mustelle.

LE CALLIONYME LYRE ¹.

*CALLIONYME*², *LYRE*; quelles images agréables, quels souvenirs touchans rappellent ces deux noms ! Beauté céleste, art enchanteur de la musique, toi qui charmes les yeux, et toi qui émeus si profondément les cœurs sensibles, ces deux noms, ingénieusement assortis, renouvellent, pour ainsi dire, en la retraçant à la mémoire, votre douce mais irrésistible puissance. Vous que la plus aimable des mythologies fit naître du sein des flots azurés ou sur des rives fortunées, qui, près des poétiques rivages de la Grèce héroïque, formâtes une alliance si heureuse, confondîtes vos myrtes avec vos lauriers, et échangeâtes vos cou-

¹ *Lavandière*, sur quelques côtes françoises de l'Océan.

² *Callionyme* vient du grec, et signifie *beau nom*.

ronnes , que vos images riantes embellissent à jamais les tableaux des peintres de la Nature : béni soit celui qui , par deux noms adroitement rapprochés , associa vos emblèmes comme vos deux pouvoirs magiques avoient été réunis , et qui ne voulut pas qu'un des plus beaux habitans d'une mer témoin de votre double origine pût exposer aux regards du naturaliste attentif ses couleurs brillantes , ni l'espèce de lyre qui paroît s'élever sur son dos , sans ramener l'imagination séduite et vers le dieu des arts , et vers la divinité qui les anime , et dont le berceau fut placé sur les ondes ! Non , nous ne voudrons pas séparer deux noms dont l'union est d'ailleurs consacrée par le génie ; nous ne ferons pas de vains efforts pour empêcher les amis de la science de l'être aussi des graces ; nous ne croirons pas qu'une sévérité inutile doive repousser avec austerité des sentimens consolateurs ; et si nous devons chercher à dissiper les nuages que l'ignorance et l'erreur ont rassemblés devant la Nature , à déchirer ces voiles ridicules et surchargés d'ornemens étran-

gers dont la main mal-adroite d'un mauvais goût froidement imitateur a entouré le sanctuaire de cette Nature si admirable et si féconde , nous n'oublierons pas que nous ne pouvons la connoître telle qu'elle est , qu'en ne blessant aucun de ses traits.

Nous dirons donc toujours *callionyme lyre*. Mais voyons ce qui a mérité au poisson que nous allons examiner , l'espèce de consécration qu'on en a faite , lorsqu'on lui a donné la dénomination remarquable que nous lui conservons.

Nous avons sous les yeux l'un des premiers poissons jugulaires que nous avons cru devoir placer sur notre tableau ; et déjà nous pouvons voir des traits très-prononcés de ces formes qui attireront souvent notre attention , lorsque nous décrirons les osseux thoracins et les osseux abdominaux. Mais à des proportions particulières dans la tête , à des nageoires élevées ou prolongées , à des piquans plus ou moins nombreux , les callionymes , et sur-tout la lyre , réunissent un corps et une queue encore un peu serpentiformes ,

et une peau dénuée d'écailles facilement visibles. Ils montrent un grand nombre de titres de parenté avec les apodes que nous venons d'étudier.

Et si de ce coup d'œil général nous passons à des considérations plus précises, nous trouverons que la tête est plus large que le corps, très-peu convexe par-dessus, et plus aplatie encore par-dessous. Les yeux sont très-rapprochés l'un de l'autre. On a écrit qu'ils étoient garnis d'une membrane clignotante; mais nous nous sommes assurés que ce qu'on a pris pour une telle membrane, n'est qu'une saillie du tégument le plus extérieur de la tête, laquelle se prolonge un peu au-dessus de chaque œil, ainsi qu'on a pu l'observer sur le plus grand nombre de raies et de squales.

L'ouverture de la bouche est très-grande; les lèvres sont épaisses, les mâchoires hérissées de plusieurs petites dents, et les mouvemens de la langue assez libres. On voit à l'extrémité des os maxillaires un aiguillon divisé en branches dont le nombre paroît varier. L'opercule branchial

n'est composé que d'une seule lame : mais il est attaché, ainsi que la membrane branchiale , à la tête ou au corps de l'animal , dans une si grande partie de sa circonférence , qu'il ne reste d'autre ouverture pour la sortie ou pour l'introduction de l'eau , qu'une très-petite fente placée de chaque côté au-dessus de la nuque , et qui , par ses dimensions , sa position et sa figure , ressemble beaucoup à un évent.

L'ouverture de l'anüs est beaucoup plus près de la tête que de la nageoire de la queue. La ligne latérale est droite.

Sur le dos s'élèvent deux nageoires : la plus voisine de la tête est composée de quatre ou de cinq et même quelquefois de sept rayons. Le premier est si alongé et dépasse la membrane en s'étendant à une si grande hauteur , que sa longueur égale l'intervalle qui sépare la nuque du bout de la queue. Les trois ou quatre qui viennent ensuite sont beaucoup moins longs , et décroissent dans une telle proportion , que le plus souvent ils paroissent être entre eux et avec le premier dans les mêmes rapports que des cordes d'un ins-

trument destinées à donner, par les seules différences de leur longueur, les tons *ut*, *ut* octave, *sol*, *ut* double octave, et *mi*, c'est-à-dire, l'accord le plus parfait de tous ceux que la musique admet. Au-delà, deux autres rayons plus courts encore se montrent quelquefois et paroissent représenter des cordes destinées à faire entendre des sons plus élevés que le *mi*; et voilà donc une sorte de lyre à cordes harmoniquement proportionnées, qu'on a cru, pour ainsi dire, trouver sur le dos du callionyme dont nous parlons; et comment dès-lors se seroit-on refusé à l'appeler *lyre* ou *porte-lyre* * ?

Les autres nageoires, et particulièrement celle de l'anus et la seconde du dos, qui se prolongent vers l'extrémité de la

- * A la membrane des branchies.. 6 rayons.
à la première nageoire dorsale, de 4 à 7
à la seconde nageoire du dos.... 10
à chacune des pectorales..... 18
à chacune des nageoires jugulaires 6
à celle de l'anus..... 10
à celle de la queue, qui est arrondie..... 9

queue en bandelette membraneuse , ont une assez grande étendue , et forment de larges surfaces sur lesquelles les belles nuances de la lyre peuvent , en se déployant , justifier son nom de *callionyme*. Les tons de couleurs qui dominant au milieu de ces nuances , sont le jaune , le bleu , le blanc , et le brun , qui les encadre , pour ainsi dire.

Le jaune règne sur les côtés du dos , sur la partie supérieure des deux nageoires dorsales , et sur toutes les autres nageoires , excepté celle de l'anús. Le bleu paroît avec des teintes plus ou moins foncées sur cette nageoire de l'anús , sur les deux nageoires dorsales où il forme des raies souvent ondées , sur les côtés où il est distribué en taches irrégulières. Le blanc occupe la partie inférieure de l'animal.

Ces nuances , dont l'éclat , la variété et l'harmonie distinguent le callionyme lyre , sont une nouvelle preuve des rapports que nous avons indiqués dans notre Discours sur la nature des poissons , entre les couleurs de ces animaux et la nature

de leurs alimens : nous avons vu que très-fréquemment les poissons les plus richement colorés étoient ceux qui se nourrissoient de mollusques ou de vers. La lyre a reçu une parure magnifique , et communément elle recherche des oursins et des astéries. \

Au reste , ce callionyme ne parvient guère qu'à la longueur de quatre ou cinq décimètres : on le trouve non seulement dans la Méditerranée , mais encore dans d'autres mers australes ou septentrionales ; et on dit que , dans presque tous les climats qu'il habite , sa chair est blanche et agréable au goût.

LE CALLIONYME

D R A G O N N E A U.

CE callionyme habite les mêmes mers que la lyre, avec laquelle il a de très-grands rapports ; il n'en diffère même d'une manière très-sensible que par la brièveté et les proportions des rayons qui soutiennent la première nageoire dorsale, par le nombre des rayons des autres nageoires*, par la forme de la ligne latérale qu'on a souvent de la peine à distinguer, et par les nuances et la disposition de ses couleurs. Beaucoup moins brillantes que celles de la lyre, ces teintes sont brunes sur la tête et le dos, argentées avec des taches sur la partie inférieure de l'animal ;

- * A la première nageoire dorsale. 4 rayons.
à la seconde nageoire du dos... 10
à chacune des pectorales..... 19
à chacune des jugulaires..... 6
à celle de l'anus..... 9
à celle de la queue..... 19

et ces tons simples et très-peu éclatans ne sont relevés communément que par un peu de verdâtre que l'on voit sur les nageoires de la poitrine et de l'anüs , du verdâtre mêlé à du jaune qui distingue les nageoires jugulaires , et du jaune qui s'étend par raies sur la seconde nageoire dorsale , ainsi que sur celle de la queue.

D'ailleurs la chair du dragonneau est , comme celle de la lyre , blanche et d'un goût agréable. Il n'est donc pas surprenant que quelques naturalistes , et particulièrement le professeur Gmelin , aient soupçonné que ces deux callionymes pourroient bien être de la même espèce , mais d'un sexe différent. Nous n'avons pas pu nous procurer assez de renseignemens précis pour nous assurer de l'opinion que l'on doit avoir relativement à la conjecture de ces savans ; et dans le doute , nous nous sommes conformés à l'usage du plus grand nombre des auteurs qui ont écrit sur l'ichthyologie , en séparant de la lyre le callionyme dragonneau , qu'il sera , au reste , aisé de retrancher de notre tableau méthodique.

LE CALLIONYME FLÈCHE,

E T

LE CALLIONYME JAPONOIS.

Ces deux espèces appartiennent , comme la lyre et le dragonneau , au premier sous-genre des callionymes ; c'est-à-dire , elles ont les yeux très - rapprochés l'un de l'autre. L'illustre Pallas a fait connoître la première , et le savant Houttuyn la seconde.

La flèche décrite par le naturaliste de Pétersbourg avoit à peine un décimètre de longueur. L'espèce à laquelle appartenoit cet individu , vit dans la mer qui entoure l'île d'Amboine ; elle est , dans sa partie supérieure , d'un brun mêlé de taches irrégulières et nuageuses d'un gris blanchâtre , qui règne en s'éclaircissant sur la partie inférieure. Des taches ou des

points bruns paroissent sur le haut de la nageoire caudale et sur les nageoires jugulaires ; une bande très-noire se montre sur la partie postérieure de la première nageoire dorsale ; et la seconde du dos , ainsi que les pectorales , sont très-transparentes , et variées de brun et de blanc *. Voici , d'ailleurs , les principaux caractères par lesquels la flèche est séparée de la lyre. L'ouverture de la bouche est très-petite ; les lèvres sont minces et étroites ; les opercules des branchies sont mous , et composés , au moins , de deux lames , dont la première se termine par une longue pointe , et présente , dans son bord postérieur , une dentelure très-sensible ; on ne voit que trois rayons à la membrane branchiale ; la première nageoire du dos

* A la membrane des branchies.....	3 rayons.
à la première dorsale.....	4
à la seconde.....	9
à chacune des pectorales.....	11
à chacune des jugulaires.....	5
à la nageoire de l'anüs.....	8
à celle de la queue.....	10

et celle de l'anus sont très-basses, ou, ce qui est la même chose, forment une bande très-étroite.

Le nom de *callionyme japonais* indique qu'il vit dans des mers assez voisines de celles dans lesquelles on trouve la flèche. Il parvient à la longueur de trois décimètres, ou environ. Il présente différentes nuances. Sa première nageoire dorsale montre une tache noire, ronde, et entourée de manière à représenter l'iris d'un œil; les rayons de cette même nageoire sont noirs, et le premier de ces rayons se termine par deux filamens assez longs, ce qui forme un caractère extrêmement rare dans les divers genres de poissons. La seconde nageoire du dos est blanchâtre; les nageoires pectorales sont arrondies, les jugulaires très-grandes; et celle de la queue est très-alongée et fourchue*.

* A la première nageoire dorsale..	4 rayons.
à la seconde.....	10
à chacune des pectorales.....	17
à chacune des jugulaires.....	5
à celle de l'anus.....	8
à celle de la queue.....	9

LE CALLIONYME POINTILLÉ.

CE poisson , qui appartient au second sous-genre des callionymes , et qui , par conséquent , a les yeux assez éloignés l'un de l'autre , ne présente que de très-petites dimensions. L'individu mesuré par le naturaliste Pallas , qui a fait connoître cette espèce , n'étoit que de la grandeur *du petit doigt de la main*. Ce callionyme est d'ailleurs varié de brun et de gris , et parsemé , sur toutes les places grises , de points blancs et brillans ; le blanchâtre règne sur la partie inférieure de l'animal ; la seconde nageoire du dos est brune avec des raies blanches et parallèles ; les pectorales sont transparentes , et de plus pointillées de blanc à leur base , de même que celle de la queue ; les rayons de ces trois nageoires présentent d'ailleurs une ou deux places brunes ; les jugulaires sont noires

dans leur centre , et blanches dans leur circonférence ; et la nageoire de l'anus est blanche à sa base et noire dans le reste de son étendue.

Telles sont les couleurs des deux sexes ; mais voici les différences qu'ils offrent dans leurs nuances : la première nageoire du dos du mâle est toute noire ; celle de la femelle montre une grande variété de tons qui se déploient d'autant plus facilement que cette nageoire est plus haute que celle du mâle. Sur la partie inférieure de cet instrument de natation , s'étendent des raies brunes relevées par une bordure blanche et par une bordure plus extérieure et noire ; et sur la partie supérieure , on voit quatre ou cinq taches rondes , noires dans leur centre , entourées d'un cercle blanc bordé de noir , et imitant un iris avec sa prunelle.

Ces dimensions plus considérables et ces couleurs plus vives et plus variées d'un organe sont ordinairement dans les poissons , comme dans presque tous les autres animaux , un apanage du mâle , plutôt que de la femelle ; et l'on doit remarquer

de plus dans la femelle du callionyme pointillé un appendice conique situé au-delà de l'anüs, qui, étant très-petit, peut être couché et caché aisément dans une sorte de fossette, et qui vraisemblablement sert à l'émission des œufs *.

Dans les deux sexes, l'ouverture de la bouche est très-petite; les lèvres sont épaisses; la supérieure est double; l'opercule branchial garni d'un piquant, et la ligne latérale assez droite.

* A la membrane des branchies..	5 ou 6 ray.
à la première nageoire dorsale..	4
à la seconde.....	8
à chacune des pectorales.....	20
à chacune des jugulaires.....	5
à celle de l'anüs.....	7
à celle de la queue.....	10

QUARANTE-TROISIÈME GENRE.

LES CALLIOMORES.

La tête plus grosse que le corps ; les ouvertures branchiales placées sur les côtés de l'animal ; les nageoires jugulaires très-éloignées l'une de l'autre ; le corps et la queue garnis d'écaillés à peine visibles,

ESPÈCE.

CARACTÈRES.

LE CALLIOMORE
INDIEN.

{ Sept rayons à la membrane
des branchies ; deux aiguil-
lons à la première pièce,
et un aiguillon à la se-
conde de chaque opercule.

LE CALLIOMORE INDIEN.

CE mot *calliomore*, formé par contraction de deux mots grecs, dont l'un est *καλλιονυμος*, et l'autre veut dire *limitrophe*, *voisin*, etc., désigne les grands rapports qui rapprochent le poisson que nous allons décrire, des vrais callionymes; il a même été inscrit jusqu'à présent dans le même genre que ces derniers animaux: mais il nous a paru en différer par trop de caractères essentiels, pour que les principes qui nous dirigent dans nos distributions méthodiques, nous aient permis de ne pas l'en séparer.

Le calliomore indien a des teintes bien différentes, par leur peu d'éclat et leur uniformité, des couleurs variées et brillantes qui parent les callionymes, et surtout la lyre: il est d'un gris plus ou moins livide. L'ensemble de son corps et de sa queue est d'ailleurs très-déprimé, c'est-à-dire, applati de haut en bas; ce qui le lie avec les uranoscopes dont nous allons

parler, et ne contribue pas peu à déterminer la place qu'il doit occuper dans un tableau général des poissons. Les ouvertures de ses branchies sont placées sur les côtés de la tête, au lieu de l'être sur la nuque, comme celles des branchies des callionymes; ces orifices ont de plus beaucoup de largeur; la membrane qui sert à les fermer, est soutenue par sept rayons; et l'opercule, composé de deux lames, présente deux piquans sur la première de ces deux pièces, et un piquant sur la seconde.

La mâchoire inférieure est un peu plus avancée que celle de dessus; l'on voit sur la tête des rugosités disposées longitudinalement; et le premier rayon de la première nageoire dorsale est très-court et séparé des autres*.

C'est en Asie que l'on trouve le calliomore indien.

* A la première nageoire dorsale..	7 rayons.
à la seconde.....	13
à chacune des pectorales.....	20
à chacune des jugulaires.....	6
à la nageoire de l'anus.....	13
à celle de la queue.....	11

QUARANTE-QUATRIÈME GENRE.

LES URANOSCOPES.

La tête déprimée, et plus grosse que le corps; les yeux sur la partie supérieure de la tête, et très-rapprochés; la mâchoire inférieure beaucoup plus avancée que la supérieure; l'ensemble formé par le corps et la queue, presque conique, et revêtu d'écailles très-faciles à distinguer; chaque opercule branchial composé d'une seule pièce, et garni d'une membrane ciliée.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.




1. L'URANOSCOPE
RAT.

{ Le dos dénué d'écailles épineuses.

2. L'URANOSCOPE
HOUTTUYN.

{ Le dos garni d'écailles épineuses.





1. URANOSCOPE Rat. 2 TRACHINE Vive.

3. SCORPÈNE Double filament.

L'URANOSCOPE RAT *.

LES noms de *callionyme* et de *trachine* donnés à cet animal , annoncent les ressemblances qu'il présente avec les vrais callionymes , et avec le genre dont nous nous occuperons après avoir décrit celui des uranoscopes. Nous n'avons pas besoin d'indiquer ces similitudes ; on les remarquera aisément. D'un autre côté , cette dénomination d'*uranoscope* (qui regarde le ciel) désigne le caractère frappant que montre le dessus de la tête du rat et des autres poissons du même genre. Leurs yeux sont , en effet , non seulement très-rapprochés l'un de l'autre , et placés sur la partie supérieure de la tête , mais tournés de manière que lorsque l'animal

* *Tapecon* , *raspecon* , sur les côtes de plusieurs départemens méridionaux de France; *mesoro* , *pesce prete* , *rascassa bianca* , *bocca in capo* , dans quelques contrées de l'Italie.

est en repos , ses prunelles sont dirigées vers la surface des eaux , ou le sommet des cieux.

La tête très-applatie , et beaucoup plus grosse que le corps , est d'ailleurs revêtue d'une substance osseuse et dure , qui forme comme une sorte de casque garni d'un très-grand nombre de petits tubercules , s'étend jusqu'aux opercules qui sont aussi très-durs et verruqueux , présente , à peu près au-dessus de la nuque , deux ou plus de deux piquans renfermés quelquefois dans une peau membraneuse , et se termine sous la gorge par trois ou cinq autres piquans. Chaque opercule est aussi armé de pointes tournées vers la queue et engagées en partie dans une sorte de gaine très-molle.

L'ouverture de la bouche est située à l'extrémité de la partie supérieure de la tête , et l'animal ne peut la fermer qu'en portant vers le haut le bout de sa mâchoire inférieure , qui est beaucoup plus longue que la mâchoire supérieure. La langue est épaisse , forte , courte , large , et hérissée de très-petites dents. De l'inté-

rière de la bouche et près du bout antérieur de la mâchoire inférieure, part une membrane, laquelle se rétrécit, s'arrondit, et sort de la bouche en filament mobile et assez long.

Le tronc et la queue représentent ensemble une espèce de cône recouvert de petites écailles, et sur chaque côté duquel s'étend une ligne latérale qui commence aux environs de la nuque, s'approche des nageoires pectorales*, va directement ensuite jusqu'à la nageoire de la queue, et indique une série de pores destinés à laisser échapper cette humeur onctueuse si nécessaire aux poissons, et dont nous avons déjà eu tant d'occasions de parler.

Il y a deux nageoires sur le dos; celles

* A la membrane des branchies...	5 rayons.
à la première nageoire dorsale..	4
à la seconde.....	14
à chacune des pectorales.....	17
à chacune des jugulaires.....	6
à la nageoire de l'anus.....	13
à celle de la queue, qui est rectiligne.,.....	12

de la poitrine sont très-grandes , ainsi que la caudale. Des teintes jaunâtres distinguent ces nageoires pectorales ; celle de l'anüs est d'un noir éclatant : l'animal est d'ailleurs brun par-dessus, gris sur les côtés , et blanc par-dessous.

Le canal intestinal de l'uranoscope rat n'est pas très-long , puisqu'il n'est replié qu'une fois ; mais la membrane qui forme les parois de son estomac , est assez forte , et l'on compte auprès du pylore , depuis huit jusqu'à douze appendices ou petits cœcums propres à prolonger le séjour des alimens dans l'intérieur du poisson , et par conséquent à faciliter la digestion.

Le rat habite particulièrement dans la Méditerranée. Il y vit le plus souvent auprès des rivages vaseux ; il s'y cache sous les algues ; il s'y enfonce dans la fange ; et par une habitude semblable à celles que nous avons déjà observées dans plusieurs raies , dans la lophie baudroie , et dans quelques autres poissons , il se tient en embuscade dans le limon , ne laissant paroître qu'une petite partie de sa tête , mais étendant le filament mobile

qui est attaché au bout de sa mâchoire inférieure, et attirant par la ressemblance de cette sorte de barbillon avec un ver, de petits poissons qu'il dévore. C'est Rondelet qui a fait connoître le premier cette manière dont l'uranoscope rat parvient à se saisir facilement de sa proie. Ce poisson ne peut se servir de ce moyen de pêcher, qu'en demeurant pendant très-long-temps immobile, et paroissant plongé dans un sommeil profond. Voilà pourquoi, apparemment, on a écrit qu'il dormoit plutôt pendant le jour que pendant la nuit, quoique, dans son organisation, rien n'indique une sensibilité aux rayons lumineux moins vive que celle des autres poissons, desquels on n'a pas dit que le temps de leur sommeil fût le plus souvent celui pendant lequel le soleil éclaire l'horizon *.

Il parvient jusqu'à la longueur de trois décimètres : sa chair est blanche, mais quelquefois dure, et de mauvaise odeur ;

* Voyez, dans le *Discours sur la nature des poissons*, ce qui concerne le sommeil de ces animaux.

elle indique , par ces deux mauvaises qualités , les petits mollusques et les vers marins dont le rat aime à se nourrir, et les fonds vaseux qu'il préfère. Dès le temps des anciens naturalistes grecs et latins , on savoit que la vésicule du fiel de cet uranoscope est très-grande , et l'on croyoit que la liqueur qu'elle contient , étoit très-propre à guérir des plaies et quelques maladies des yeux.

L'URANOSCOPE HOUTTUYN.

LE nom que nous donnons à cet uranoscope, est un témoignage de la reconnaissance que les naturalistes doivent au savant Houttuyn, qui en a publié le premier la description.

On trouve ce poisson dans la mer qui baigne les îles du Japon. Il est, par ses couleurs, plus agréable à voir que l'uranoscope rat; en effet, il est jaune dans sa partie supérieure, et blanc dans l'inférieure. Les nageoires jugulaires sont assez courtes*; des écailles épineuses sont rangées longitudinalement sur le dos de l'houttuyn.

- * A la première nageoire dorsale. 4 rayons.
- à la seconde..... 15
- à chacune des pectorales..... 12
- à chacune des jugulaires..... 5
- à celle de la queue..... 8

QUARANTE-CINQUIÈME GENRE.

LES TRACHINES.

La tête comprimée, et garnie de tubercules ou d'aiguillons; une ou plusieurs pièces de chaque opercule, dentelées; le corps et la queue alongés, comprimés, et couverts de petites écailles; l'an us situé très-près des nageoires pectorales.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. LA TRACHINE
VIVE. | { La mâchoire inférieure plus
avancée que la supérieure. |
| 2. LA TRACHINE
OSBECK. | { Les deux mâchoires égale-
ment avancées. |
-

LA TRACHINE VIVE *.

CET animal a été nommé *dragon marin* dès le temps d'Aristote. Et comment n'auroit-il pas, en effet, réveillé l'idée du dragon ? Ses couleurs sont souvent brillantes et agréables à la vue ; il les anime par la vivacité de ses mouvemens ; il a de plus reçu le pouvoir terrible de causer des blessures cruelles , par des armes ,

* *Viver*, sur plusieurs côtes françoises de l'Océan ; *araigne*, sur les rivages de plusieurs départemens méridionaux de France ; *saccarailla blanc*, auprès de Bayonne ; *tragina*, en Sicile ; *pisce ragno*, dans plusieurs contrées de l'Italie ; *fiæsing*, en Danemarck ; *fjarsing*, par les Danois et les Suédois ; *schwert fisch*, *pieterman*, dans plusieurs pays du nord de l'Europe ; *weever*, par les Anglois ; *δρακων*, par les Grecs modernes ; *aranéole*, *boisdereau*, et *bois de roc*, pendant la jeunesse de l'animal , et sur quelques côtes méridionales de France.

pour ainsi dire, inévitables. Une beauté peu commune et une puissance dangereuse n'ont-elles pas toujours été les attributs distinctifs des enchanteresses créées par l'antique mythologie, ainsi que des fées auxquelles une poésie plus moderne a voulu donner le jour? Ne doivent-elles pas, lorsqu'elles se trouvent réunies, rappeler le sinistre pouvoir de ces êtres extraordinaires, retracer l'image de leurs ministres, présenter sur-tout à l'imagination amie du merveilleux ce composé fantastique, mais imposant, de formes, de couleurs, d'armes, de qualités effrayantes et douées cependant d'un attrait invincible, qui servant, sous le nom de *dragon*, les complots ténébreux des magiciennes de tous les âges, au char desquelles on l'a attaché, ne répand l'épouvante qu'avec l'admiration, séduit avant de donner la mort, éblouit avant de consumer, enchante avant de détruire?

Et afin que cette même imagination fût plus facilement entraînée au-delà de l'intervalle qui sépare le dragon de la

Fable, de la *vive* de la Nature, n'a-t-on pas attribué à ce poisson un venin redoutable? ne s'est-on pas plu à faire remarquer les brillantes couleurs de ses yeux, dans lesquels on a voulu voir resplendir, comme dans ceux du dragon poétique, tous les feux des pierres les plus précieuses?

Il en est cependant du dragon marin comme du dragon terrestre*. Son nom fameux se lie à d'immortels souvenirs : mais à peine l'a-t-on apperçu, que toute idée de grandeur s'évanouit ; il ne lui reste plus que quelques rapports vagues avec la brillante chimère dont on lui a appliqué la fastueuse dénomination ; et du volume gigantesque qu'on étoit porté à lui attribuer, il se trouve tout d'un coup réduit à de très-petites dimensions. Ce dragon des mers, ou, pour mieux dire, et pour éviter toute cause d'erreur, la trachine vive ne parvient, en effet, très-souvent qu'à la longueur de trois ou quatre décimètres.

* Voyez l'article *du dragon* dans notre *Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares*.

Sa tête est comprimée et garnie dans plusieurs endroits de petites aspérités. Les yeux, rapprochés l'un de l'autre, ont la couleur et la vivacité de l'émeraude avec l'iris jaune tacheté de noir. L'ouverture de la bouche est assez grande, la langue pointue; et la mâchoire inférieure, qui est plus avancée que la supérieure, est armée, ainsi que cette dernière, de dents très-aiguës. Chaque opercule recouvre une large ouverture branchiale, et se termine par une longue pointe tournée vers la queue. Le dos présente deux nageoires : les rayons de la première ne sont qu'au nombre de cinq; mais ils sont non articulés, très-pointus et très-forts. La peau qui revêt l'animal est couverte d'écailles arrondies, petites et foiblement attachées : mais elle est si dure, qu'on peut écorcher une trachine vive presque aussi facilement qu'une murène anguille. Il en est de même de l'uranoscope rat; et c'est une nouvelle ressemblance entre la vive et cet uranoscope.

Le dos du poisson est d'un jaune brun;

ses côtés et sa partie inférieure sont argentés et variés dans leurs nuances par des raies transversales ou obliques , brunâtres , et fréquemment dorées ; la première nageoire dorsale est presque toujours noire *.

On trouve dans son intérieur et auprès du pylore , au moins huit appendices ou petits cœcums.

La vive habite non seulement dans la Méditerranée , mais encore dans l'Océan. Elle se tient presque toujours dans le sable , ne laissant paroître qu'une partie de sa tête ; et elle a tant de facilité à creuser son petit asyle dans le limon , que lorsqu'on la prend et qu'on la laisse échapper , elle disparoît en un clin d'œil , et s'enfonce dans la vase. Lorsque la vive est ainsi retirée dans le sable humide ,

* A la première nageoire dorsale..	5 rayons.
à la seconde.....	24
à chacune des nageoires pectorales	16
à chacune des jugulaires.....	6
à la nageoire de l'anus.....	25
à celle de la queue , qui est un peu fourchue.....	15

elle n'en conserve pas moins la faculté de frapper autour d'elle avec force et promptitude par le moyen de ses aiguillons et particulièrement de ceux qui composent sa première nageoire dorsale. Aussi doit-on se garder de marcher nud-pieds sur le sable ou le limon au-dessous duquel on peut supposer des vives : leurs piquans font des blessures très-douloureuses. Mais malgré le danger de beaucoup souffrir , auquel on s'expose lorsqu'on veut prendre ces trachines , leur chair est d'un goût si délicat , que l'on va très-fréquemment à la pêche de ces poissons , et qu'on emploie plusieurs moyens pour s'en procurer un grand nombre.

Pendant la fin du printemps et le commencement de l'été , temps où les vives s'approchent des rivages pour déposer leurs œufs , ou pour féconder ceux dont les femelles se sont débarrassées , on en trouve quelquefois dans les *manets* ou filets à nappes simples , dont on se sert pour la pêche des maquereaux. On emploie aussi pour les prendre, lorsque la

nature du fond le permet , des *drèges* où espèces de filets qui reposent légèrement sur ce même fond , et peuvent dériver avec la marée.

On s'efforce d'autant plus de pêcher une grande quantité de vives , que ces animaux non seulement donnent des signes très-marqués d'irritabilité après qu'ils ont été vidés, ou qu'on leur a coupé la tête , mais encore peuvent vivre assez long-temps hors de l'eau , et par conséquent être transportés encore en vie à d'assez grandes distances. D'ailleurs , par un rapport remarquable entre l'irritabilité des muscles et leur résistance à la putridité , la chair des trachines vives ne se corrompt pas aisément , et peut être conservée pendant plusieurs jours , sans cesser d'être très-bonne à manger ; et c'est à cause de ces trois propriétés qu'elles ont reçu le nom spécifique que j'ai cru devoir leur laisser.

Cependant, si plusieurs marins vont sans cesse à la recherche de ces trachines , la crainte fondée d'être cruellement blessés par les piquans de ces animaux , et sur-

tout par les aiguillons de la première nageoire dorsale, leur fait prendre de grandes précautions ; et les accidens occasionnés par ces dards ont été regardés comme assez graves pour que , dans le temps , l'autorité publique ait cru , en France , devoir donner , à ce sujet , des ordres très-sévères. Les pêcheurs s'attachent sur-tout à briser ou arracher les aiguillons des vives qu'ils tirent de l'eau. Lorsque, malgré toute leur attention, ils ne peuvent pas parvenir à éviter la blessure qu'ils redoutent, ceux de leurs membres qui sont piqués, présentent une tumeur accompagnée de douleurs très-cuisantes, et quelquefois de fièvre. La violence de ces symptômes dure ordinairement pendant douze heures ; et comme cet intervalle de temps est celui qui sépare une haute marée de celle qui la suit, les pêcheurs de l'Océan n'ont pas manqué de dire que la durée des accidens occasionnés par les piquans des vives avoit un rapport très-marqué avec les phénomènes du flux et reflux, auxquels ils sont forcés de faire une attention continuelle, à cause de

l'influence des mouvemens de la mer sur toutes leurs opérations. Au reste , les moyens dont les marins de l'Océan ou de la Méditerranée se servent pour calmer leurs souffrances , lorsqu'ils ont été piqués par des trachines vives , ne sont pas peu nombreux ; et plusieurs de ces remèdes sont très - anciennement connus. Les uns se contentent d'appliquer sur la partie malade le foie ou le cerveau encore frais du poisson ; les autres , après avoir lavé la plaie avec beaucoup de soin, emploient une décoction de lentisque , ou les feuilles de ce végétal, ou des fèves de marais. Sur quelques côtes septentrionales, on a recours quelquefois à de l'urine chaude ; le plus souvent on y substitue du sable mouillé , dont on enveloppe la tumeur , en tâchant d'empêcher tout contact de l'air avec les membres blessés par la trachine.

L'enflure considérable et les douleurs longues et aiguës qui suivent la piqure de la vive , ont fait penser que cette trachine étoit véritablement venimeuse ; et voilà pourquoi , sans doute , on lui a

donné le nom de l'araiguée, dans laquelle on croyoit devoir supposer un poison assez actif. Mais la vive ne lance dans la plaie qu'elle fait avec ses piquans, aucune liqueur particulière : elle n'a aucun instrument propre à déposer une humeur vénéneuse dans un corps étranger, aucun réservoir pour la contenir dans l'intérieur de son corps, ni aucun organe pour la filtrer ou la produire. Tous les effets douloureux de ses aiguillons doivent être attribués à la force avec laquelle elle se débat lorsqu'on la saisit, à la rapidité de ses mouvemens, à l'adresse avec laquelle elle se sert de ses armes, à la promptitude avec laquelle elle redresse et enfonce ses petits dards dans la main, par exemple, qui s'efforce de la retenir, à la profondeur à laquelle elle les fait parvenir, et à la dureté ainsi qu'à la forme très-pointue de ces piquans.

La vive n'emploie pas seulement contre les marins qui la pêchent et les grands poissons qui l'attaquent, l'énergie, l'agilité et les armes dangereuses que nous venons de décrire : elle s'en sert aussi pour

se procurer plus facilement sa nourriture, lorsque ne se contentant pas d'animaux à coquille, de mollusques, ou de crabes, elle cherche à dévorer des poissons d'une taille presque égale à la sienne.

Tels sont les faits certains dont on peut composer la véritable histoire de la trachine vive. Elle a eu aussi son histoire fabuleuse, comme toutes les espèces d'animaux qui ont présenté quelque phénomène remarquable. Nous ne la rapporterons pas, cette histoire fabuleuse. Nous ne parlerons pas des opinions contraires aux lois de la physique maintenant les plus connues, ni des contes ridicules que l'on trouve, au sujet de la vive, dans plusieurs auteurs anciens, particulièrement dans Élien, ainsi que dans quelques écrivains modernes, et qui doivent principalement leur origine au nom de *dragon* que porte cette trachine, et à toutes les fictions vers lesquelles ce nom ramène l'imagination; nous ne dirons rien du pouvoir merveilleux de la main droite ou de la main gauche lorsqu'on touche une vive, ni d'autres observations presque du même genre: en tâchant de dé-

couvrir les propriétés des ouvrages de la Nature, et les divers effets de sa puissance, nous n'avons qu'un trop grand nombre d'occasions d'ajouter à l'énumération des erreurs de l'esprit humain.

Il paroît que selon les mers qu'elle habite, la vive présente dans ses dimensions, ou dans la disposition et les nuances de ses couleurs, des variétés plus ou moins constantes. Voici les deux plus dignes d'attention.

La première est d'un gris cendré avec des raies transversales, d'un brun tirant sur le bleu. Elle a trois décimètres, ou à peu près, de longueur.

La seconde est blanche, parsemée, sur sa partie supérieure, de points brunâtres, et distinguée d'ailleurs par des taches de la même teinte, mais grandes et ovales, que l'on voit également sur sa partie supérieure. Elle parvient à une longueur de plus de trois décimètres.

C'est vraisemblablement de cette variété qu'il faut rapprocher les trachines vives de quelques côtes de l'Océan, que l'on nomme *saccarailles blancs*, et qui sont longues de cinq ou six décimètres.

LA TRACHINE OSBECK.

C'EST dans l'océan Atlantique, et auprès de l'île de l'Ascension, qu'habite cette trachine, dont la description a été publiée par le savant voyageur Osbeck. Les deux mâchoires de ce poisson sont également avancées, et garnies de plusieurs rangs de dents longues et pointues, dont trois en haut et trois en bas sont plus grandes que les autres; des dents aiguës sont aussi placées auprès du gosier. Chaque opercule se termine par deux aiguillons inégaux en longueur. La nageoire de la queue est rectiligne*. Tout l'animal est blanc avec des taches noires. Telles sont les principales différences qui écartent cette espèce de la trachine vive.

- * A la membrane des branchies... 6 rayons.
à chacune des nageoires pectorales 18
à chacune des jugulaires..... 5
à la nageoire de l'anus..... 11
à celle de la queue..... 16

QUARANTE-SIXIÈME GENRE.

LES GADES.

La tête comprimée; les yeux peu rapprochés l'un de l'autre, et placés sur les côtés de la tête; le corps alongé, peu comprimé, et revêtu de petites écailles; les opercules composés de plusieurs pièces, et bordés d'une membrane non ciliée.

PREMIER SOUS-GENRE.

Trois nageoires sur le dos; un ou plusieurs barbillons au bout du museau.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

I. LE GADE MORUE.

{ La nageoire de la queue, fourchue; la mâchoire supérieure plus avancée que l'inférieure; le premier rayon de la première nageoire de l'anus, non articulé, et épineux.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

2. LE GADE
ÆGLEFIN.

{ La nageoire de la queue,
fourchue ; la mâchoire su-
périeure plus avancée que
l'inférieure ; la couleur
blanchâtre ; la ligne laté-
rale noire.

4. LE GADE BIB

{ a nageoire de la queue,
fourchue ; la mâchoire su-
périeure un peu plus avan-
cée que l'inférieure ; le pre-
mier rayon de chaque na-
geoire jugulaire, terminé
par un long filament.

4. LE GADE
SAIDA.

{ La nageoire de la queue,
fourchue ; la mâchoire in-
férieure un peu plus avan-
cée que la supérieure ; le
second rayon de chaque
nageoire jugulaire, termi-
né par un long filament.

5. LE GADE
BLENNIOÏDE.

{ La nageoire de la queue,
fourchue ; le premier
rayon de chaque nageoire
jugulaire plus long que les
autres, et divisé en deux.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

6. LE GADE
CALLARIAS.

{ La nageoire de la queue en croissant; la mâchoire supérieure plus avancée que l'inférieure; la ligne latérale large et tachetée.

7. LE GADE
TACAUD.

{ La nageoire de la queue en croissant; la mâchoire supérieure plus avancée que l'inférieure; la hauteur du corps égale, à peu près, au tiers de la longueur totale de l'animal.

8. LE GADE
CAPELAN.

{ La nageoire de la queue, arrondie; la mâchoire supérieure plus avancée que l'inférieure; le ventre très-carené; l'anus placé, à peu près, à une égale distance de la tête et de l'extrémité de la queue.

SECOND SOUS-GENRE.

Trois nageoires sur le dos ; point de barbillons au bout du museau.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

9. LE GADE
COLIN.

{ La nageoire de la queue, fourchue ; la mâchoire inférieure plus avancée que la supérieure ; la ligne latérale presque droite ; la bouche noire.

10. LE GADE
POLLACK.

{ La nageoire de la queue, fourchue ; la mâchoire inférieure plus avancée que la supérieure ; la ligne latérale très-courbe.

11. LE GADE SEY.

{ La nageoire de la queue, fourchue ; les deux mâchoires également avancées ; la couleur du dos verdâtre.

12. LE GADE
MERLAN.

{ La nageoire de la queue en croissant ; la mâchoire supérieure plus avancée que l'inférieure ; la couleur blanche.

TROISIÈME SOUS-GENRE.

*Deux nageoires dorsales ; un ou plusieurs
barbillons au bout du museau.*

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

13. LE GADE
MOLVE.

{ La nageoire de la queue ,
arrondie ; la mâchoire su-
périeure plus avancée que
l'inférieure.

14. LE GADE
DANOIS.

{ La mâchoire inférieure plus
avancée que la supérieure ;
la nageoire de l'anus très-
longue , et composée de 70
rayons ou environ.

15. LE GADE
LOTE.

{ La nageoire de la queue , ar-
rondie ; les deux mâchoires
également avancées.

16. LE GADE
MUSTELLE.

{ La nageoire de la queue ,
arrondie ; la première na-
geoire du dos très-basse ,
excepté le premier ou le
second rayon ; la ligne la-
térale très-courbe auprès
des nageoires pectorales ,
et ensuite droite.

ESPÈCES.

CARACTÈRES.

17. LE GADE
CIMBRE.

La nageoire de la queue ,
arrondie ; deux barbillons
auprès des narines ; un
barbillon à la lèvre supé-
rieure, et un à l'inférieure ;
le premier rayon de la
première nageoire dorsale,
terminé par deux filets
disposés horizontalement
comme les branches d'un
T.

QUATRIÈME SOUS-GENRE.

*Deux nageoires dorsales ; point de barbillons
auprès du bout du museau.*

ESPÈCE.

CARACTÈRES.

18. LE GADE
MERLUS.

La nageoire de la queue ,
rectiligne ; la mâchoire in-
férieure plus avancée que
la supérieure.

CINQUIÈME SOUS-GENRE.

*Une seule nageoire dorsale; des barbillons
au bout du museau.*

ESPÈCE.

CARACTÈRES.

19. LE GADE
BROSME.

{ La nageoire de la queue lan-
céolée; des bandes trans-
versales sur les côtés.

LE GADE MORUE*.

PARMI tous les animaux qui peuplent l'air , la terre ou les eaux , il n'est qu'un très-petit nombre d'espèces utiles dont l'histoire puisse paroître aussi digne d'intérêt que celle de la morue , à la philosophie attentive et bienfaisante qui médite sur la prospérité des peuples. L'homme a élevé le cheval pour la guerre , le bœuf pour le travail , la brebis pour l'industrie , l'éléphant pour la pompe , le chameau pour l'aider à traverser les déserts , le dogue pour sa garde , le chien courant pour la chasse , le barbet pour le senti-

* *Morhuel* , dans plusieurs pays septentrionaux de l'Europe ; *molüe* , *cabiliau* , *cabillau* , dans quelques contrées de France ; *cabillaud* , dans le même pays , et particulièrement dans les départemens les plus septentrionaux ; *kablag* , en Danemarck ; *ciblia* , en Suède.

ment, la poule pour sa table, le cormoran pour la pêche, l'aigrette pour sa parure, le serin pour ses plaisirs, l'abeille pour remplacer le jour; il a donné la morue au commerce maritime; et en répandant, par ce seul bienfait, une nouvelle vie sur un des grands objets de la pensée, du courage et d'une noble ambition, il a doublé les liens fraternels qui unissoient les différentes parties du globe.

Dans toutes les contrées de l'Europe, et dans presque toutes celles de l'Amérique, il est bien peu de personnes qui ne connoissent le nom de la morue, la bonté de son goût, la nature de ses muscles, et les qualités qui distinguent sa chair suivant les diverses opérations que ce gade a subies: mais combien d'hommes n'ont aucune idée précise de la forme extérieure, des organes intérieurs, des habitudes de cet animal fécond, ni des diverses précautions que l'on a imaginées pour le pêcher avec facilité! et parmi ceux qui s'occupent avec le plus d'assiduité d'étudier ou de

régler les rapports politiques des nations, d'augmenter leurs moyens de subsistance, d'accroître leur population, de multiplier leurs objets d'échange, de créer ou de ranimer leur marine; parmi ceux même qui ont consacré leur existence aux voyages de long cours, ou aux vastes spéculations commerciales, n'est-il pas plusieurs esprits élevés et très-instruits, aux yeux desquels cependant une histoire bien faite du gade morue dévoileroit des faits importans pour le sujet de leurs estimables méditations?

Aristote, Plin, ni aucun des anciens historiens de la Nature, n'ont connu le gade morue: mais les naturalistes récents, les voyageurs, les pêcheurs, les préparateurs, les marins, les commerçans, presque tous les habitans des rivages, et même de l'intérieur des terres de l'Europe, ainsi que de l'Amérique, particulièrement de l'Amérique et de l'Europe septentrionales, se sont occupés si fréquemment et sous tant de rapports de ce poisson; ils l'ont vu, si je puis employer cette expression, sous tant de faces

et sous tant de formes , qu'ils ont dû nécessairement donner à cet animal un très-grand nombre de dénominations différentes. Néanmoins sous ces divers noms, aussi-bien que sous les déguisemens que l'art a pu produire , et même sous les dissemblances plus ou moins variables et plus ou moins considérables que la Nature a créées dans les différens climats , il sera toujours aisé de distinguer la morue non seulement des autres jugulaires de la première division des osseux , mais encore de tous les autres gades , pour peu qu'on veuille rappeler les caractères que nous allons indiquer.

Comme tous les poissons de son genre , la morue a la tête comprimée ; les yeux , placés sur les côtés , sont très-peu rapprochés l'un de l'autre , très-gros , voilés par une membrane transparente ; et cette dernière conformation donne à l'animal la faculté de nager à la surface des mers septentrionales , au milieu des montagnes de glace , auprès des rivages couverts de neige congelée et resplendissante , sans être ébloui par la grande quantité de

lumière réfléchië sur ces plages boréales : mais hors de ces régions voisines du cercle polaire , la morue doit voir avec plus de difficulté que la plupart des poissons , dont les yeux ne sont pas ainsi recouverts par une pellicule diaphane ; et de là est venue l'expression d'*yeux de morue* dont on s'est servi pour désigner des yeux grands , à fleur de tête , et cependant mauvais.

Les mâchoires sont inégales en longueur : la supérieure est plus avancée que l'inférieure , au bout de laquelle on voit pendre un assez grand barbillon. Elles sont armées toutes les deux de plusieurs rangées de dents fortes et aiguës. La première rangée en présente de beaucoup plus longues que les autres ; et toutes ne sont pas articulées avec l'un des os maxillaires , de manière à ne se prêter à aucun mouvement. Plusieurs de ces dents sont au contraire très-mobiles , c'est-à-dire , peuvent être , comme celles des squales , couchées et relevées sous différens angles , à la volonté de l'animal , et lui donner ainsi des armes plus appropriées à la

nature , au volume et à la résistance de la proie qu'il cherche à dévorer.

La langue est large , arrondie par-devant , molle et lisse : mais on voit des dents petites et serrées au palais et auprès du gosier.

Les opercules des branchies sont composés chacun de trois pièces , et bordés d'une bande souple et non ciliée. Sept rayons soutiennent chaque membrane branchiale.

Le corps est alongé , légèrement comprimé , et revêtu d'écailles plus grandes que celles qui recouvrent presque tous les autres gades. La ligne latérale suit à peu près la courbure du dos jusque vers les deux tiers de la longueur totale du poisson.

On voit sur la morue trois grandes nageoires dorsales. Ce nombre de trois , dans les nageoires du dos , distingue les gades du premier et du second sous-genre , ainsi que l'indique le tableau qui est à la tête de cet article ; et il est d'autant plus remarquable , qu'excepté les espèces renfermées dans ces deux sous-genres ,

les eaux douces, aussi-bien que les eaux salées, doivent comprendre un très-petit nombre de poissons osseux ou cartilagineux dont les nageoires dorsales soient plus que doubles, et qu'on n'en trouve particulièrement aucun à trois nageoires dorsales parmi les habitans des mers ou des rivières que nous avons déjà décrits dans cet ouvrage.

Les poissons qui ont trois nageoires du dos, ont deux nageoires de l'anus placées, comme les dorsales, à la suite l'une de l'autre. La morue a donc deux nageoires anales comme tous les gades du premier et du second sous-genre; et on a pu voir sur le tableau de sa famille que le premier aiguillon de la première de ces deux nageoires est épineux et non articulé*.

* A la première nageoire du dos	15 rayons.
à la seconde.....	19
à la troisième.....	21
à chacune des nageoires pectorales	16
à chacune des jugulaires.....	6
à la première de l'anus.....	17
à la seconde.....	16
à la nageoire de la queue.....	30

Les nageoires jugulaires sont étroites et terminées en pointe, comme celles de presque tous les gades ; la caudale est un peu fourchue.

Les morues parviennent très-souvent à une grandeur assez considérable pour peser un myriagramme : mais ce n'est pas ce poids qui indique la dernière limite de leurs dimensions. Suivant le savant Pennant, on en a vu, auprès des côtes d'Angleterre, une qui pesoit près de quatre myriagrammes, et qui avoit plus de dix-huit décimètres de longueur, sur seize décimètres de circonférence, à l'endroit le plus gros du corps.

L'espèce que nous décrivons est d'ailleurs d'un gris cendré, tacheté de jaunâtre sur le dos. La partie inférieure du corps est blanche, et quelquefois rougeâtre, avec des taches couleur d'or dans les jeunes individus. Les nageoires pectorales sont jaunâtres ; une teinte grise distingue les jugulaires, ainsi que la seconde de l'anus. Toutes les autres nageoires présentent des taches jaunes.

C'est principalement en examinant avec

soin les organes intérieurs de la morue , que Camper , Monro , et d'autres habiles anatomistes , sont parvenus à jeter un grand jour sur la structure interne des poissons , et particulièrement sur celle de leurs sens. On peut voir , par exemple , dans Monro , une très-belle description de l'ouïe de la morue : mais nous nous sommes déjà assez occupés de l'organe auditif des poissons , pour devoir nous contenter d'ajouter à tout ce que nous avons dit , et relativement au gade morue , que le grand os auditif contenu dans un sac placé à côté des canaux appelés *demi-circulaires* , et le petit os renfermé dans la cavité qui réunit le canal supérieur au canal moyen , présentent un volume assez considérable , proportionnellement à celui de l'animal ; que c'est à ces deux os qu'il faut rapporter les petits corps que l'on trouve dans les cabinets d'histoire naturelle , sous le nom de *pierres de morue* ; qu'un troisième os que l'on a découvert aussi dans l'anguille et dans d'autres osseux dont nous traiterons avant de terminer cet ouvrage ,

est situé dans le creux qui sert de communication aux trois canaux demi-circulaires ; et que la grande cavité qui comprend ces mêmes canaux , est remplie d'une matière visqueuse , au milieu de laquelle sont dispersés de petits corps sphériques auxquels aboutissent des ramifications nerveuses.

De petits corps semblables sont attachés à la cervelle et aux principaux rameaux des nerfs.

Si de la considération de l'ouïe de la morue nous passons à celle de ses organes digestifs , nous trouverons qu'elle peut avaler dans un très-court espace de temps une assez grande quantité d'alimens : elle a en effet un estomac très-volumineux ; et l'on voit auprès du pylore six appendices ou petits canaux branchus. Elle est très-vorace ; elle se nourrit de poissons , de mollusques et de crabes. Elle a des sucs digestifs si puissans et d'une action si prompte , qu'en moins de six heures un petit poisson peut être digéré en entier dans son canal intestinal. De gros crabes y sont aussi bientôt ré-

duits en chyle ; et avant qu'ils ne soient amenés à l'état de bouillie épaisse , leur têt s'altère , rougit comme celui des écrevisses que l'on met dans de l'eau bouillante , et devient très-mou.

La morue est même si goulue , qu'elle avale souvent des morceaux de bois ou d'autres substances qui ne peuvent pas servir à sa nourriture : mais elle jouit de la faculté qu'ont reçue les squales , d'autres poissons destructeurs , et les oiseaux de proie ; elle peut rejeter facilement les corps qui l'incommodent.

L'eau douce ne paroît pas lui convenir ; on ne la voit jamais dans les fleuves ou les rivières : elle ne s'approche même des rivages , au moins ordinairement , que dans le temps du frai ; pendant le reste de l'année , elle se tient dans les profondeurs des mers , et par conséquent elle doit être placée parmi les véritables poissons pélagiens. Elle habite particulièrement dans la portion de l'Océan septentrional comprise entre le quarantième degré de latitude et le soixante-sixième : plus au nord ou plus au sud , elle perd

de ses qualités ; et voilà pourquoi apparemment elle ne doit pas être comptée parmi les poissons de la Méditerranée ou des autres mers intérieures , dont l'entrée , plus rapprochée de l'équateur que le quarantième degré , est située hors des plages qu'elle fréquente.

On la pêche dans la Manche , et on la prend auprès des côtes du Kamtschatka , vers le soixantième degré : mais dans la vaste étendue de l'Océan boréal qu'occupe cette espèce , on peut distinguer deux grands espaces qu'elle semble préférer. Le premier de ces espaces remarquables peut être conçu comme limité d'un côté par le Groenland et par l'Islande de l'autre ; par la Norvège , les côtes du Danemarck , de l'Allemagne , de la Hollande , de l'est et du nord de la Grande-Bretagne , ainsi que des îles Orcades ; il comprend les endroits désignés par les noms de *Dogger-bank*, *Well-bank* , et *Cromer* ; et on peut y rapporter les petits lacs d'eau salée des îles de l'ouest de l'Écosse , où des troupes considérables de grandes morues attirent prin-

cipalement vers Gareloch , les pêcheurs des Orcades , de Peterhead , de Portsoy , de Firth et de Murray.

Le second espace , moins anciennement connu , mais plus célèbre parmi les marins , renferme les plages voisines de la nouvelle Angleterre , du cap Breton , de la nouvelle Écosse , et sur-tout de l'île de Terre-Neuve , auprès de laquelle est ce fameux banc de sable désigné par le nom de *Grand Banc* , qui a près de cinquante myriamètres de longueur sur trente ou environ de largeur , au-dessus duquel on trouve depuis vingt jusqu'à cent mètres d'eau , et près duquel les morues forment des légions très-nombreuses , parce qu'elles y rençoignent en très-grande abondance les harengs et les autres animaux marins dont elles aiment à se nourrir.

Lorsque , dans ces deux immenses portions de mer , le besoin de se débarrasser de la laite ou des œufs , ou la nécessité de pourvoir à leur subsistance , chassent les morues vers les côtes , c'est principalement près des rives et des bancs couverts de crabes ou de moules qu'elles se ras

semblent ; et elles déposent souvent leurs œufs sur des fonds rudes au milieu des rochers.

Ce temps du frai qui entraîne les morues vers les rivages , est très - variable , suivant les contrées qu'elles habitent , et l'époque à laquelle le printemps ou l'été commence à régner dans ces mêmes contrées. Communément c'est vers le mois de pluviose que ce frai a lieu auprès de la Norvège , du Danemarck , de l'Angleterre , de l'Ecosse , etc. : mais comme l'île de Terre-Neuve appartient à l'Amérique septentrionale , et par conséquent à un continent beaucoup plus froid que l'ancien , l'époque de la ponte et de la fécondation des œufs y est reculée jusqu'en germinal.

Il est évident , d'après tout ce que nous venons de dire , que cette époque du frai est celle que l'on a dû choisir pour celle de la pêche. Il y a donc eu diversité de temps pour cette grande opération de la recherche des morues , selon le lieu où on a désiré de les prendre ; et de plus , il y a eu différence dans les moyens de parvenir à les saisir , suivant les nations qui se sont

occupées de leur poursuite : mais depuis plusieurs siècles les peuples industriels et marins de l'Europe ont senti l'importance de la pêche des morues , et s'y sont livrés avec ardeur. Dès le quatorzième siècle , les Anglois et les habitans d'Amsterdam ont entrepris cette pêche , pour laquelle les Islandois , les Norvégiens , les François et les Espagnols ont rivalisé avec eux plus ou moins heureusement ; et vers le commencement du seizième , les François ont envoyé sur le grand banc de Terre-Neuve les premiers vaisseaux destinés à en rapporter des morues. Puisse cet exemple mémorable n'être pas perdu pour les descendans de ces François ! et lorsque la grande nation verra luire le jour fortuné où l'olivier de la paix balancera sa tête sacrée , au milieu des lauriers de la victoire et des palmes éclatantes du génie , au-dessus des innombrables monumens élevés à sa gloire , qu'elle n'oublie pas que son zèle éclairé pour les entreprises relatives aux pêches importantes , sera toujours suivi de l'accroissement le plus rapide de ses subsistances , de son

commerce , de son industrie , de sa population , de sa marine , de sa puissance , de son bonheur !

Dans la première des deux grandes surfaces où l'on rencontre des troupes très-nombreuses de morues , et par conséquent dans celle où l'on s'est livré plus anciennement à leur recherche , on n'a pas toujours employé les moyens les plus propres à atteindre le but que l'on auroit dû se proposer. Il a été un temps , par exemple , où sur les côtes de Norvège on s'étoit servi de filets composés de manière à détruire une si grande quantité de jeunes morues , et à dépeupler si vîte les plages qu'elles avoient affectionnées , que , par une suite de ce sacrifice mal entendu de l'avenir au présent , un bateau monté de quatre hommes ne rapportoit plus que six ou sept cents de ces poissons , de tel endroit où il en auroit pris, quelques années auparavant , près de six mille.

Mais rien n'a été négligé pour les pêches faites dans les dix-septième et dix-huitième siècles , aux environs de l'île de Terre-Neuve.

Premièrement, on a recherché avec le plus grand soin les temps les plus favorables; c'est d'après les résultats des observations faites à ce sujet, que, vers ces parages, il est très-rare qu'on continue la poursuite des morues après le mois de prairial, époque à laquelle les gades dont nous écrivons l'histoire, s'éloignent à de grandes distances de ces plages, pour chercher une nourriture plus abondante, ou éviter la dent meurtrière des squales et d'autres habitans des mers redoutables par leur férocité. Les morues reparoissent auprès des côtes dans le mois de vendémiaire, ou aux environs de ce mois: mais dans cette saison, qui touche d'un côté à l'équinoxe de l'automne, et de l'autre aux frimas de l'hiver, et d'ailleurs auprès de l'Amérique septentrionale, où les froids sont plus rigoureux et se font sentir plutôt que sous le même degré de la partie boréale de l'ancien continent, les tempêtes et même les glaces peuvent rendre très-souvent la pêche trop incertaine et trop dangereuse, pour qu'on se détermine à s'y livrer de nouveau, sans attendre le printemps suivant.

En second lieu , les préparatifs de cette importante et lointaine recherche des morues qui se montrent auprès de Terre-Neuve, ont été faits, depuis un très grand nombre d'années , avec une prévoyance très-attentive. C'est dans ces opérations préliminaires qu'on a suivi avec une exactitude remarquable le principe de diviser le travail pour le rendre plus prompt et plus voisin de la perfection que l'on desire ; et ce sont les Anglois qui ont donné à cet égard l'exemple à l'Europe commerçante.

La force des cordes ou lignes , la nature des hameçons , les dimensions des bâtimens , tous ces objets ont été déterminés avec précision. Les lignes ont eu depuis un jusqu'à deux centimètres , ou à peu près , de circonférence , et quelquefois cent quarante-cinq mètres de longueur : elles ont été faites d'un très-bon chanvre , et composées de fils très-fins , et cependant très-forts , afin que les morues ne fussent pas trop effrayées , et que les pêcheurs pussent sentir aisément l'agitation du poisson pris , relever avec facilité

les cordes et les retirer sans les rompre.

Le bout de ces lignes a été garni d'un plomb qui a eu la forme d'une poire ou d'un cylindre , a pesé deux ou trois kilogrammes selon la grosseur de ces cordes , et a soutenu une empile longue de quatre à cinq mètres *. Communément les vaisseaux employés pour la pêche des morues ont été de cent cinquante tonneaux au plus , et de trente hommes d'équipage. On a emporté des vivres pour deux , trois et jusqu'à huit mois , selon la longueur du temps que l'on a cru devoir consacrer au voyage. On n'a pas manqué de se pourvoir de bois pour aider le desséchement des morues , de sel pour les conserver , de tonnes et de petits barils pour y renfermer les différentes parties de ces animaux déjà préparées.

Des bateaux particuliers ont été destinés à aller pêcher , même au loin , les mollusques et les poissons propres à faire

* Nous avons vu , dans l'article de *la raie bouclée* , que l'empile est un fil de chanvre , de crin , ou de métal , auquel le *haim* ou *hameçon* est attaché.

des appâts, tels que des sépies, des harengs, des éperlans, des trigles, des maquereaux, des capelans, etc.

On se sert de ces poissons quelquefois lorsqu'ils sont salés, d'autres fois lorsqu'ils n'ont pas été imprégnés de sel. On en emploie souvent avec avantage de digérés à demi. On remplace avec succès ces poissons corrompus par des fragmens d'écrevisses ou d'autres crabes, du lard et de la viande gâtée. Les morues sont même si imprudemment goulues, qu'on les trompe aussi en ne leur présentant que du plomb ou de l'étain façonné en poisson, et des morceaux de drap rouge semblables par la couleur à de la chair ensanglantée; et si l'on a besoin d'avoir recours aux appâts les plus puissans, on attache aux hameçons le cœur de quelque oiseau d'eau, ou même une jeune morue encore saignante; car la voracité des gades que nous décrivons est telle, que, dans les momens où la faim les aiguillonne, ils ne sont retenus que par une force supérieure à la leur, et n'épargnent pas leur propre espèce.

Lorsque les précautions convenables n'ont pas été oubliées, que l'on n'est contrarié ni par de gros temps ni par des circonstances extraordinaires, et qu'on a bien choisi le rivage ou le banc, quatre hommes suffisent pour prendre par jour cinq ou six cents morues.

L'usage le plus généralement suivi sur le grand banc, est que chaque pêcheur établi dans un baril dont les bords sont garnis d'un bourlet de paille, laisse plus ou moins filer sa ligne, en raison de la profondeur de l'eau, de la force du courant, de la vitesse de la dérive, et fasse suivre à cette corde les mouvemens du vaisseau, en la traînant sur le fond contre lequel elle est retenue par le poids de plomb dont elle est lestée. Néanmoins d'autres marins halent ou retirent de temps en temps leur ligne de quelques mètres, et la laissent ensuite retomber tout-à-coup, pour empêcher les morues de flairer les appâts et de les éviter, et pour leur faire plus d'illusion par les divers tournoiemens de ces mêmes appâts, qui dès-lors ont plus de rapports avec leur proie ordinaire.

Les morues devant être consommées à des distances immenses du lieu où on les pêche , on a été obligé d'employer divers moyens propres à garantir de toute altération leur chair et plusieurs autres de leurs parties. Ces moyens se réduisent à les faire saler ou sécher. Ces opérations sont souvent exécutées par les pêcheurs , sur les vaisseaux qui les ont amenés ; et on imagine bien , sur-tout d'après ce que nous avons déjà dit , qu'afin de ne rien perdre de la durée ni des objets du voyage, on a établi sur ces bâtimens le plus grand ordre dans la disposition du local , dans la succession des procédés , et dans la distribution des travaux entre plusieurs personnes dont chacune n'est jamais chargée que des mêmes détails.

Les mêmes arrangemens ont lieu sur la côte, mais avec de bien plus grands avantages , lorsque les marins occupés de la pêche des morues ont à terre , comme les Anglois , des établissemens plus ou moins commodes, et dans lesquels on est garanti des effets nuisibles que peuvent produire les vicissitudes de l'atmosphère.

Mais soit à terre , soit sur les vaisseaux , on commence ordinairement toutes les préparations de la morue par détacher la langue et couper la tête de l'animal. Lorsqu'ensuite on veut saler ce gade , on l'ouvre dans sa partie inférieure ; on met à part le foie ; et si c'est une femelle qu'on a prise , on ôte les œufs de l'intérieur du poisson : on *habille* ensuite la morue , c'est-à-dire , en termes de pêcheur , on achève de l'ouvrir depuis la gorge jusqu'à l'anus , que les marins nomment *nombril* , et on sépare des muscles , dans cette étendue , la colonne vertébrale , ce qu'on nomme *désosser* la morue.

Pour mettre les gades dont nous nous occupons , dans leur premier sel , on remplit , le plus qu'on peut , l'intérieur de leur corps de sel marin , ou muriate de soude ; on en frotte leur peau ; on les range par lits dans un endroit particulier de l'établissement construit à terre , ou de l'entre-pont ou encore de la cale du bâtiment , si elles sont préparées sur un vaisseau , et on place une couche de sel au-dessus de chaque lit. Les morues restent

ainsi en piles pendant un, deux ou plusieurs jours, et quelquefois aussi entassées sur une sorte de gril, jusqu'à ce qu'elles aient jeté leur sang et leur eau; puis on les change de place, et on les sale à demeure, en les arrangeant une seconde fois par lits, entre lesquels on étend de nouvelles couches de sel.

Lorsqu'en habillant les morues, on se contente de les ouvrir depuis la gorge jusqu'à l'anus, ainsi que nous venons de le dire, elles conservent une forme arrondie du côté de la queue, et on les nomme *morues rondes*: mais le plus grand nombre des marins occupés de la pêche de Terre-Neuve remplacent cette opération par la suivante, sur-tout lorsqu'ils salent de grands individus. Ils ouvrent la morue dans toute sa longueur, enlèvent la colonne vertébrale toute entière¹, habillent le poisson à plat; et la morue ainsi habillée se nomme *morue plate*.

Si au lieu de saler les gades morues, on veut les faire sécher, on emploie tous les procédés que nous avons exposés, jusqu'à celui par lequel elles reçoivent leur pre-

mier sel. On les lave alors , et on les étend une à une sur la grève ou sur des rochers *, la chair en haut, de manière qu'elles ne se touchent pas ; quelques heures après on les retourne. On recommence ces opérations pendant plusieurs jours , avec cette différence, qu'au lieu d'arranger les morues une à une , on les met par piles, dont on accroit successivement la hauteur, de telle sorte que, le sixième jour , ces paquets sont de cent cinquante , ou deux cents, et même quelquefois de cinq cents myriagrammes. On empile de nouveau les morues à plusieurs reprises , mais à des intervalles de temps beaucoup plus grands , et qui croissent successivement ; et le nombre ainsi que la durée de ces reprises sont proportionnés à la nature du vent , à la sécheresse de l'air , à la chaleur de l'atmosphère , à la force du soleil.

Le plus souvent , avant chacune de ces reprises , on étend les morues une à une,

* Le nom allemand de *klipfisch* (poisson de rocher), que l'on donne aux morues sèches, vient de la nature du terrain sur lequel elles sont souvent desséchées.

et pendant quelques heures. On désigne les divers empilemens , en disant que les morues sont à *leur premier*, à *leur second*, à *leur troisième soleil*, suivant qu'on les met en tas pour la première, la seconde ou la troisième fois ; et communément les morues reçoivent dix soleils , avant d'être entièrement séchées.

Lorsque l'on craint la pluie , on les porte sur des tas de pierre placés dans des cabanes , ou , pour mieux dire, sous des hangars qui n'arrêtent point l'action des courans d'air.

Quelques peuples du nord de l'Europe emploient, pour préparer ces poissons , quelques procédés , dont un des plus connus consiste à dessécher ces gades sans sel, en les suspendant au-dessus d'un fourneau , ou en les exposant aux vents qui règnent dans leurs contrées pendant le printemps. Les morues acquièrent par cette opération une dureté égale à celle du bois, d'où leur est venu le nom de *stock-fish* (poisson en bâton) ; dénomination qui , selon quelques auteurs , dérive aussi de l'usage où l'on est , avant

d'apprêter du *stock-fish* pour le manger, de le rendre plus tendre en le battant sur un billot.

Les commerçans appellent , dans plusieurs pays , *morue blanche* , celle qui a été salée , mais séchée promptement , et sur laquelle le sel a laissé une sorte de croûte blanchâtre. La *morue noire* , *pinnée* ou *brumée* , est celle qui , par un desséchement plus lent , a éprouvé un commencement de décomposition , de telle sorte qu'une partie de sa graisse , se portant à la surface , et s'y combinant avec le sel , y a produit une espèce de poussière grise ou brune , répandue par taches.

On donne aussi le nom de *morue verte* à la morue salée , de *merluche* à la morue sèche , et de *cabillaud* à la morue préparée et arrangée dans des barils du poids de dix à quinze myriagrammes , et dont une douzaine s'appelle un *leth* , dans plusieurs ports septentrionaux d'Europe.

Mais d'ailleurs un grand nombre de placés de commerce ont eu , ou ont encore , différentes manières de désigner les morues distribuées en assortimens ,

d'après les divers degrés de leurs dimensions ou de leur bonté. A Nantes , par exemple , on appeloit *grandes morues* , les morues salées qui étoient assez longues pour que cent de ces poissons pesassent quarante - cinq myriagrammes ; *morues moyennes* , celles dont le cent ne pesoit que trente myriagrammes ; *raguets* , ou *petites morues* , celles de l'assortiment suivant ; et *rebuts* , *lingues* , ou *très-petites morues* , celles d'un assortiment plus inférieur encore.

Sur quelques côtes de la Manche , le nom de *morue gaffe* indiquoit les très-grandes morues ; cinq autres assortimens inférieurs étoient indiqués par les dénominations de *morue marchande* , de *morue trie* , de *raguet* ou *lingue* , de *morue valide* ou *patelet* , et de *morue viciée* , appellation qui appartenoit en effet à la plus mauvaise qualité.

Dans ce même port de Nantes dont nous venons de parler , les morues sèches étoient divisées en sept assortimens , dont les noms étoient , suivant l'ordre de la supériorité de uns sur les autres , *morue pivée* , *morue*

grise , grand marchand , moyen marchand , petit marchand ou fourillon , grand rebut et petit rebut.

A Bordeaux , à Bayonne , et dans plusieurs ports de l'Espagne occidentale , on ne distinguoit que trois assortimens de morue , le *marchand* , le *moyen* et le *rebut*.

Au reste , les muscles des morues ne sont pas les seules portions de ces poissons dont on fasse un grand usage ; il n'est presque aucune de leurs parties qui ne puisse servir à la nourriture de l'homme ou des animaux.

Leur langue fraîche et même salée est un morceau délicat ; et voilà pourquoi on la coupe avec soin , dès le commencement de la préparation de ces poissons.

Les branchies de la morue peuvent être employées avec avantage comme appât , dans la pêche que l'on fait de ce gade.

Son foie peut être mangé avec plaisir : mais d'ailleurs il est très-grand relativement au volume de l'animal , comme celui de presque tous les poissons ; et on en retire une huile plus utile dans beau-

coup de circonstances que celle des baleines , laquelle cependant est très-recherchée dans le commerce. Elle conserve bien plus long - temps que ce dernier fluide , la souplesse des cuirs qui en ont été pénétrés ; et lorsqu'elle a été clarifiée , elle répand , en brûlant , une bien moindre quantité de vapeurs.

On obtient avec la vessie natatoire de la morue une colle qui ne le cède guère à celle de l'acipensère huso , que l'on fait venir de Russie dans un si grand nombre de contrées d'Europe *. Pour la réduire ainsi en colle , on la prépare à peu près de la même manière que celle du huso ; on la détache avec attention de la colonne vertébrale , on en sépare toutes les parties étrangères , on en ôte la première peau , on la met dans de l'eau de chaux pour achever de la dégraisser , on la lave , on la ramollit , on la pétrit , on la façonne , on la fait sécher avec soin ; on suit enfin tous les procédés que nous avons indiqués dans l'histoire du huso : et si des circons-

* Voyez , dans cette Histoire , l'article de l'*acipensère huso*.

tances de temps et de lieu ne permettent pas aux pêcheurs, comme, par exemple, à ceux de Terre-Neuve, de s'occuper de tous ces détails immédiatement après la prise de la morue, on mange la vessie natatoire, dont le goût n'est pas désagréable, ou bien on la sale; on la transporte ainsi imprégnée de muriate de soude à des distances plus ou moins grandes; on la conserve plus ou moins long-temps; et lorsqu'on veut en faire usage, il suffit presque toujours de la faire dessaler et ramollir, pour la rendre susceptible de se prêter aux mêmes opérations que lorsqu'elle est fraîche.

La tête des morues nourrit les pêcheurs de ces gades et leurs familles. En Norvège, on la donne aux vaches; et on y a éprouvé que mêlée avec des plantes marines, elle augmente la quantité du lait de ces animaux, et doit être préférée, pour leur aliment, à la paille et au foin.

Les vertèbres, les côtes et les autres os ou arêtes des gades morues, ne sont pas non plus inutiles: ils servent à nourrir le bétail des Islandois. On en donne à ces

chiens de Kamtschatka que l'on attelle aux traîneaux destinés à glisser sur la glace, dans cette partie septentrionale de l'Asie ; et dans d'autres contrées boréales, ils sont assez imprégnés de substance huileuse pour être employés à faire du feu, sur-tout lorsqu'ils ont été séchés au point convenable.

On ne néglige même pas les intestins de la morue, que l'on a nommés dans plusieurs endroits, *noues*, ou *nos* ; et enfin on prépare avec soin, et on conserve pour la table, les œufs de ce gade, auxquels on a donné la dénomination de *rogues* ou de *raves*.

Tels sont les procédés et les fruits de ces pêches importantes et fameuses, qui ont employé dans la même année jusqu'à vingt mille matelots d'une seule nation*.

On aura remarqué sans-doute que nous n'avons parlé que des pêcheries établies dans l'hémisphère boréal, soit auprès des côtes de l'ancien continent, soit auprès de celles du nouveau. A mesure que l'on

* La nation angloise.

connoîtra mieux la nature des rivages des îles ou des continens particuliers de l'hémisphère austral , et particulièrement de ceux de l'Amérique méridionale , tant du côté de l'orient que du côté de l'occident , il est à présumer que l'on découvrira des plages où la température de la mer , la profondeur des eaux , la nature du fond , l'abondance des petits poissons , l'absence d'animaux dangereux , et la rareté de tempêtes très-violentes et de très-grands bouleversemens de l'Océan , ont appelé , nourrissent et multiplient l'espèce de la morue , que certains peuples pourroient aller y pêcher avec moins de peine et plus de succès que sur les rives boréales de l'hémisphère arctique.

De nouveaux pays profiteroient ainsi d'un des plus grands bienfaits de la Nature ; et l'espèce de la morue , qui alimente une si grande quantité d'hommes et d'animaux en Islande , en Norvège , en Suède , en Russie , et dans d'autres régions asiatiques ou européennes , pourroit d'autant plus suffire aussi aux besoins des habitans des rives antarctiques, qu'elle

est très-remarquable par sa fécondité. L'on est étonné du nombre prodigieux d'œufs que portent les poissons femelles ; aucune de ces femelles n'a cependant été favorisée à cet égard comme celle de la morue. Ascagne parle d'un individu de cette dernière espèce , qui avoit treize décimètres de longueur et pesoit vingt-cinq kilogrammes ; l'ovaire de ce gade en pesoit sept , et renfermoit neuf millions d'œufs. On en a compté neuf millions trois cent quarante-quatre mille dans une autre morue. Quelle immense quantité de moyens de reproduction ! Si le plus grand nombre de ces œufs n'étoient ni privés de la laite fécondante du mâle , ni détruits par divers accidens , ni dévorés par différens animaux , on voit aisément combien peu d'années il faudroit pour que l'espèce de la morue eût , pour ainsi dire , comblé le vaste bassin des mers.

Quelqu'agréables au goût que l'on puisse rendre les diverses préparations de la morue séchée ou de la morue salée , on a toujours préféré , avec raison , de la manger fraîche. Pour jouir de ce dernier

avantage sur plusieurs côtes de l'Europe , et particulièrement sur celles d'Angleterre et de France , on ne s'est pas contenté d'y pêcher les morues que l'on y voit de temps en temps ; mais afin d'être plus sûr d'en avoir de plus grandes à sa disposition , on est parvenu à y apporter en vie un assez grand nombre de celles que l'on avoit prises sur les bancs de Terre-Neuve : on les a placées , pour cet objet , dans de grands vases fermés , mais attachés aux vaisseaux , plongés dans la mer , et percés de manière que l'eau salée pût aisément parvenir dans leur intérieur. Des pêcheurs anglois ont ajouté à cette précaution un procédé dont nous avons déjà parlé dans notre premier Discours : ils ont adroitement fait parvenir une aiguille jusqu'à la vessie natatoire de la morue , et l'ont percée , afin que l'animal , ne pouvant plus se servir de ce moyen d'ascension , demeurât plus longtemps au fond du vase , et fût moins exposé aux divers accidens funestes à la vie des poissons.

Au reste , il est convenable d'observer

ici que, dans quelques gades, Monro n'a pas pu trouver la communication de la vessie natatoire avec l'estomac ou quelque autre partie du canal intestinal, mais qu'il a vu autour de cette vessie un organe rougeâtre composé d'un très-grand nombre de membranes pliées et extensibles, et qu'il le croit propre à la sécrétion de l'air ou des gaz de la vessie; sécrétion qui auroit beaucoup de rapports, selon ce célèbre naturaliste anglois, avec celle qui a lieu pour les vésicules à gaz ou aériennes des œufs d'oiseau, et des plantes aquatiques. Cet organe rougeâtre ne pourroit-il pas être au contraire destiné à recevoir et transmettre, par les diverses ramifications du système artériel et veineux que sa couleur seule indiqueroit, une portion des gaz de la vessie natatoire, dans les différentes parties du corps de l'animal? ce qui réuni aux résultats d'observations très-voisines de celles de Monro, faites sur d'autres poissons que des gades, et que nous rapporterons dans la suite, confirmeroit l'opinion du citoyen Fischer, bibliothécaire de Mayence, sur

les usages de la vessie natatoire , qu'il considère comme étant , dans plusieurs circonstances , un supplément des branchies , et un organe auxiliaire de respiration*.

On trouve dans les environs de l'île de Man , entre l'Angleterre et l'Irlande , un gade que l'on y nomme *red cod* ou *rock-cod* (morue rouge et morue de roche). Nous pensons avec le citoyen Noël de Rouen , qui nous a écrit au sujet de ce poisson , que ce gade n'est qu'une variété de la morue grise ou ordinaire que nous venons de décrire ; mais nous croyons devoir insérer dans l'article que nous allons terminer , l'extrait suivant de la lettre du citoyen Noël.

« J'ai lu , dit cet observateur , dans
« un ouvrage sur l'île de Man , que la cou-
« leur de la peau du *red cod* est d'un rouge
« de vermillon. Quelques habitans de l'île
« de Man pensent que cette morue acquiert
« cette couleur brillante , parce qu'elle se
« nourrit de jeunes écrevisses de mer :

* Nous avons déjà parlé de cette opinion du citoyen Fischer.

« mais les écrevisses de mer sont , dans
« l'eau , d'une couleur noirâtre ; elles ne
« deviennent rouges qu'après avoir été
« cuites. La morue rouge n'est qu'une
« variété de l'espèce commune : je suis
« disposé à croire que la couleur rouge
« qui la distingue , lui est communiquée
« par les algues et les mousses marines
« qui couvrent les rochers sur lesquels on
« la pêche , puisque ces mousses sont de
« couleur rouge ; je le crois d'autant plus
« volontiers , que les baies de l'île de Man
« ont aussi une variété de *mules* et de
« *gourneaux* dont la couleur est rouge.....
« Cette morue rouge est très-estimée pour
« l'usage de la table. »

LE GADE ÆGLEFIN *.

CE gade a beaucoup de rapports avec la morue ; sa chair s'enlève facilement par feuillets , ainsi que celle de ce dernier animal , et de presque tous les autres poissons du même genre. On le trouve , comme la morue , dans l'Océan septentrional ; mais il ne parvient communément qu'à la longueur de quatre ou cinq décimètres. Il voyage par grandes troupes qui couvrent quelquefois un espace de plusieurs myriares quarrés. Et ce qu'il ne faut pas négliger de faire observer , on assure qu'il ne va jamais dans la Baltique , et que par conséquent il ne passe point par le *Sund*. On ne peut pas dire cependant qu'il redoute le voisinage des

* *Kallior*, *kallie*, *kaljor*, *kolliä*, en Suède ; *koll*, en Danemarck ; *haddock*, en Angleterre ; *églefins*, *égrefin*, par quelques auteurs françois.

terres ; car , chaque année , il s'approche , vers les mois de pluviose et ventose , des rivages septentrionaux de l'Europe pour la ponte ou la fécondation de ses œufs. S'il survient de grandes tempêtes pendant son séjour auprès des côtes , il s'éloigne de la surface des eaux , et cherche dans le sable du fond de la mer , ou au milieu des plantes marines qui tapissent ce sable , un asyle contre les violentes agitations des flots. Lorsque les ondes sont calmées , il sort de sa retraite sous-marine , et reparôit encore tout couvert ou d'algues ou de limon.

Un assez grand nombre d'æglefins restent même auprès des terres pendant l'hiver , ou s'avancent , pendant cette saison , vers les rivages , auprès desquels ils trouvent plus aisément que dans les grandes eaux , la nourriture qui leur convient. Le citoyen Noël m'écrit que depuis 1766 les pêcheurs anglois des côtes d'York ont été frappés de l'exactitude avec laquelle ces gades se sont montrés dans les eaux côtières , vers le 20 frimaire (10 décembre). L'étendue du banc qu'ils forment alors , est d'en-

viron trois *milles* en largeur, à compter de la côte, et de quatre-vingts *milles* en longueur, depuis *Flamborough-head* jusqu'à l'embouchure de la *Fine*, au-dessous de *Newcastle*. L'espace marin occupé par ces poissons est si bien connu des pêcheurs, qu'ils ne jettent leurs lignes que dans ce même espace, hors de la circonférence duquel ils ne trouveroient pas d'æglefin, et ne pêcheroient le plus souvent, à la place, que des squales attirés par cet immense banc de gades, dont ces cartilagineux sont très-avides.

Lorsque la surface de la mer est gelée auprès des rivages, les pêcheurs profitent des fentes ou crevasses que la glace peut présenter dans un nombre d'endroits plus ou moins considérable de la croûte solide de l'Océan, pour prendre facilement une plus grande quantité de ces poissons. Ces gades ont, en effet, l'habitude de se rassembler dans les intervalles qui séparent les différentes portions de glaces, non pas, comme on l'a cru, pour y respirer l'air très-froid de l'atmosphère, mais pour se trouver dans la couche d'eau

la plus élevée, par conséquent dans la plus tempérée, et dans celle où doivent se réunir plusieurs des petits animaux dont ils aiment à se nourrir.

Si les pêcheur de ces côtes voisines du cercle polaire ne rencontrent pas à leur portée, des fentes naturelles et suffisantes dans la surface de l'Océan durcie par le froid, ils cassent la glace, et produisent, dans l'enveloppe qu'elle forme, les anfractuosités qui leur conviennent.

C'est aussi autour de ces vides naturels ou artificiels qu'on voit des phoques chercher à dévorer des æglefins pendant la saison rigoureuse.

Mais ces gades peuvent être la proie de beaucoup d'autres ennemis. Les grandes morues les poursuivent; et suivant Anderson, la pêche des æglefins, que l'on fait auprès de l'embouchure de l'Elbe, a donné le moyen d'observer, d'une manière très-particulière, combien la morue est vorace, et avec quelle promptitude elle digère ses alimens. Dans ces parages, les pêcheurs d'æglefins laissent leurs hameçons sous l'eau pendant une marée, c'est-

à-dire , pendant six heures. Si un æglefin est pris dès le commencement de ces six heures , et qu'une morue se jette ensuite sur ce poisson , on trouve en retirant la ligne , au changement de la marée , que l'æglefin est déjà digéré : la morue est à la place de ce gade , arrêtée par l'hameçon ; et ce fait mérite d'autant plus quelque attention , qu'il paroît prouver que c'est particulièrement dans l'estomac et dans les sucs gastriques qui arrosent ce viscère , que réside cette grande faculté si souvent remarquée dans les morues , de décomposer avec rapidité les substances alimentaires. Si , au contraire , la morue n'a cherché à dévorer l'æglefin que peu de temps avant l'expiration des six heures , elle s'opiniâtre tellement à ne pas s'en séparer , qu'elle se laisse enlever en l'air avec sa proie.

L'æglefin , quoique petit , est aussi goulu et aussi destructeur que la morue , au moins à proportion de ses forces. Il se nourrit non seulement de serpules , de mollusques , de crabes , mais encore de poissons plus foibles que lui , et particu-

lièrement de harengs. Les pêcheurs anglois nomment *haddock - meat*, c'est-à-dire, *mets de haddock* ou *æglefin*, les vers qui, pendant l'hiver, lui servent d'aliment, sur-tout lorsqu'il ne rencontre ni harengs, ni œufs de poisson.

Il a cependant l'ouverture de la bouche un peu plus petite que celle des animaux de son genre; un barbillon pend à l'extrémité de sa mâchoire inférieure, qui est plus courte que celle de dessus. Ses yeux sont grands, ses écailles petites, arrondies, plus fortement attachées que celles de la morue. La première nageoire du dos est triangulaire: elle est d'ailleurs bleuâtre, ainsi que les autres nageoires*; la ligne latérale voisine du dos est noire,

- * A la première nageoire dorsale. 16 rayons.
à la seconde..... 20
à la troisième..... 19
à chacune des pectorales..... 19
à chacune des jugulaires..... 6
à la première de l'anus..... 22
à la seconde..... 21
à celle de la queue, qui est four-
chue..... 27

ou tachetée de noir ; l'iris a l'éclat de l'argent ; et cette même couleur blanchâtre ou argentée règne sur le corps et sur la queue , excepté leur partie supérieure , qui est plus ou moins brunâtre.

La qualité de la chair des æglefins varie suivant les parages où on les trouve , leur âge , leur sexe , et les époques de l'année où on les pêche : mais on en a vu assez fréquemment dont la chair étoit blanche , ferme , très-agréable au goût , et très-facile à faire cuire. En floréal , et dans les mois suivans , celle des æglefins de moyenne grandeur est quelquefois d'autant plus délicate , que le frai de ces gades a lieu en hiver , et que par conséquent ils ont eu le temps de réparer leurs forces , de recouvrer leur santé , et de reprendre leur graisse.

L E G A D E B I B ¹.

DE même que l'æglefin , le gade bib habite dans l'Océan d'Europe. Sa longueur ordinaire est de trois ou quatre décimètres. L'ouverture de sa bouche est petite, sa mâchoire inférieure garnie d'un barbillon, son anus plus rapproché de la tête que de l'extrémité de la queue, sa seconde nageoire dorsale très-longue, et le premier rayon de chacune des nageoires jugulaires, terminé par un filament ². Ses écailles sont très-adhérentes à la peau, et

¹ *Bib* et *blinds*, sur les côtes d'Angleterre.

² A la première nageoire dorsale.. 13 rayons.
à la seconde..... 23
à la troisième..... 10
à chacune des pectorales..... 11
à chacune des jugulaires..... 6
à la première de l'anüs..... 31
à la seconde..... 18
à celle de la queue, qui est four-
chue..... 17.

plus grandes à proportion de son volume que celles même de la morue. Sa partie supérieure est jaunâtre ou couleur d'olive, et sa partie inférieure argentée. Sa chair est exquise.

Ses yeux sont voilés par une membrane, comme ceux des autres gades ; on a même cru que le bib pouvoit , à volonté , enfler cette pellicule diaphane , et former ainsi une sorte de poche au-dessus de chacun ou d'un seul de ses organes de la vue. N'auroit-on pas pris les suites de quelque accident pour l'effet régulier d'une faculté particulière attribuée à l'animal ? Quoi qu'il en soit , c'est de cette propriété vraie ou fausse que viennent le nom de *borgne* et celui d'*aveugle* , donnés au gade dont nous parlons.

LE GADE SAIDA,

ET

LE GADE BLENNIOIDE.

Ces deux gades ont la nageoire de la queue fourchue. Le premier a été découvert par le savant Lepechin, et le second par le célèbre Pallas.

Le saida a les deux mâchoires armées de dents aiguës et crochues; deux rangées de dents garnissent le palais, et l'on voit auprès du gosier deux os lenticulaires hérissés de petites dents. La mâchoire inférieure est plus avancée que la supérieure, tandis que, dans la morue, l'æglefin et le bib, celle de dessus est plus longue que celle de dessous. Chaque opercule branchial présente trois lames, l'une triangulaire et garnie de deux aiguillons, l'autre elliptique, et la dernière figurée en croissant. La ligne latérale est droite

et voisine du dos. Les nageoires dorsales et celles de l'anus sont triangulaires *. Le quatrième rayon de la troisième dorsale, le cinquième de la première de l'anus, et le second des jugulaires, sont terminés par un long filament.

Une couleur obscure règne sur la partie supérieure de l'animal, qui d'ailleurs est parsemée de points noirâtres distribués irrégulièrement. Des points de la même nuance relèvent l'éclat argentin des opercules; les côtés du poisson sont bleuâtres, Sa partie inférieure est blanche; et le sommet de sa tête, très-noir.

Le saida ne dépasse guère en longueur deux ou trois décimètres. Sa chair est peu succulente, mais cependant très-fréquent-

* A la première nageoire du dos

du saida, de.....	10 à 11 ray.
à la seconde, de.....	16 à 17
à la troisième.....	20
à chacune des pectorales.....	16
à chacune des jugulaires.....	6
à la première nageoire de l'anus	18
à la seconde.....	20
à celle de la queue, de.....	24 à 26

ment mangeable. Il habite la mer Blanche au nord de l'Europe.

Dans une autre mer également intérieure , mais bien éloignée des contrées hyperboréennes , se trouve le blennioïde. Ce dernier gade vit, en effet, dans la Méditerranée : mais comme il n'a presque jamais plus de trois décimètres de longueur, et qu'il n'est pas d'un goût très-exquis , il n'est pas surprenant qu'il ait été dans tous les temps très-peu recherché des pêcheurs, et qu'il ait échappé aux observateurs de l'ancienne Grèce , à ceux de l'ancienne Rome , et même aux naturalistes modernes , jusqu'à Pallas , qui en a le premier publié la description , ainsi que nous venons de le dire *.

* A la membrane branchiale du blennioïde.....	6 rayons.
à la première nageoire dorsale, de.....	10 à 11
à la seconde.....	17
à la troisième.....	16
à chacune des pectorales.....	19
à chacune des jugulaires.....	5
à la première de l'anüs.....	27
à la seconde.....	19
à celle de la queue,.....	27

Il a beaucoup de rapports avec le merlan , et peut avoir été souvent confondu avec ce dernier poisson. Ses écailles sont petites : la couleur de la partie supérieure de son corps et de sa queue est argentée ; toutes les autres portions de la surface de l'animal sont d'un blanc d'argent, excepté les nageoires , sur lesquelles on voit des teintes jaunâtres ou dorées.

Les lèvres sont doubles et charnues ; les dents très-petites et inégales ; la ligne latérale est courbée vers la tête. Le premier rayon de chacune des nageoires jugulaires est divisé en deux ; et comme il est plus long que les autres rayons , il paroît, au premier coup d'œil , composer toute la nageoire : dès - lors on croit ne devoir compter que deux rayons dans chacune des jugulaires du gade que nous décrivons , et de là vient la dénomination de *blennioïde* qui lui a été donnée , parce que la plupart des blennies n'ont que deux rayons à chacune des nageoires que l'on voit sous leur gorge.

T A B L E

Des articles contenus dans ce volume.

AVERTISSEMENT et explication de quelques planches, *page* 5.

DISOURS sur la durée des espèces, 9.

TABLEAU du genre des trichiures, 69.

Le trichiure lepture, 70.

Le trichiure électrique, 78.

TABLEAU du genre des notoptères, 80.

Le notoptère kaporat, 81.

Le notoptère écailleux, 84.

TABLEAU du genre des ophisures, 86.

L'ophisure ophis, 87.

L'ophisure serpent, 90.

TABLEAU du genre des triures, 92.

Le triure bougainvillien, 93.

TABLEAU du genre des aptéronotes, 103.

L'aptéronote passan, 104.

TABLEAU du genre des régalecs, 110.

Le régalec glesne, 111.

Le régalec lancéolé, 116.

TABLEAU du genre des odontognathes,
118.

L'odontognathe aiguillonné, 119.

TABLEAU du genre des murènes, 125.

La murène anguille, 127.

La murène tachetée, et la murène myre, 180.

La murène congre, 183.

TABLEAU du genre des ammodytes, 189.

L'ammodyte appât, 190.

TABLEAU du genre des ophidiés, 195.

L'ophidie barbu, l'ophidie imberbe, et l'ophidie unernak, 197.

TABLEAU du genre des macrognathes, 201.

*Le macrognathe aiguillonné, 202.

Le macrognathe armé, 205.

TABLEAU du genre des xiphias, 208.

Le xiphias espadon, 209.

Le xiphias épée, 218.

TABLEAU du genre des anarhiques, 222.

L'anarhique loup, 223.

L'anarhique karrak, et l'anarhique panthérin, 236.

TABLEAU du genre des coméphores, 240.

Le coméphore baïkal, 241.

TABLEAU du genre des stromatées, 244.

Le stromatée fiatole, 245.

Le stromatée paru, 248.

TABLEAU du genre des rhombes, 250.

Le rhombe alépidote, 251.

T A B L E A U du genre des murénoïdes, 254

Le murénoïde sujet, 255.

T A B L E A U du genre des callionymes, 257.

Le callionyme lyre, 259.

Le callionyme dragonneau, 267.

Le callionyme flèche, et le callionyme japonais, 269.

Le callionyme pointillé, 272.

T A B L E A U du genre des calliomores, 275.

Le calliomore indien, 276.

T A B L E A U du genre des uranosopes, 278.

L'uranosope rat, 279.

L'uranosope houttuyn, 285.

T A B L E A U du genre des trachines, 286.

La trachine vive, 287.

La trachine osbeck, 299.

T A B L E A U du genre des gades, 300.

Le gade morue, 307.

Le gade æglefin, 345.

Le gade bib, 352.

Le gade saida, et le gade blennioïde, 354.









